

STUDIA GEOBOTANICA

Vol. 1 no. 2 1980

EDITORS

E. Aichinger - Klagenfurt

D. Lausi - Trieste

E. Mayer - Ljubljana

L. Orłóci - London, On.

F. Pedrotti - Camerino

S. Pignatti - Trieste

L. Poldini - Trieste

SECRETARY

E. Wikus Pignatti - Trieste



Istituto ed Orto Botanico
Università di Trieste

INSTRUCTIONS TO AUTHORS

STUDIA GEOBOTANICA publishes original articles in the field of geobotany, in particular contributions to the flora and vegetation of the Eastern Alps and of the Circumadriatic area.

It also publishes book reviews, notices of scientific meetings and summaries of proceedings.

MANUSCRIPTS should be submitted in duplicate to an Editor or to the Secretary of the Editorial Board. The Secretary will confirm receipt of the manuscript. The suitability of submitted manuscripts will be judged by appropriate members of the Editorial Board. For specialized articles, appropriate referees will be consulted. The Secretary will inform authors of the acceptance or rejection of manuscripts or the need for substantial revisions or reduction. Manuscripts should be typed, double-spaced, on white bond paper with a 25 mm margin on all sides.

LANGUAGE should be preferably English, Italian, French and German are also accepted.

THE TITLE should be informative and brief. The name (s) of the author(s) should be placed below the title. References to research projects, institutional publication numbers, etc. should be placed in a footnote to the author's names. Acknowledgements and dedications should be simply phrased and given at the end of the article.

KEYWORDS, not more than 10, in English, should be placed on the title page in alphabetical order.

ABSTRACT. An English abstract must be included. A summary in either French, German, Italian or in a Slavian language may also be added. It should not exceed one manuscript page.

LITERATURE. For examples see the published Studia Geobotanica.

CHAPTER HEADINGS should be given without designations, second or third order subheadings are permitted.

TABLES should be typed on separate pages, and not in the text itself. They should preferably be submitted in camera-ready form, i.e. typed on an IBM electric typewriter (using, c.g., an 'Artisan' typing element and carbon ribbon). Tables should be typed without corrections in such a way that they can be reduced to one full page (width 120 mm). Large tables should be prepared in the same way. If they cannot be reduced to page-size, they will be inserted as fold-out tables: if possible, this should be avoided.

Tables must be numbered and given descriptive titles. If the tables are not prepared according to these instructions, the publishers reserve the right to ask for a contribution to the actual cost.

ILLUSTRATIONS. Figures such as drawings and graphs should be done in India ink on smooth tracing paper. Names, numbers or other symbols should also be written in India ink or, preferably, by 'Letra-set' or a similar system. Reduction of these figures should be taken into account when preparing the lettering. Titles and legends to the figures should be typed on a separate sheet. All figures should be numbered.

Plates should be avoided, but when used, they should be numbered and supplied with informative titles.

CORRESPONDENCE: on matters related to manuscripts should be addressed to the respective Editor or to the Secretary. Correspondence on manuscripts after acceptance or concerning page proofs should be addressed to the Secretary of the Editorial Board:

Prof. E. Wikus Pignatti, Istituto ed Orto Botanico - cas. Università
I - 34100 TRIESTE (ITALY)

STUDIA GEOBOTANICA

Vol. 1 no. 2 1980

EDITORS

E. Aichinger - Klagenfurt

D. Lausi - Trieste

E. Mayer - Ljubljana

L. Orlóci - London, On.

F. Pedrotti - Camerino

S. Pignatti - Trieste

L. Poldini - Trieste

SECRETARY

E. Wikus Pignatti - Trieste



Istituto ed Orto Botanico
Università di Trieste

Fotocomposizione ed impaginazione:
Studio Gamma — Trieste

Stampa:
UPR — Centro Stampa
Salita Montanelli, 1 — Trieste

Finito di stampare: 1980

CATALOGO FLORISTICO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA E DEI TERRITORI ADIACENTI

Livio POLDINI

Keywords: Check list, Flora, Friuli-Venezia Giulia, Northeastern Italy.

Abstract

CHECK LIST OF THE FLORA OF FRIULI-VENEZIA GIULIA AND ADJACENT TERRITORIES.
This paper deals with the flora of a territory comprised between the northeastern Italian Alps eastward from Piave River and the Adriatic Sea, including a small part of the Karst around Trieste.

PREFAZIONE

1. Assetto floristico

Quantunque la pubblicazione delle flore regionali standard, riguardanti il territorio qui considerato, si distribuisca in un arco di tempo a noi piuttosto vicino (Pacher, 1880 — Pampanini, 1958)*, il rapido progresso delle ricerche sistematiche e floristiche collegato con radicali mutamenti di nomenclatura e i progetti di cartografia floristica che, iniziati nell'Europa centrale, trovano anche da noi sempre più largo seguito, ci hanno indotto alla compilazione del presente "Catalogo".

La delimitazione del territorio corrisponde all'intera regione Friuli-Venezia Giulia alla quale sono state addizionate parte dell'attiguo Carso sloveno e dell'Istria settentrionale al fine di mantenere integra quell'unità territoriale delineata dal Marchesetti nella sua Flora (1896—97) e parte delle Alpi Carniche occidentali fino a comprendere la Valvisdende.

La regione così ampliata, se da un lato vede accresciuta la propria eterogeneità fitogeografica, dall'altro meglio si presta a giustificare alcuni apporti floristici delle regioni contermini.

Il presente Catalogo ci permette un primo bilancio dell'assetto floristico di un territorio esteso su circa 8.513 Km².

famiglie	137	
generi	775	
specie	2973	
sottospecie	112	3086 entità

*In realtà la data del 1958 corrisponde all'anno di pubblicazione della "Flora del Cadore" di Pampanini che però è il frutto del periodo precedente il 1949, anno di morte del suo Autore.

dove i seguenti generi sono risultati i più ricchi in specie:

<i>Carex</i>	75	<i>Campanula</i>	23
<i>Hieracium</i>	59	<i>Centaurea</i>	23
<i>Ranunculus</i>	38	<i>Bromus</i>	23
<i>Trifolium</i>	31	<i>Saxifraga</i>	22
<i>Galium</i>	27	<i>Senecio</i>	22
<i>Euphorbia</i>	26	<i>Allium</i>	22
<i>Vicia</i>	25	<i>Poa</i>	22
<i>Alchemilla</i>	24	<i>Silene</i>	21
<i>Veronica</i>	24	<i>Salix</i>	20
<i>Festuca</i>	24	<i>Crepis</i>	20

Da queste valutazioni sono state escluse le specie soltanto coltivate che pur compaiono nel Catalogo.

E' interessante notare che l'apporto del Carso e dell'Istria settentrionale è di 285 entità, che quello dell'alto bacino del Piave è di 28 per cui la flora del Friuli storico (con inclusione di parte del Goriziano) risulta costituita da 2772 fra specie e sottospecie. Questi dati non si discostano di molto da quelli riportati dai Gortani (1905—1906) tanto più se si tiene conto dell'evoluzione del concetto di specie e del diverso trattamento tassonomico di molti gruppi.

Il rilevante contributo da parte dei territori carsico-istriani, che vede in testa per numero di specie aggiunte i generi *Ranunculus*, *Trifolium*, *Centaurea*, *Vicia*, *Carex*, *Allium*, *Ornithogalum*, è conseguenza del loro gravitare nel dominio floristico mediterraneo-illirico, già notevolmente diverso dal Friuli che è improntato a una facies di transizione alpino meridionale e nordillirico. L'inclusione di una parte delle Alpi Carniche occidentali comporta pertanto un modesto incremento di nuove specie.

2. Distribuzioni singolari

Da un punto di vista areografico si possono porre in evidenza i seguenti aspetti: accanto a un grosso numero di specie a larga distribuzione regionale (entità panterritoriali), ve ne sussistono delle altre che meritano di essere

analizzate separatamente e in particolare quelle mediterranee che investono il territorio con modalità che possono venir ricondotte alla seguente tipologia:

— gruppo che si ferma nell'Istria settentrionale, per esempio *Arceutobium oxycedri*, *Anemone hortensis*, *Pyrus spinosa*, *Vicia macrocarpa*, *V. terronii*, *V. serratifolia*, *Trifolium resupinatum*, *T. dalmaticum*, *T. cherleri*, *T. squamosum*, *T. subterraneum*, *Lotus ornithopodioides*, *Securigera securidaca*, *Coronilla cretica*, *Scorpiurus subvillosus*, *Hippocrepis unisiliquosa*, *Linum nodiflorum*, *Bifora testiculata*, *Galium corrudifolium*, *Valantia muralis*, *Verbascum sinuatum*, *Orobancha mutelii*, *Hyoscyamus albus*, *Hedypnois rhagadioloides*, *Pallenis spinosa*, *Bellis sylvestris*, *Crepis zacintha*, *Inula helenium*, *I. graveolens*, *Onopordum illyricum*, *Sternbergia lutea*, *Briza maxima*, *Hordeum leporinum*;
 — gruppo che si arresta nel Triestino: *Capparis spinosa*, *Matthiola incana*, *Hornungia petraea*, *Argyrolobium zanonii*, *Vicia lathyroides*, *V. lutea*, *V. hybrida*, *V. narbonensis*, *Lens ervoides*, *Medicago arabica*, *M. nigra*, *Trifolium lappaceum*, *T. angustifolium*, *Tribulus terrestris*, *Linum corymbulosum*, *Melissa officinalis* subsp. *altissima*, *Origanum prismaticum*, *Teucrium flavum*, *Linaria chalcopensis*, *Kickxia spuria*, *Orobancha picridis*, *Viburnum tinus*, *Valerianella eriocarpa*, *Cephalaria leucantha*, *Leugosia hybrida*, *Filago minima*, *Urospermum picroides* (fig. 1), *Reichardia picroides*, *Crepis vesicaria*, *Anthemis arvensis* subsp. *incrassata*, *A. altissima*, *A. segetalis*, *Calendula arvensis*, *Carlina corymbosa*, *C. acanthifolia*, *Carduus pinocephalus*, *Picnomon acanna*, *Centaurea solstitialis*, *C. alba* subsp. *splendens*, *Ornithogalum pyramidale*, *Allium rotundum*, *Stipa*




fig. 1 — *Urospermum picroides*

bromoides, *Oryzopsis miliacea*, *Arundo pliniana*, *Avena barbata*, *A. sterilis*, *Lophocloa cristata*, *Brachypodium distachyon*, *B. phoenicoides*, *Psilurus incurvus*, *Dasyphyrum villosum*, *Aegilops triuncialis*, *Schoenoplectus mucronatus*;

— gruppo che utilizzando il varco geologico rappresentato dal vallone di Gorizia si espande nell'agro cormonese prendendo contatto con la pianura friulana: *Polypodium australe* (fig. 2), *Osyris alba*, *Ranunculus velutinus*, *R. neapolitanus*, *Phillyrea latifolia* (Medea), *Ononis pusilla*, *Vicia bithynica*, *Lens nigricans*, *Trifolium striatum*, *Lathyrus setifolius*, *Erodium malacoides*, *Paliurus spina—christi*, *Scandix pecten—veneris*, *Bupleurum rotundifolium*, *B. veronense*, *B. praealtum*, *Torilis nodosa*, *Crepis sancta*, *Bellevallia romana*, *Smilax aspera*, *Rubia peregrina*, *Lycopus exaltatus*, *Rhagadiolus stellatus*, *Micropus erectus*, *Onopordum acanthium*, *Sylibum marianum*, *Centaurea calcitrapa*, *Scilla autumnalis*, *Ornithogalum refractum*, *Tragus racemosus*, *Agrostis castellana*, *Bromus rigidus*, *B. squarrosus*, *Aegilops geniculata*, *Ae. neglecta*, *Ae. cylindrica*, *Carex hallerana*, *C. michelii*, *Orchis papilionacea*, *Ophrys sphaecodes*;




Fig. 2 — *Polypodium australe*

— gruppo costituito da numerose psammofile che, piegando lungo i litorali, raggiunge la laguna veneta: *Inula crithmoides*, *I. viscosa*, *Xanthium italicum*, *X. spinosum*, *Artemisia*

caerulescens (fig. 3), *Vulpia bromoides*, *Lolium rigidum*, *Haynardia cylindrica*, *Parapholis incurva*, *P. strigosa*, *Agropyron junceum* subsp. *mediterraneum*, *A. elongatum*, *Hordeum secalinum*, *Carex riparia*;




Fig. 3 — *Artemisia caerulescens*

— gruppo che investe i pendii meridionali dei massicci montuosi esterni risalendo talvolta le valli a orientamento nord-sud: *Quercus ilex*, *Rosa sempervirens*, *Trifolium stellatum*, *Lathyrus sphaericus*, *Coronilla scorpioides*, *Pistacia terebinthus*, *Orlaya grandiflora*, *Convolvulus cantabrica*, *Ruscus aculeatus* (fig. 4), *Asparagus acutifolius*, *Arum italicum*, *Allium sphaerocephalon*, *A. ampeloprasum*, *Vulpia ciliata*, *V. myuros*, *Hordeum murinum*, *Typha angustifolia*, *Limodorum abortivum*.

Il fenomeno viene sintetizzato nel suo complesso dalla fig. 5 nella quale la larghezza delle frecce è in rapporto semiquantitativo con il numero dei casi. Lo smistamento che le specie mediterranee subiscono verso nord in funzione delle diverse soglie termiche che selezionano i singoli contingenti, consente così un più fine differenziamento del gruppo mediterraneo.




Fig. 4 — *Ruscus aculeatus*




Fig. 5 — Penetrazioni mediterranee e occidentali nel Friuli-Venezia Giulia.

Un numero di specie costituito perlopiù da endemiche nordilliriche e sudesteuropee si concentra sulle catene alpine esterne calcareo-dolomitiche. Questo tipo di distribuzione che potremmo definire "esalpica" viene rappresentato dal caso di *Melosperspermum peloponnesiacum* (fig. 6). A esso vengono ricondotti: *Thlaspi minimum*, *Oxytropis pyrenaica*, *Lathyrus vernus* subsp. *flaccidus*, *Grafia golaka*, *Ligusticum lucidum* subsp. *seguieri*, *Peucedanum schottii*, *Galium* × *centroniae*, *Knautia ressmannii*, *Adenophora liliifolia*, *Phyteuma scheuchzeri* subsp. *columnae*, *Leontodon tenuiflorus*, *Festuca laxa*.

Contrapposto a questo si evidenzia un gruppo dislocato sulla catena carnica principale e in genere sui massicci più interni, che manifesta propensione per condizioni più continentali e per sostrati arenaceo-siltitici.




Fig. 6 — *Melosperspermum peloponnesiacum*

Questa componente che si potrebbe definire "endalpica" o "intralpica" e che rappresentiamo con il caso di *Allium schoenoprasum* subsp. *alpinum* (fig. 7) è composta da: *Salix herbacea*, *Pulsatilla apiifolia*, *P. vernalis*, *Sempervivum wulfenii*, *S. montanum*, *Jovibarba arenaria*, *J. hirta*, *Oxytropis jacquintii*, *Trifolium noricum*, *Leontodon montanus*, *Senecio carniolicus*, *Tanacetum alpinum*, *Crepis terglouensis*, *Koeleria hirsuta*, *Trichophorum caespitosum*, *Carex curvula*, *C. paupercula* e altre.

Meritano altresì menzione entità che mostrano una tendenza a concentrarsi nella parte occidentale della regione (fig. 5). All'interno di questo gruppo




Fig. 7 — *Allium schoenoprasum* subsp. *alpinum*

alcune specie provengono dalle Alpi centrali e al pari di *Achillea macrophylla* (fig. 8) interessano precipuamente il territorio montano nordoccidentale. Esse sono: *Equisetum pratense*, *Salix hastata*, *Minuartia rupestris*, *Saponaria pumila*, *Ranunculus pyrenaicus* subsp. *plantagineus*, *Barbarea verna*, *Arabis soyeri* subsp. *subcoriacea*, *Cardamine alpina*, *Saxifraga mutata*, *Anthriscus nitida*, *Androsace polifolia*, *Vaccinium oxycoccus*, *Ledum palustre*, *Primula glutinosa*, *Gentiana brachyphylla*, *G. bavarica*, *Gentianella tenella*, *Sweetia perennis*, *Pedicularis tuberosa*, *P. kernerii*, *Orobancha loricata*, *Campanula latifolia*, *Phyteuma betonicifolium*, *Ph. globulariifolium*, *Crepis pontana*, *Achillea moschata*, *Artemisia genipi*, *Doronicum clusii*, *Potamogeton trichoides*, *Luzula alpino-pilosa* subsp. *candollei*, *L. multiflora* subsp. *congesta*, *Poa cenisia*, *Festuca pseudodura*, *F. rupicaprina*, *Carex microglochin*, *C. pauciflora*, *C. rupestris*, *C. lachenalii*, *C. bicolor*; alcune altre provengono invece dalle Dolomiti meridionali e presentano una distribuzione prevalentemente sudoccidentale: *Minuartia graminifolia*, *Galium margaritaceum*, *G. baldense*, *Euphrasia portae*, *Campanula morettiana*, *Festuca alpestris*, *F. spectabilis*.

L'elemento illirico è forse il più importante contrassegno fitogeografico della regione subito dopo l'endemismo, di cui abbiamo diffusamente trattato in altra sede (Poldini, 1974). Al suo interno conviene distinguere fra entità illirico-alpiche (o nordilliriche) e illiriche submediterranee (o sudilliriche). In




Fig. 8 — *Achillea macrophylla*

ambedue i sottotipi esistono esempi di distribuzione estesa su buona parte del territorio regionale ed esempi limitati alla porzione orientale di esso. Si danno pertanto quattro fondamentali combinazioni:

— specie nordilliriche ad ampia diffusione nel territorio montano: *Helleborus odorus*, *Anemone trifolia*, *Paeonia officinalis*, *Dentaria enneaphyllos*, *Epimedium alpinum*, *Cardamine trifolia*, *Geranium nodosum*, *Lathyrus venetus*, *Mercurialis ovata*, *Euphorbia angulata*, *Cyclamen purpurascens*, *Omphalodes verna*, *Lamium orvala*, *Melampyrum velebiticum*, *Pedicularis hacquetii*, *Lonicera caprifolium*, *Knautia drymeia*, *Aposeris foetida*, *Crocus napolitanus*, *Erythronium dens-canis*;

— specie nordilliriche limitate al territorio montano orientale: *Cerastium subtriflorum*, *Alyssum wulfenianum*, *Spiraea chamedryfolia*, *Anthyllis jacquinii*, *Euphorbia carniolica*, *Euonymus verrucosa*, *Frangula rupestris*, *Hacquetia epipactis*, *Astrantia carniolica*, *Pedicularis hoermanniana*, *Knautia illyrica*, *Centaurea haynaldii*;

— specie sudilliriche a diffusione nell'avanterra alpino e Prealpi: *Iberis intermedia* (disgiunta), *Alyssum montanum* (disgiunto), *Genista sericea*, *Cytisus pseudoprocumbens*, *Aremonia agrimonoides*, *Athamanta turbit*, *Cnidium silaifolium*, *Micromeria thymifolia*, *Satureja variegata*, *Pulmonaria australis* (disgiunta), *Veronica jacquinii*, *Campanula pyramidalis*, *Crepis chondrilloides* (disgiunta);

— specie sudilliriche che non oltrepassano l'Isonzo: *Drypis jacquiniana*, *Euphorbia*

fragifera, *E. wulfenii*, *Onosma javorkae*, *Dorycnium germanicum*, *Satureya subspicata*, *Euphrasia illyrica*, *E. liburnica*, *Veronica barrelieri* subsp. *barrelieri*, *Digitalis laevigata*, *Valeriana tuberosa*, *Lactuca viminea*, *L. quercina*, *Senecio lanatus*, *Achillea nobilis*, *Echinops ruthenicus*, *Jurinea mollis*, *Carduus micropterus*, *C. collinus* subsp. *cylindricus*, *Centaurea cristata*, *C. weldeniana*, *C. rupestris*, *Gagea pusilla*, *Fritillaria tenella*, *Ornithogalum comosum*, *Allium saxatile*, ecc.

Fra le distribuzioni singolari desideriamo ricordare quella che per il fatto di presentarsi disgiunta nei settori alpini rispettivamente orientale e occidentale potrebbe definirsi "bicentrica". Essa comprende i casi di: *Anemone narcissiflora*, *Ranunculus venetus*, *Arabis vohinensis*, *A. caerulea*, *Alyssum ovirense*, *Hymenolobus pauciflorus*, *Petrocallis pyrenaica*, *Geranium argenteum*, *Medicago pironae*, *Primula veris* subsp. *columnae*, *Androsace villosa*, *Gentiana orbicularis*.

Può avere inoltre interesse un contingente di specie per il quale non era accertata l'effettiva presenza entro i confini nazionali e che potrebbe ricadere nella definizione di "Grenzarten" (sensu Becherer) o di "specie trasgressive" (sensu Szafer). Esse vengono rappresentate dal caso di *Aconitum angustifolium* (fig. 9) e sono: *Ranunculus cassubicus*, *Dianthus ferrugineus* subsp. *liburnicus*, *Genista holopetala*, *Gentianella austriaca*, *Digitalis laevigata* (v. sopra), e altre.




Fig. 9 — *Aconitum angustifolium*

3. Osservazioni critiche

Per un certo numero di entità esistono fondati dubbi sulla loro effettiva presenza o perchè si tratta di indicazioni risalenti a epoca assai lontana e non più confermate o perchè la distruzione dei relativi biotopi ne rende estremamente improbabile la sopravvivenza. Appartengono alle segnalazioni spurie: *Salix pentandra*, *S. fragilis*, *Chenopodium botrys*, *C. viride*, *Halogeton sativus*, *Arenaria grandiflora*, *Cerastium ligusticum*, *Paronichia kapela*, *Silene hayekiana*, *Dianthus seguieri*, *D. alpinus*, *Clematis integrifolia*, *Thalictrum minus* subsp. *maius*, *Th. morisonii*, *Thlaspi montanum*, *Th. sylvium*, *Th. alpinum*, *Erysimum rhaeticum*, *Rorippa amphibia*, *R. pyrenaica*, *Dentaria heptaphylla*, *Arabis serpillifolia*, *Alyssum alpestre*, *A. desertorum*, *Sempervivum telephium*, *Spiraea cana*, *Rubus radula*, *R. flexuosus*, *R. kobeleri*, *R. bellardii*, *Astragalus frigidus*, *Trigonella gladiata*, *Medicago truncatula*, *Linum flavum* subsp. *campanulatum*, *Hibiscus palustris*, *Kosteletzkya pentacarpos*, *Hydrocotyle vulgaris*, *Chaerophyllum elegans*, *Silaum silaus*, *Phyllodoce caerulea*, *Corthusa matthioli*, *Trientalis europaea*, *Phyllirea angustifolia*, *Gentianella nana*, *G. aspera*, *Ballota rupestris*, *B. nigra* subsp. *velutina*, *Calamintha glandulosa*, *Verbascum crassifolium*, *Digitalis lutea*, *Pedicularis gyroflexa*, *Rhinanthus facchinii*, *Lindernia procumbens*, *Pinguicula leptoceras*, *Plantago coronopus*, *P. crassifolia*, *Jasione montana*, *Anthemis montana*, *Doronicum pardalianches*, *D. clusii*, *Senecio sylvaticus*, *Echinops sphaerocephalus*, *Carduus crispus*, *Groenlandia densa*, *Anthericum liliago*, *Gagea pratensis*, *Hierochloë odorata*, *Schoenoplectus litoralis*, *Carex austroalpina*.

Appartengono invece alle specie probabilmente estinte: *Marsilea quadrifolia*, *Pilularia globulifera*, *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*, *Atriplex acuminata*, *Rhamnus alaternus*, *Adonis annua*, *A. aestivalis*, *A. vernalis*, *A. microcarpa*, *Ranunculus opphioglossifolius*, *Aquilegia thalictrifolia*, *Abutilon theophrastii*, *Carthamus tinctorius*, *Asphodeline lutea*, *Carex dioica*, *C. disticha*.

4. Inquinamento della flora

L'alterazione della flora autoctona da parte di elementi estranei aventi ormai carattere di stabilità è relativamente modesta, soprattutto se confrontata con altre situazioni in Europa. Nella valutazione non si è tenuto conto delle immissioni selvicolturali.

	%
Friuli Venezia Giulia	6,5
Isola di Madeira	63,0
Polonia	57,0
Cecoslovacchia	32,0

Va osservato che si tratta però di un valore medio suscettibile di vistose modificazioni peggiorative lungo le coste, in pianura e nelle aree urbane. La bassa percentuale di polluzione floristica può essere spiegata con la notevole estensione di territorio montano, che per sua stessa configurazione si sottrae ad alterazioni di tipo intensivo.

5. Nuove segnalazioni

Alcune specie riportate nel Catalogo rappresentano nuove acquisizioni per il territorio nel suo insieme o per parti di esso. Ricordiamo alcune più significative quali: *Botrychium virginianum* (nuovo per l'Italia), *Matteuccia struthiopteris* (nuova per la regione), *Polygonum arenastrum* (nuovo per la regione), *Stellaria nemorum* subsp. *glochidisperma* (nuova per il Friuli), *Cerastium tenoreanum* (nuovo per la regione, i ritrovamenti sul Carso sloveno ne fanno un'entità nuova anche per la Slovenia), *Ranunculus cassubicus* (nuovo per l'Italia), *Papaver dubium* (nuovo per il Friuli), *Rorippa palustris* (nuova per il Friuli), *Cardamine alpina* (nuova per le Alpi Carniche), *Alyssum montanum* (nuovo per il Friuli), *Vicia oroboides* (nuova per il Friuli), *Pyrola chlorantha* (nuova per il Friuli), *Galium rotundifolium* (nuovo per il Carso sloveno), *Galium baldense* (nuovo per le Alpi Carniche), *Veronica sublobata* (nuova per la regione), *Pedicularis comosa* (nuova per il Friuli), *Erigeron atticus* (nuovo per il Friuli), *Conyza bonariensis* (nuova per la regione), *Senecio inaequidens* (nuova per la regione), *Miriophyllum alternifolium* (nuovo per la regione), *Epipactis muelleri* (nuova per l'Italia).

6. Criteri di redazione

La stesura del presente Catalogo venne iniziata allo scopo di costituire una base per la preparazione di una "flora excursoria" di carattere regionale e con nomenclatura aggiornata. Ciò spiega perchè la sinonimia si limiti a riportare i binomi senza autore usati dalle flore standard regionali e quelli di Flora Europaea (a eccezione del quinto volume, uscito a Catalogo ultimato), nell'intendimento di consentirne l'utilizzazione per attingervi notizie corologiche di maggiore dettaglio.

Nel corso della stesura si è pensato che meritasse attribuire al Catalogo il significato di una verifica intermedia delle conoscenze floristiche regionali. Dal primitivo intendimento derivano la scarsità di sinonimi e la mancata citazione d'autore. La presente "check list" si fonda su ricerche personali condotte sistematicamente dagli anni Sessanta, su un apparato bibliografico piuttosto considerevole (quasi 400 voci in buona parte passate su schede) e su revisioni di gruppi critici da parte di specialisti quali: K. Buttler (Ladenburg) *Draba*, M. Fischer (Vienna) *Veronica*, W. Gutermann (Vienna) *Oxytropis montana* s.l., E. Landolt (Zurigo) *Ranunculus montanus* s.l., W. Lippert (Monaco) *Alchemilla*, A. Martinčič (Lubiana) *Alchemilla*, W. Möschl (Graz) *Cerastium*, S. Wegmüller (Berna) *Lamiasastrum*, J.L. van Soest (Leyden) *Taraxacum*, *Hieracium* che qui sentitamente ringraziamo.

Per ragioni di tempo e di spazio abbiamo rinunciato a riportare per esteso la bibliografia che limitiamo invece alle opere e ai contributi più importanti, suddivisi in base ai contenuti. Per la nomenclatura si fa riferimento quasi sempre a Ehrendorfer & coll. (1973), tranne che per taluni casi, superati da più recenti aggiornamenti.

In merito alla distribuzione delle singole specie si è cercata una sintesi tra dettaglio e genericità, arrivando per approssimazioni successive a una sorte di codice descrittivo che comunicasse la frequenza delle specie nel territorio. La

molteplicità dei casi è stata resa nel modo seguente:

regione montana
Alpi Carniche
Prealpi Clautane (o Carniche)
Prealpi Giulie
littorale friulano
Friuli or.
alto Friuli
basso Friuli
Carso
Goriziano
Triestino (costiera triestina)
Istria (soltanto sett.)

La locazione "dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria" sta a indicare la diffusione più ampia (specie panterritoriali). Le indicazioni dettagliate poste in parentesi indicano la rarità della specie nel territorio più ampio che precede la parentesi.

Mi rendo conto che lavori di questo tipo non possono andare esenti da lacune e imperfezioni, ciononostante confido nella loro utilità soprattutto se stimolano critiche, correzioni e rettifiche in quanti ne facciano uso.

Le abbreviazioni usate sono:

F = Flora Europaea
G = Gortani
M = Marchesetti
or. = orientale
inf. = inferiore

SINOSSI DELLE FAMIGLIE

PTERYDOPHYTA

Class. LYCOPSIDA

Ord. Lycopodiales

Lycopodiaceae

Ord. Selaginellales

Selaginellaceae

Class. SPHENOPSIDA

Ord. Equisetales

Equisetaceae

Class. FILICOPSIDA

Ord. Ophioglossales

Ophioglossaceae

Ord. Filicales

Adiantaceae

Hypolepidaceae

Thelypteridaceae

Aspleniaceae

Athyriaceae

Aspidiaceae

Blechnaceae

Polypodiaceae

Ord. Marsileales

Marsileaceae

SPERMATOPHYTA

GYMNOSPERMAE

Class. CYCADOPSIDA

Ord. Ginkgoales

Ginkgoaceae

Class. CONIFEROPSIDA

Ord. Pinales (Coniferales)

Pinaceae

Taxodiaceae

Cupressaceae

Class. TAXOPSIDA

Ord. Taxales

Taxaceae

ANGIOSPERMAE

Class. DICOTYLEDONES

(MAGNOLIATAE)

Subclass. Archichlamydeae

Ord. Salicales

Salicaceae

Ord. Juglandales

Juglandaceae

Ord. Fagales

Betulaceae

Corylaceae

Fagaceae

Ord. Urticales

Ulmaceae

Moraceae

Cannabaceae

Urticaceae

Ord. Santalales

Santalaceae

Loranthaceae

Ord. Aristolochiales

Aristolochiaceae

Ord. Polygonales

Polygonaceae

Ord. Centrospermae

Chenopodiaceae

Amaranthaceae

Phytolaccaceae

Nictaginaceae

Portulacaceae

Caryophyllaceae

Ord. Ranales

Nymphaeaceae

Ceratophyllaceae

Ranunculaceae

Paeoniaceae

Berberidaceae

Lauraceae

Magnoliaceae

Calycanthaceae

Ord. Rhoeadales

Papaveraceae

Capparidaceae
 Brassicaceae (Cruciferae)
 Resedaceae
Ord. Sarraceniales
 Droseraceae
Ord. Rosales
 Crassulaceae
 Saxifragaceae
 Parnassiaceae
 Hydrangeaceae
 Grossulariaceae
 Pittosporaceae
 Platanaceae
 Rosaceae
 Fabaceae (Leguminosae)
Ord. Geraniales
 Oxalidaceae
 Geraniaceae
 Tropaeolaceae
 Zygophyllaceae
 Linaceae
 Euphorbiaceae
Ord. Rurales
 Rutaceae
 Simarubaceae
 Polygalaceae
Ord. Sapindales
 Anacardiaceae
 Aceraceae
 Hippocastanaceae
 Balsaminaceae
Ord. Celastrales
 Aquifoliaceae
 Celastraceae
 Staphyleaceae
 Buxaceae
Ord. Rhamnales
 Rhamnaceae
 Vitaceae
Ord. Malvales
 Tiliaceae
 Malvaceae
Ord. Thymeleales
 Thymelaeaceae
 Elaeagnaceae

Ord. Guttiferales
 Hypericaceae (Guttiferae)
Ord. Violales
 Violaceae
 Cistaceae
 Tamaricaceae
Ord. Cucurbitales
 Cucurbitaceae
Ord. Myrtales
 Lythraceae
 Trapaceae
 Myrtaceae
 Punicaceae
 Onagraceae
 Haloragaceae
 Hippuridaceae
Ord. Umbelliflorae
 Cornaceae
 Araliaceae
 Apiaceae (Umbelliferae)
Subclass. Sympetalae
Ord. Ericales
 Pyrolaceae
 Ericaceae
 Empetraceae
Ord. Primulales
 Primulaceae
Ord. Plumbaginales
 Plumbaginaceae
Ord. Ebenales
 Ebenaceae
Ord. Oleales
 Oleaceae
Ord. Gentianales
 Gentianaceae
 Menyanthaceae
 Apocynaceae
 Asclepiadaceae
 Rubiaceae
Ord. Tubiflorae
 Convolvulaceae
 Boraginaceae
 Verbenaceae
 Callitrichaceae
 Lamiaceae (Labiatae)

Solanaceae
 Buddleaceae
 Scrophulariaceae
 Globulariaceae
 Bignoniaceae
 Orobanchaceae
 Lentibulariaceae
Ord. Plantaginales
 Plantaginaceae
Ord. Dipsacales
 Caprifoliaceae
 Adoxaceae
 Valerianaceae
 Dipsacaceae
Ord. Campanulales (Synandreae)
 Campanulaceae
 Asteraceae (Compositae)
Class. MONOCOTYLEDONES
(LILIATAE)
Ord. Helobiae
 Alismataceae
 Butomaceae
 Hydrocharitaceae
 Scheuchzeriaceae
 Juncaginaceae
 Potamogetonaceae
 Ruppiaceae
 Zosteraceae

Zannichelliaceae
 Najadaceae
Ord. Liliiflorae
 Liliaceae
 Agavaceae
 Amaryllidaceae
 Dioscoreaceae
 Iridaceae
Ord. Juncales
 Juncaceae
Ord. Commelinales
 Commelinaceae
Ord. Graminales
 Poaceae (Gramineae)
Ord. Principes
 Palmae
Ord. Spathiflorae
 Araceae
 Lemnaceae
Ord. Pandanales
 Sparganiaceae
 Typhaceae
Ord. Cyperales
 Cyperaceae
Ord. Zingiberales (Scitamineae)
 Cannaceae
Ord. Gynandreae (Microspermae, Orchidales)
 Orchidaceae

PTERIDOPHYTA
LYCOPSIDA
LYCOPODIALES
LYCOPODIACEAE

Hupertia Bernh.

H. selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. (G: *Lycopodium selago*) — regione montana.

Lycopodiella Holub

L. inundata (L.) Holub (F: *Lepidotis inundata*; G: *Lycopodium inundatum*) — Alpi Carniche (Pramollo).

Lycopodium L.

L. annotinum L. — regione montana.

L. clavatum L. — regione montana.

Diphasium K. Presl. ex Rothm.

D. complanatum (L.) Rothm. (G: *Lycopodium complanatum*) — Alpi Carniche, Carso Dobravljje).

D. tristachyum (Pursh) Rothm. — Carso (Dobravljje).

D. alpinum (L.) Rothm. — regione montana (Alpi Giulie: Due Pizzi; Alpi Carniche: Clapsavon, Pramollo, M. Cordin).

SELAGINELLALES
SELAGINELLACEAE

Selaginella PB.

S. selaginoides (L.) PB. ex Schrank & Mart. — regione montana.

S. helvetica (L.) Spring. — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano (Pieris).

SPHENOPSIDA
EQUISETALES
EQUISETACEAE

Equisetum L.

E. hyemale L. — dal basso Friuli alla regione montana.

E. ramosissimum Desf. — dal mare alla regione montana.

E. variegatum Schleich. ex Web. & Mohr — Alpi e Prealpi Carniche.

- E. fluviatile L. (G: *E. limosum*) — regione montana, Goriziano (paludi di Castelletto, forse estinto).
- E. palustre L. — dal mare alla regione montana.
- E. sylvaticum L. — Alpi Carniche occ.
- E. pratense L. — Alpi Carniche occ. (Val Visdende).
- E. arvense L. — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
- E. telmateia Ehrh. (G, M: *E. maximum*) — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

FILICOPSIDA
OPHIOGLOSSALES
OPHIOGLOSSACEAE

Ophioglossum L.

- O. vulgatum L. — dal basso Friuli (Bosco Baredi) alla regione montana inf., Goriziano (lago di Doberdò).

Botrychium Sw.

- B. lunaria (L.) Sw. — regione montana.
- B. virginianum (L.) Sw. — Alpi Carniche (Cason di Lanza, Alpi di Moggio presso Cas.ra Vuàlt).

FILICALES
ADIANTACEAE

Adiantum L.

- A. capillus-veneris L. — dall'alto Friuli (Premariacco: forre del Natisone) alla regione montana inf. (Prealpi Carniche), Goriziano, Triestino, Istria.

HYPOLEPIDACEAE

Pteridium Scop.

- P. aquilinum (L.) Kuhn (G: *Pteris aquilina*) — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

THELYPTERIDACEAE

Thelypteris Schmidel

- T. limbosperma (All.) H.P. Fuchs (G: *Nephrodium Oreopteris*; M: *Aspidium montanum*) — Alpi e Prealpi Carniche, Goriziano, Carso.
- T. palustris Schott (G: *Nephrodium Thelypteris*; M: *Aspidium Thelypteris*) — basso Friuli, Prealpi Giulie (Campo di Bonis in Val Cornappo), Goriziano (Pietrarossa).
- T. phegopteris (L.) Slosson (G: *Polypodium Phegopteris*; M: *Aspidium Phegopteris*) — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano.

ASPLENIACEAE

Asplenium L.

A. trichomanes L.

subsp. *trichomanes* — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria. Non è nota la distribuzione della sottospecie:

subsp. *quadrivalens* D.E. Mayer

A. adulterinum Milde — la sua menzione dal Tarvisiano sarebbe priva di fondamento (cf. Nardi in "Webbia", 26(2):470[1972]).

A. viride Huds. — regione montana.

A. adiantum-nigrum L. — Carnia, Valli del Natisone, Carso.

A. onopteris L. — dal Triestino, ma dubbio.

A. septentrionale (L.) Hoffm. — Alpi Carniche.

A. seelosii Leyb. — regione montana a partire da quote molto depresse (300-320 m), Stazione di Moggio, T. Glagnò.

A. ruta-muraria L.

subsp. *ruta-muraria* — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria;

subsp. *dolomiticum* Lovis & Reichstein — regione montana (Chiusaforte), ma di distribuzione mal nota.

A. lepidum C. Presel — Istria (Val Rosandra, Ospo, Podpeč).

A. fissum Kit. ex Willd. — Alpi e Prealpi Carniche, Carso (Vremščica).

Ceterach DC.

C. officinarum DC.

subsp. *officinarum* — Carso;

subsp. *bivalens* D.E.Ma. (F: *Asplenium javorkeanum*) — tutte le località dalle Valli del Natisone, della Bernadia e del M. Glemina (Gemona) si riferiscono probabilmente a questa sottospecie.

Phyllitis Hill

P. scolopendrium (L.) Newm. — dall'alto Friuli alla regione montana inf. (bassa Carnia, Valli del Natisone), Goriziano, Carso, Istria.

ATHYRIACEAE

Athyrium Roth

A. filix-femina (L.) Roth (G: *Asplenium Filix-foemina*) — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

A. distentifolium Tausch ex Opiz — Alpi e Prealpi Carniche.

Cystopteris Bernh.

C. fragilis (L.) Bernh. — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso.

C. regia (L.) Desv. (G: *C. fragilis* subsp. *alpina*; M: *C. alpina*) — regione montana.

C. montana (Lam.) Desv. — regione montana.

Woodsia R.Br.

- W. alpina* (Bolton) S.F.Gray — Alpi Carniche (Plöcken, Creta Verde, M.Paularo).
W. pulchella Bertol. — Alpi Carniche.

Matteuccia Tod.

- T. struthiopteris* (L.) Tod. — Alpi Carniche (Cason di Lanza, M.Arvenis, Forni A.).

ASPIDIACEAE

Cyrtomium C. Presl

- C. falcatum* (L.fil.) C. Presl (F: *Polystichum falcatum*) — alto Friuli (M. di Ragogna),
avventizio. L'identificazione della specie non è ancora da ritenersi definitiva.

Polystichum Roth

- P. aculeatum* (L.) Roth (G: *Aspidium aculeatum* subsp. *lobatum*) — regione montana,
Goriziano (Peteano), Carso.
P. setiferum (Forsk.) Woynar (G: *Aspidium aculeatum* subsp. *typicum*) — dal basso
Friuli alla regione montana.
P. braunii (Spenn.) Fée (G: *Aspidium aculeatum* subsp. *braunii*) — regione montana,
Goriziano (Collio).

Dryopteris Adans.

- D. filix-mas* (L.) Schott (G: *Nephrodium Filix-mas*) — dall'alto Friuli alla regione
montana, Goriziano, Carso, Istria.
D. pseudomas (Wollast.) Holub & Pouzar (F: *D. borrieri*; G: *Nephrodium Filix-mas*
var. *paleaceum*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano (Plessiva), Carso
(Vremščica).
D. villarii (Bell.) Woynar ex Schinz & Thell. (G: *Nephrodium rigidum* subsp.
villarii; M: *Aspidium rigidum*) — Regione montana, Carso (Divača, Matavun).
D. cristata (L.) A. Gray (M: *Aspidium cristatum*) — Carso (tra Sežana e Lipica).
D. carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs (G: *Nephrodium spinulosum* subsp. *typicum*) —
regione montana.
D. dilatata (Hoffm.) A. Gray (G: *Nephrodium spinulosum* subsp. *dilatatum*) —
regione montana.
D. assimilis S.Walker — Alpi Carniche (P.Pura, Dolomiti Pesarine).

Gymnocarpium Newm.

- G. dryopteris* (L.) Newm. (G: *Polypodium Dryopteris* subsp. *typicum*) — dall'alto
Friuli alla regione montana.
G. robertianum (Hoffm.) Newm. (G: *Polypodium Dryopteris* subsp. *Robertianum*;
M: *Aspidium Robertianum*) — regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

BLECHNACEAE

Blechnum L.

- B. spicant* (L.) Roth — regione montana (Prealpi Giulie: Valle Zimôr; Alpi Carniche: P.Pura, Auernig, Pramollo), Goriziano (M.Quarin).

POLYPODIACEAE

Polypodium L.

- P. australe* Fée (M: *P.vulgare* var. *serrata*) — Carso triestino (grotta Noè, Pocala) e goriziano (abisso Bonetti, M.S.Michele).
P. vulgare L. (G: *P.vulgare* subsp. *typicum*) — dal basso Friuli (Aquileia) alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
P. interjectum Shivas (G: *P.vulgare* subsp. *serratum*) — regione montana inf. (Prealpi Carniche: Verzegnis; Valli del Natisone, Castello di Gemona), Carso.

MARSILEALES

MARSILEACEAE

Marsilea L.

- M. quadrifolia* L. — basso Friuli (fra Cordovado e Giussago).

Pilularia L.

- P. globulifera* L. — Goriziano (Ruttârs, Mossa).

SPERMATOPHYTA

GYMNOSPERMAE

CYCADOPSIDA

GINGKOALES

GINGKOACEAE

Ginkgo L.

- G. biloba* L. — coltivato.

CONIFEROPSIDA

PINALES

PINACEAE

Abies Mill.

- A. alba* Mill. (M: *A. pectinata*) — regione montana.
A. cephalonica Loudon — coltivato.

Pseudotsuga Carr.

- P. menziesii* (Mirbel) Franco — coltivato.

Picea A. Dietr.

P. abies (L.) Karsten (G: *Abies excelsa*; M: *Picea vulgaris*) — regione montanae coltivato.

Larix Mill.

L. decidua Mill. (M: *L. europaea*) — regione montana e coltivato.

Cedrus Link

C. deodara (D. Don) G. Don fil. ex Loudon — coltivato.

C. atlantica (Endl.) Carrière — coltivato.

C. libani A. Richard ex Bory — coltivato.

Pinus L.

P. pinaster Aiton — coltivato.

P. nigra Arnold (G, M: *P. Laricio subsp. nigricans*) — litorale friulano (foci del Tagliamento, Grado), regione montana (Tarvisiano, Carnia, Prealpi) e coltivato.

P. sylvestris L. — dall'alto Friuli alla regione montana e coltivato.

P. mugo Turra s.str. (F: *P. mugo*; G: *P. montana*) — regione montana.

P. halepensis Mill. — coltivato, naturalizzato nel litorale friulano e sulla costiera triestina.

P. brutia Ten. — coltivato.

P. pinea L. — naturalizzato nelle pinete di Lignano, Grado, Aquileia, Goriziano.

P. cembra L. — spontaneo soltanto in alcuni punti della catena carnica principale in versante austriaco (Turnowsky in Carinthia II, 145(66):100, 1955; Hartl & Zeitlinger ibid., 167(87):257, 1977), altrove impiegato talvolta nei rimboschimenti.

P. wallichiana A.B. Jacks. — coltivato frequentemente nei parchi e nei giardini, talvolta impiegato nei rimboschimenti.

P. strobus L. — coltivato.

TAXODIACEAE

Cryptomeria D. Don

C. japonica (L. fil.) D. Don — coltivato.

CUPRESSACEAE

Cupressus L.

C. sempervirens L. — coltivato.

f. *sempervirens* — coltivato.

f. *horizontalis* (Mill.) Vess — coltivato.

C. macrocarpa Hartweg — coltivato.

C. arizonica E.L. Greene — coltivato.

C. lawsoniana (A. Murr.) Parl. — coltivato.

Thuja L.

T. occidentalis L. — coltivato.

T. orientalis L. (M: *Biota orientalis*) — coltivato.

Calocedrus Kurz

C. decurrens (Torrey) Florin — coltivato.

Juniperus L.

J. communis L.

subsp. *communis* — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria;

subsp. *alpina* (Neilr.) Čelak. (F,G: *J. communis* subsp. *nana*) — regione montana.

J. oxycedrus L.

subsp. *oxycedrus* — litorale friulano or. (Grado);

subsp. *macrocarpa* (Sibth. & Sm.) J. Ball — litorale friulano or. (Grado), Carso (fra Aurisina e S. Pelagio).

J. sabina L. — Alpi Carniche (M. Spina in Valvisdende, Timau, Zovello, dosso Varmost), coltivata altrove.

J. chinensis L. — coltivato.

J. virginiana L. — coltivato.

TAXOPSIDA

TAXALES

TAXACEAE

Taxus L.

T. baccata L. — regione montana e coltivato altrove.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

(MAGNOLIATAE)

ARCHICHLAMYDEAE

SALICALES

SALICACEAE

Salix L.

S. pentandra L. — Val Raccolana, ma dubbio.

S. fragilis L. — litorale friulano or. (Primiero e Grado), Triestino (S. Giovanni di Duino).

S. alba L.

subsp. *alba* — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria;

subsp. *vitellina* (L.) Arc. (G: *S. alba* var. *vitellina*) — coltivato per vimini dalla pianura alla collina.

S. babylonica L. — coltivato.

S. chrysocoma Dode — coltivato.

S. triandra L.

subsp. *discolor* (Koch) Arc. — Friuli, Goriziano, Triestino, Istria.

S. reticulata L. — regione montana.

S. herbacea L. — Alpi Carniche occ. (Peralba, Cavallino, Fleons).

- S. retusa* L. (G: *S. retusa* subsp. *typica*) — regione montana.
- S. serpyllifolia* Scop. (G: *S. retusa* subsp. *serpyllifolia*) — regione montana.
S. alpina Scop. (G: *S. Myrsinites* subsp. *typica*) — regione montana.
- S. myrsinifolia* Salisb. (F: *S. nigricans*; G: *S. phyllicifolia* subsp. *nigricans*) — regione montana.
- S. glabra* Scop. (G: *S. phyllicifolia* subsp. *glabra*) — regione montana e pianura sottostante.
- S. appendiculata* Vill. (G: *S. Aurita* subsp. *grandifolia*; M: *S. grandifolia*) — regione montana e pianura sottostante, Carso.
- S. cinerea* L. (G: *S. Aurita* subsp. *cinerea*) — Friuli, Goriziano, Carso, Istria.
- S. caprea* L. (G: *S. Aurita* subsp. *Caprea*) — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
- S. repens* L.
 subsp. *rosmarinifolia* (L.) Hartm.f. (G: *S. repens* var. *rosmarinifolia*) — tratto costiero fra la Livenza e l'Isonzo e alla confluenza del Natisone e del Torre, ma probabilmente estinta.
- S. waldsteiniana* Willd. (G: *S. Myrsinites* subsp. *Arbuscula*) — regione montana.
- S. hastata* L. — Alpi Carniche occ. (M.Zauf, Tragonia, Pitturina, Cavallino, P.dell'Oregone).
- S. viminalis* L. — coltivata.
- S. eleagnis* Scop. (G: *S. incana*) — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso.
- S. purpurea* L. — dal mare alla regione montana, Goriziano, Triestino, Istria.
- S. daphnoides* Vill. — regione montana e pianura sottostante (colle di Susans), Istria (Strignano).

Populus L.

- P. alba* L. — Friuli, bassa Carnia, Goriziano, Triestino, Istria.
- P. × canescens* (Ait.) Sm. — Goriziano (Russiz, Pieris), Triestino.
- P. tremula* L. — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso.
- P. nigra* L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- P. × canadensis* Moench — coltivato.
- P. deltoides* Marsh. — coltivato.

JUGLANDALES JUGLANDACEAE

Juglans L.

- J. regia* L. — coltivato e talvolta inselvatichito.
- J. nigra* L. — coltivato.

FAGALES BETULACEAE

Betula L.

- B. pendula* Roth (G, M: *B. alba*) — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
- B. pubescens* Ehrh. (G: *B. alba* var. *pubescens*) — Prealpi Carniche (Val Meluzzo).

Alnus Mill.

- A. viridis* (Chaix) DC. — regione montana.
A. glutinosa (L.) Gaertn. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Triestino, Istria.
A. incana (L.) Moench — regione montana.
A. cordata (Loisel.) Loisel. — impiegato in alcuni rimboschimenti nelle Prealpi Carniche.

CORYLACEAE

Carpinus L.

- C. betulus* L. — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
C. orientalis Mill. (M: *C. duinensis*) — litorale friulano or. (Grado), Triestino, Istria.

Ostrya Scop.

- O. carpinifolia* Scop. — regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Corylus L.

- C. avellana* L. — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
C. maxima Mill. (G: *C. avellana* subsp. *tubulosa*) — coltivato.

FAGACEAE

Fagus L.

- F. sylvatica* L. — regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

Castanea Mill.

- C. sativa* Mill. — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Triestino, Istria.

Quercus L.

- Q. rubra* L. — impiegata talvolta nei rimboschimenti (Monte di Ragogna), Carso (Percedol).
Q. ilex L. — Prealpi Caniche (dal M.S. Simeone a Vito d'Asio), Goriziano (M.S. Michele, Vallone), Triestino (Costiera), Istria.
Q. cerris L. — Friuli or. (Valle dello Iudrio, bosco Romagno), Goriziano (Plessiva, Lucinico), Carso, Istria.
Q. petraea (Matt.) Liebl. (G: *Q. Robur* subsp. *sessiliflora*; M: *Q. sessiliflora*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
Q. daleschampii Ten. — Goriziano, Carso, Istria.
Q. robur L. (F: *Q. robur* subsp. *robur*; G: *Q. robur* subsp. *pedunculata*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Istria.
Q. virgiliana (Ten.) Ten — litorale friulano or. (Grado), Triestino (Noghere).
Q. pubescens Willd. (G: *Q. Robur* subsp. *pubescens*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

URTICALES

ULMACEAE

Ulmus L.

U. glabra Huds. (G, M: *U. montana*) — regione montana, Goriziano (nelle forre lungo l'Isonzo).

U. minor Mill. (G, M: *U. campestris*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Celtis L.

C. australis L. — litorale friulano or. (Grado), Carso, Istria e coltivato.

MORACEAE

Broussonetia L'Hér. ex Vent.

B. papyrifera (L.) Vent. — coltivato e spesso inselvatichito.

Morus L.

M. nigra L. — coltivato dalla pianura fino a 800 m. circa.

M. alba L. — coltivato c.s.

Maclura Nutt.

M. pomifera (Rafin.) C.K.Schneider — coltivato (Goriziano, Triestino).

Ficus L.

F. carica L. — Triestino, Istria, coltivato altrove.

CANNABINACEAE

Humulus L.

H. lupulus L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Cannabis L.

C. sativa L. — coltivata e spesso naturalizzata.

URTICACEAE

Urtica L.

U. dioica L. — dal mare alla regione montana.

U. urens L. — dal mare alla regione montana.

Parietaria L.

P. officinalis L. (G: *P. officinalis* subsp. *erecta*) — dal mare alla regione montana.

P. judaica L. (F, M: *P. diffusa*; G: *P. officinalis* subsp. *judaica*) — dal mare alla regione montana inf.

SANTALALES
SANTALACEAE

Osyris L.

O. alba L. — litorale friulano or. (Grado), Goriziano, Carso, Istria.

Thesium L.

T. alpinum L. (G: *Th. alpinum* subsp. *typicum*) — regione montana con preferenza dei gruppi interni.

T. grandiflorum (A.DC.) Hand. — Mazz. ex Neumay. (F: *Th. pyrenaicum* subsp. *alpestre*; G: *Th. alpinum* subsp. *pratense*) — Alpi Carniche.

T. rostratum Mert. & Koch — regione montana con preferenza dei gruppi esterni.

T. bavarum Schrank (G: *Th. linophyllum* subsp. *montanum*; M: *Th. montanum*) — regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

T. linophyllum L. (G: *Th. linophyllum* subsp. *intermedium*; M: *Th. intermedium*) — regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

T. divaricatum Jan ex Mert. & Koch (G: *Th. linophyllum* subsp. *divaricatum*) — dal mare all'alto Friuli, Goriziano, Carso, Istria.

LORANTHACEAE

Loranthus Jacq.

L. europaeus Jacq. — Carso, Istria.

Viscum L.

V. album L. (F: *V. album* subsp. *album*; G: *V. album* subsp. *typicum*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Triestino, Istria.

V. laxum Boiss. & Reut. (F: *V. album* subsp. *austriacum*; G: *V. album* subsp. *laxum*) — regione montana inf.

Arceutobium MB.

A. oxycedri (DC.) Bieb. — Istria.

ARISTOLOCHIALES

ARISTOLOCHACEAE

Aristolochia L.

A. clematitis L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

A. rotunda L. — basso Friuli, Goriziano, Carso, Istria.

A. pallida Willd. (G: *A. longa* subsp. *pallida*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Asarum L.

A. europaeum L.

subsp. *caucasicum* (Ducharte) Sôo (F: *A. ibericum*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

POLYGONALES

POLYGONACEAE

Polygonum L.

- P. maritimum* L. (M: *P. litorale*) — littorale friulano.
- P. patulum* MB. (G: *P. aviculare* subsp. *patulum* et *Bellardi*; M: *P. Bellardi*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- P. aviculare* L. (M: *P. aviculare* subsp. *typicum*) — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
- P. arenastrum* Boreau — dalle rive del mare alla regione montana inf. (Ovaro), Goriziano, Carso.
- P. minus* Huds. — Goriziano, Triestino, Istria.
- P. mite* Schrank — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
- P. persicaria* L. (G: *P. lapathifolium* subsp. *persicaria*) — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
- P. lapathifolium* L.
subsp. *lapathifolium* (incl. *P. nodosum* Pers.) (G: *P. lapathifolium* subsp. *typicum* incl. var. *nodosum*) — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria;
subsp. *incanum* (F. W. Schmidt) Schübl & Mart. (F: *P. tomentosum*) — Carso.
- P. amphybium* L. — dal mare all'alto Friuli (S. Daniele, Ospedaletto) e alla regione montana inf. (lago di Cavazzo), Goriziano (lago di Doberdò).
- P. bistorta* L. — regione montana.
- P. viviparum* L. — regione montana.

Fallopia Adans.

- F. convolvulus* (L.) Holub (F: *Bilderdykia convolvulus*; G, M: *Polygonum Convolvulus*) — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
- F. dumetorum* (L.) Holub (F: *Bilderdykia dumetorum*; G, M: *Polygonum dumetorum*) — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

Bilderdykia Dum.

- B. aubertii* (Louis Henry) Moldenke — coltivato e spesso naturalizzato dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Reynoutria Houtt.

- R. japonica* Houtt. — coltivata (Goriziano).

Fagopyrum Mill.

- F. esculentum* Moench (G: *Polygonum Fagopyrum*) — coltivato e qua e là spontaneo in Carnia e in Carso.
- F. tataricum* (L.) Gaertn. (M: *Polygonum tataricum*) — un tempo coltivato e talvolta spontaneo quale relitto culturale.

Oxyria Hill

- O. digyna* (L.) Hill — Alpi Carniche e Giulie (M. Sart e Canin).

Rumex L.

- R. angiocarpus* Murb. — Istria (Brkini).
- R. acetosella* L. — regione montana, Goriziano (Collio).

- R. scutatus* L. — regione montana.
 var. *reniformis* Marches. — Carso (Škocjan).
R. alpestris Jacq. (F: *R. arifolius*; G: *R. Acetosa* subsp. *arifolius*) — regione montana.
R. rugosus Campd. (G: *R. Acetosa* subsp. *hortensis*) — coltivato in Friuli.
R. alpinus L. — regione montana.
R. hydrolapathum Huds. — basso Friuli, Goriziano.
R. patientia L. — coltivato in Friuli.
R. crispus L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
R. conglomeratus Murr. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
R. sanguineus L. — litorale friulano or. (Grado), Triestino.
R. pulcher L.
 subsp. *pulcher* — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
R. obtusifolius L. — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

CENTROSPERMAE CHENOPODIACEAE

Polycnemum L.

- P. majus* A. Br. (G, M: *P. arvense* subsp. *majus*) — Goriziano, Carso.
P. arvense L.

Beta L.

- B. vulgaris* L.
 subsp. *vulgaris* (G: *B. vulgaris* subsp. *Cicla et Rapa*) — coltivata e talvolta inselvatichita;
 subsp. *maritima* (L.) Arc. — litorale friulano (isola di S. Andrea, Belvedere, Canal delle Mee).
B. macrocarpa Guss. (G: *B. vulgaris* subsp. *macrocarpa*) — litorale friulano e Aquileia: (Canale d'Anfora e delle Mee).

Chenopodium L.

- C. botrys* L. — Monfalcone, località dubbia.
C. ambrosioides L. — basso Friuli, Goriziano (Monfalcone), Triestino, Istria, spontaneizzato.
C. bonus—henricus L. — regione montana.
C. glaucum L. — Triestino.
C. rubrum L. (M: *Blitum rubrum*) — Triestino, Istria.
C. botryoides Sm. (G: *C. rubrum* subsp. *botryoides*) — Goriziano (Mariano del Friuli).
C. hybridum L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Carso.
C. polyspermum L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
C. vulvaria L. — basso Friuli, Triestino.
C. urbicum L. (G: *Ch. urbicum* subsp. *typicum & intermedium*) — basso Friuli, Triestino, Istria.
C. murale L. — basso Friuli, Goriziano, Triestino, Istria.
C. opulifolium Schrad. ex Koch & Z. (G: *Ch. album* subsp. *opolifolium*) — basso Friuli, Triestino.
C. album L. (G: *Ch. album* subsp. *typicum*) — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

C. viride L. (G: *Ch. album* subsp. *viride*) — Friuli, da controllare.

Spinacia L.

S. oleracea L. — coltivata.

Atriplex L.

A. hortensis L. — coltivata.

A. acuminata W. & K. (F: *A. nitens*; G: *A. hortense* var. *nitens*) — Goriziano (Doberdò), probabilmente estinta.

A. rosea L. (G: *A. laciniatum* subsp. *roseum*) — basso Friuli, Triestino, Istria.

A. laciniata L. — litorale friulano or. (Aquileia, Grado, Monfalcone).

A. tatarica L. — Triestino, Istria.

A. littoralis L. (G: *A. hastatum* subsp. *litorale*) — dune di Grado.

A. patula L. — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Triestino.

A. latifolia Wahlenb. (F: *A. hastata*; G: *A. hastatum*, tutte le sottospecie a eccezione di "*litorale*" e "*patulum*") — basso Friuli, Triestino.

Halimione Aellen

H. portulacoides (L.) Aellen (G: *Atriplex portulacoides*; M: *Obione portulacoides*) — litorale friulano, Istria.

Kochia Roth

K. scoparia (L.) Schrad. — coltivata, talvolta inselvatichita.

Bassia All.

B. hirsuta (L.) Asch. — litorale friulano or. (Grado, Belvedere).

Arthrocnemum Moq.

A. fruticosum (L.) Moq. (G, M: *Salicornia fruticosa*) — *litorale friulano, Istria.*

A. glaucum (Delile) Ung. — Sternb. — litorale friulano, Istria.

Salicornia L.

S. veneta Pign. & Lausi (G, M: *S. herbacea*) — litorale friulano (lagune di Grado e Marano).

Suaeda Forsk. ex Scop.

S. maritima (L.) Dum. — litorale friulano, Istria.

Salsola L.

S. soda L. — litorale friulano, Istria

S. kali L.

subsp. *kali* (G: *S. kali* subsp. *typica* subsp. *tragus* (L.) Čelak.) — litorale friulano, Istria, resta da chiarire la distribuzione delle sottospecie.

Halogeton C. A. Meyer

H. sativus (L.) Moq. — antiche segnalazioni dal basso Friuli, da controllare.

AMARANTHACEAE

Celosia L.

C. argentea L.

var. *cristata* (L.) O. Kuntze — coltivata in Friuli e in Carnia.

Amaranthus L.

A. caudatus L. — coltivato in Friuli e in Carnia.

A. hypochondriacus L. — Friuli or., Triestino, spontaneizzato.

A. hybridus L. s. s. (F: *A. cruentus*; G: *A. retroflexus* subsp. *chlorostachys* et *patulus*; M: *A. patulus*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Triestino, Istria, spontaneizzato.

A. cruentus L. s.s. (F, G: *A. paniculatus*) — coltivato e subsponaneo in Friuli e in Carnia.

A. retroflexus L. (G: *A. retroflexus* subsp. *typicus*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria, avventizio naturalizzato.

A. albus L. — basso Friuli, Triestino, spontaneizzato.

A. graecizans L. (M: *A. sylvestris*) — dal mare all'alto Friuli, Goriziano, Carso, Istria.

A. deflexus L. — dal mare all'alto Friuli, Goriziano, Triestino, Istria, avventizio naturalizzato.

A. lividus L. (G: *A. ascendens*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Triestino, Istria.

PHYTOLACCACEAE

Phytolacca L.

P. americana L. (G: *Ph. decandra*) — avventizia naturalizzata dal mare all'alto Friuli, Goriziano, Triestino, Istria.

NYCTAGINACEAE

Mirabilis L.

M. jalapa L. — coltivata e talvolta inselvatichita (Grado).

PORTULACACEAE

Phytolacca L.

P. americana L. (G: *Ph. decandra*) — avventizia naturalizzata dal mare all'alto Friuli, Goriziano, Triestino, Istria.

NYCTAGINACEAE

Mirabilis L.

M. jalapa L. — coltivata e talvolta inselvatichita (Grado).

PORTULACACEAE

Portulaca L.

P. oleracea L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria L.

- A. grandiflora* L. — Alpi Giulie (da controllare).
A. huteri Kern. — Prealpi Carniche occ.
A. biflora L. — Alpi Carniche
A. ciliata L. — Alpi Carniche.
A. serpyllifolia L. (G: *A. serpyllifolia* subsp. *typica*) — dal mare alla regione montana inf.
A. leptoclados (Rchb.) Guss. (G: *A. serpyllifolia* subsp. *tenuior*) — basso Friuli, bacino medio del Natisone, Istria (Salvore).
A. marschlinsii Koch (G: *A. serpyllifolia* subsp. *alpina*) — Carnia (M. Cretabianca), ma da controllare.

Moehringia L.

- M. trinervia* (L.) Clairv. — dal Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
M. tommasinii March. — Istria (Val Rosandra, antro di Ospò).
M. muscosa L. — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
M. ciliata (Scop.) DT. — regione montana.

Minuartia L.

- M. hybrida* (Vill.) Schischkin (G, M: *Alsine tenuifolia*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano.
M. mediterranea (Ledeb.) K. Maly (G: *Alsine tenuifolia* subsp. *arvatica*) — Goriziano (Gradisca).
M. recurva (All.) Schinz & Thell. (G: *Alsine verna* subs. *recurva*) — Alpi Carniche occ.
M. graminifolia (Ard.) Jáv. — Prealpi Clautane (M. Dolada, cf. Cimolais).
M. rupestris (Scop.) Schinz & Thell. — Alpi Carniche occ.
M. cherlerioides (Hoppe) Becherer (G: *Alsine aretioides*) — regione montana.
M. austriaca (Jacq.) Hayek (G: *Alsine austriaca*) — regione montana.
M. verna (L.) Hiern (F: *M. verna* subsp. *collina*; M: *Alsine verna*) — Carso.
M. gerardii (Willd.) Hayek (F: *M. verna* subsp. *verna*; G: *Alsine verna* subsp. *typica*) — regione montana.
M. capillacea (All.) Graebn. (G, M: *Alsine laricifolia*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Carso (M. Sidavnik presso Sežana).
M. sedoides (L.) Hiern (M: *Alsine cherleria*) — regione montana.

Stellaria L.

- S. nemorum* L.
 subsp. *nemorum* — regione montana, Gorizia, Carso, Istria;
 subsp. *glochidisperma* Murb. — Prealpi Clautane (Prescudin), Valli del Natisone (Drenchia).
S. media (L.) Vill. (M: *S. media* subsp. *typica*) — dal mare alla regione montana.
S. pallida (Dum.) Piré (G, M: *S. apetala*) — dal mare alla regione montana inf., Triestino.
S. holostea L. — alto Friuli, Goriziano, Carso.
S. alsine Grimum (G: *S. uliginosa*) — Alpi Carniche.
S. graminea L. — alto Friuli, Goriziano, Carso.

Pseudostellaria Pax

- P. europaea Schaeftlein (G: *Stellaria bulbosa*) — Alpi Carniche (Maganins), Prealpi Giulie (M. Campeon sopra Artegna), Goriziano (M. Quarin).

Holosteum L.

- H. umbellatum L. — Goriziano.

Cerastium L.

- C. cerastoides (L.) Britton (G: *C. trigynum*) — regione montana.
C. tomentosum L. — coltivato e talvolta inselvatichito.
C. arvense L.
 subsp. arvense — regione montana;
 subsp. strictum (L.) Gaudin (G: *C. arvense* var. *strictum*) — regione montana.
C. alpinum L. (G: *C. alpinum* var. *glanduliferum* et *lanatum* p.p.) — Alpi e Prealpi Carniche.
C. uniflorum (G: *C. alpinum* subsp. *latifolium*) — Alpi e Prealpi Carniche.
C. carinthiacum Vest
 subsp. carinthiacum (G: *C. alpinum* subsp. *carinthiacum*) — regione montana;
 subsp. austroalpinum (Kunz) Kunz (G: *C. alpinum* subsp. *typicum*) — regione montana.
C. subtriflorum (Rchb.) Pach. — Alpi e Prealpi Giulie, Prealpi Carniche (M. Chiarandei).
C. sylvaticum W. & K. — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
C. fontanum Baumg. (F: *C. fontanum* subsp. *fontanum*; G: *C. triviale* var. *glandulosum*) — regione montana.
C. holosteoides Fries emend. Hyl. (F: *C. fontanum* subsp. *triviale*; G: *C. triviale* subsp. *typicum*; M: *C. viscosum*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
C. brachypetalum Pers. (incl. subsp. *tauricum* (Spreng.) Murb.) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
C. tenoreanum Ser. (F: *C. brachypetalum* subsp. *tenoreanum*) — Friuli, Carso.
C. glomeratum Thuill. (M: *C. glomeratum*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
C. ligusticum Viv. (G: *C. campanulatum*) — Monfalcone (antica segnalazione che va ricontrollata).
C. semidecandrum L. (G: *C. semidecandrum* subsp. *typicum*) — basso Friuli, Goriziano, Carso, Istria.
C. pumilum Curtis (F: *C. pumilum* subsp. *pallens*) — Carso, Istria (Strugnano).
C. glutinosum Fries (M: *C. semidecandrum* subsp. *glutinosum*) — basso Friuli, bacino medio del Natisone, Goriziano, Carso, Istria.

Myosoton Moench

- M. aquaticum (L.) Moench (G, M: *Malachium aquaticum*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Triestino (Zaule), Istria.

Sagina L.

- S. saginoides (L.) Karsten (G: *S. Linnaei*) — regione montana.

S. procumbens L. (G: *S. procumbens* subsp. *typica*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

S. apetala Ard. (G: *S. procumbens* subsp. *apetala*) — dall'alto Friuli alla regione montana.

Scleranthus L.

S. annuus L. (G: *S. annuus* subsp. *cymosus*) — dall'alto Friuli alla regione montana.

S. polycarpus L. (F: *S. annuus* subsp. *polycarpus*) — Alpi Carniche (M. Paularo).

S. verticillatus Tausch (F, G: *S. annuus* subsp. *verticillatus*) — regione montana.

Paronychia Mill.

P. kapela (Hacq.) Kern. — Monfalcone, antica segnalazione mai più confermata.

Herniaria L.

H. glabra L. — Triestino, Carso, Istria.

H. hirsuta L. (G: *H. glabra* subsp. *hirsuta*) — Goriziano (Monfalcone).

Polycarpon Loefl. ex L.

P. tetraphyllum (L.) L. — basso Friuli, Goriziano, Triestino, Istria.

Spergula L.

S. arvensis L. — regione montana.

Spargularia (Pers.) J. & K. Presl.

S. media (L.) K. Presl (G: *S. rubra* subsp. *media*; M: *S. marginata*) — littorale friulano, Istria.

S. marina (L.) Griseb. (G: *S. rubra* subsp. *marina*; M: *S. salina*) — littorale friulano, Istria.

S. rubra (L.) J. & K. Presl (G: *S. rubra* subsp. *campestris*) — littorale friulano or. (Grado), Trieste.

Lychnis L.

L. coronaria (L.) Desr. — coltivata.

L. flos-cuculi L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso.

L. viscaria L. — Alpi Carniche (M. Paularo, Sutrio, Rigolato), Carso (M. Cocusso, Vremščica).

Agrostemma L.

A. githago L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Silene L.

S. italica (L.) Pers. — Carso, Istria.

S. nutans L. — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

S. otites (L.) Wibel — littorale friulano or. (Grado), Carso, Istria.

S. vulgaris (Moench) Garcke

subsp. *vulgaris* (G: *S. vulgaris* subsp. *vesicaria*; M: *S. Cucubalus*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria;

subsp. *angustifolia* (Mill.) Hayek (G: *S. vulgaris* var. *angustifolia* p.p.) — Goriziano (Grado), Triestino, Istria;

- subsp. *antelopum* (Vest) Hayek (F: *S. vulgaris* subsp. *commutata*; G: *S. vulgaris* subsp. *vesicaria* var. *commutata*) — regione montana;
subsp. *glareosa* (Jord.) Marsden-Jones & Turrill (G: *S. vulgaris* subsp. *alpina*) — regione montana.
- S. *saxifraga* L. — regione montana, Carso (Val Rosandra).
S. *acaulis* (L.) Jacq. (F: *S. acaulis* subsp. *longiscapa*; G: *S. acaulis* var. *pedunculosa*) — regione montana.
S. *exscapa* All. (F: *S. acaulis* subsp. *acaulis*; G: *S. acaulis* var. *exscapa*) — regione montana.
S. *rupestris* L. — regione montana.
S. *pusilla* W. & K. (G: *S. quadrifida* subsp. *typica*) — regione montana.
S. *veselskyi* (Janka) Bégl. (G: *S. quadrifida* subsp. *veselskyi*) — Alpi Carniche occ. (Val Rinaldo, Comelico), Prealpi Clautane (Val Cimoliana, Val Settimana).
S. *alpestris* Jacq. — regione montana.
S. *alba* (Mill.) E.H.L.Krause (G, M: *Lychnis alba*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
S. *armeria* L. — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano.
S. *noctiflora* L. — Carnia, Triestino.
S. *dioica* (L.) Clairv. (G: *Lychnis rubra*) — regione montana.
S. *cretica* L. — avventizia in Friuli e in Carnia.
S. *coeli-rosa* (L.) Godr. — avventizia a Gradisca e a Trieste.
S. *linicola* C.C.Gmel. — avventizia nel Triestino.
S. *pendula* L. — coltivata in Friuli e in Carnia.
S. *dichotoma* Ehrh. — avventizia nel Triestino.
S. *gallica* L. — Friuli, Triestino.
S. *conica* L. — Alpi Carniche occ. (Dosoledo), Triestino, ma probabilmente estinta.

Drypis L.

- D. *spinosa* L. (S: *S. spinosa*)
subsp. *jacquiniana* Murb. & Wettst. — Triestino.

Gypsophila L.

- G. *repens* L. — regione montana.

Saponaria L.

- S. *pumila* Janch. ex Hayek (F: *S. pumilio*) — Alpi Carniche occ. (M. Cavallino, Col Quaternà).
S. *ocymoides* L. — regione montana.
S. *officinalis* L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Vaccaria Wolf

- V. *hispanica* (Hill) Rauschert (G: *Saponaria Vaccaria*; M: *Vaccaria parviflora*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Triestino.

Petrorhagia (Ser.) LK.

- P. *saxifraga* (L.) Lk. (G, M: *Tunica saxifraga*) — dal basso Friuli alla regione montana inf.

(—900 m), Goriziano, Carso, Istria.

- P. prolifera* (L.) Ball & Heyw. — dal mare (Grado) all'alto Friuli (Castions di Strada), Goriziano (Grojna), Istria.

Dianthus L.

- D. seguieri* Vill. — segnalato dal Friuli, ma indicazione probabilmente priva di fondamento.
- D. barbatus* L. — dall'alto Friuli (bosco Romagno) alla regione montana, Goriziano (Collio).
- D. monspessulanus* L.
subsp. *monspessulanus* (G: *D. monspessulanus* subsp. *typicus*) — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria;
subsp. *waldsteinii* (Sternb.) Nyman (F, G: *D. monspessulanus* subsp. *sternbergii*) — regione montana.
- D. alpinus* L. — regione montana (Carnia), ma dubbio.
- D. sylvestris* Wulf.
subsp. *sylvestris* (G: *D. Caryophyllus* subsp. *typicus*, *virgineus*, *inodorus*, *pygmeus*) — regione montana;
subsp. *tergestinus* (Rchb.) Hayek — Carso, Istria.
- D. superbus* L. — dal mare (Mulino di Sdobba, Is. Morosini) all'alto Friuli (Aviano, Buttrio).
- D. deltoides* L. — Alpi Carniche (Ca.ra Meledis).
- D. armeria* L. — dal mare (Aquileia: Canal delle Mee) all'alto Friuli (Polcenigo), Carso (Orlek), Istria (Salvore).
- D. ferrugineus* Mill.
subsp. *liburnicus* (Bartl.) Tutin (G: *D. Carthusianorum* subsp. *Balbisii*; M: *D. liburnicus*) — basso Friuli (Muzzana) e Friuli or. (Rocca Bernarda), Goriziano, Carso.
- D. sanguineus* Vis. — alto Friuli, Carso, Istria.

RANALES **NYMPHAEACEAE**

Nymphaea L.

- N. alba* L. — alto Friuli (S. Daniele, Sequals, Ospedaletto), Carso (Percedol).

Nuphar Sm.

- N. lutea* (L.) Sm. — alto Friuli (S. Daniele), Goriziano (Lisert).

CERATOPHYLLACEAE

Ceratophyllum L.

- C. demersum* L. (G: *C. demersum* subsp. *typicum*) — alto Friuli, Goriziano.
- C. submersum* L. (G: *C. demersum* subsp. *submersum*) — Friuli.

RANUNCULACEAE

Helleborus L.

H. odoratus W. & K. ex Willd.

subsp. laxus (Host) Merxm. & Podl. (G: *H. viridis* subsp. *typicus*, *Bocconei*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano.

H. multifidus Vis.

subsp. istriacus (Schiffn.) Merxm & Podl. (M: *H. dumetorum*) — Carso, Istria.

H. niger L. — regione montana.

Callianthemum C.A.Mey.

C. anemonoides (J. Zahlbr.) Endl. ex Heynh. — Alpi Carniche (versante austriaco del Plöcken), segnalazione di Wolfert (1911).

Nigella L.

N. arvensis L. — dal Triestino, ma probabilmente estinta.

N. damascena L. — coltivata.

Trollius L.

T. europaeus L. — regione montana.

Isopyrum L.

Isopyrum thalictroides L. — Friuli or. (Valli del Natisone), Goriziano, Triestino, Istria.

Actaea L.

A. spicata L. — regione montana, Goriziano, Carso.

Caltha L.

C. palustris L. — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

Aconitum L.

A. vulparia Rchb. (G, M: *A. Lycoctonum* var. *vulparia*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

A. lamarckii Rchb. (incl. *A. ranunculifolium* Rchb., *A. platanifolium* Degen ex Geyer) (G: *A. Lycoctonum* p.p.) — regione montana.

A. anthora L. — Valcanale, da verificare, Carso.

A. variegatum L. (G: *A. variegatum* subsp. *Cammarum*; M: *A. Cammarum*) — Goriziano (rive dell'Isonzo fra Gorizia e Salcano), Carso, Istria.

A. paniculatum Lam. (G: *A. variegatum* subsp. *paniculatum*) — regione montana.

A. angustifolium Bernh. ex Rchb. — Prealpi Giulie (Matajûr, M.Mia, Drenchia, Le Zuffine).

A. napellus L.

subsp. tauricum (Wulf.) Gáyer (G: *A. Napellus*) — regione montana.

Delphinium L.

D. fissum W. & K. — Carso (Veliko Gradišče, Škocjan).

Consolida (DC.) S.F.Gray

- C. ajacis (L.) Schur (F: *C. ambigua*; G,M: *Delphinium ajacis*) — coltivato e avventizio.
 C. regalis S.F.Gray (G, M: *Delphinium Consolida*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Anemone L.

- A. nemorosa L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
 A. trifolia L. — litorale friulano (Grado) e dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano (Collio, Vallone: Sablici, Pietrarossa, S.Michele).
 A. ranunculoides L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
 A. narcissiflora L. — regione montana inf. (Prealpi Giulie, Prealpi Clautane).
 A. baldensis L. — regione montana.
 A. hortensis L. — Istria (Isola, Pirano).

Hepatica Mill.

- H. nobilis Mill. (G: *Anemone Hepatica*; M: *Anemone triloba*) — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

Pulsatilla Mill.

- P. alpina (L.) Delabre (G: *Anemone alpina* subsp. *typica*) — regione montana.
 P. apiifolia (Scop.) Schult. (F: *P. alpina* subsp. *apiifolia*; G: *Anemone alpina* subsp. *sulphurea*; et var. *apiifolia*) — Alpi Carniche occ. (da Giogo Veranis a Col Quaternà).
 P. montana (Hoppe) Rchb. (G: *Anemone Pulsatilla* subsp. *typica* et *pratensis*; M: *Anemone Pulsatilla*) — alto Friuli, Goriziano (Sabotino), Carso, Istria.
 P. vernalis (L.) Mill. — Alpi Carniche (Plöcken, C.ra Pramiosio, sotto F.la Fontana Fredda, M. Zermula, Col Quaternà).

Clematis L.

- C. flammula L. — basso Friuli, Triestino, Istria.
 C. vitalba L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
 C. viticella L. — basso Friuli, Goriziano, Triestino, Istria.
 C. integrifolia L. — basso Friuli, Goriziano, avventizia.
 C. alpina (L.) Mill. — regione montana.

Adonis L.

- A. annua L. (G: *A. annuus* subsp. *autumnalis*; M: *A. autumnalis*) — basso Friuli (Palmanova), Goriziano (Sagrado, Monfalcone).
 A. aestivalis L. (G: *A. annuus* subsp. *aestivalis*) — basso Friuli (Villaraspa, Gonars), Goriziano (Monfalcone), antiche segnalazioni che meriterebbero conferma.
 A. microcarpa DC. — Triestino, (cf. Pospichal, "Flora d. österr. Küstenlandes", 2:80[1898]).

Ranunculus L.

- R. velutinus Ten. — Goriziano (Doberdò), Istria (Capodistria).
 R. nemorosus DC. (G: *R. polyanthemos* subsp. *nemorosus*) — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
 R. repens L. — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

- R. lanuginosus* L. — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso.
- R. acris* L.
 subsp. *acris* — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
 subsp. *friesianus* (Jord.) Rouy & Fouc. — Istria (Slavnik).
- R. carinthiacus* Hoppe (G: *R. geraniifolius* subsp. *typicus* var. *gracilis*) — regione montana.
- R. montanus* Willd. (G: *R. geraniifolius* subsp. *montanus*) — regione montana.
- R. venetus* Huter ex Landolt — Prealpi Clautane, Prealpi Giulie.
- R. oreophilus* MB. (M: *R. Villarsii* DC.) — Carso (Vremščica), Istria (Slavnik).
- R. neapolitanus* Tell. — Istria, Goriziano (Doberdò).
- R. bulbosus* L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- R. sardous* Cr. — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
- R. muricatus* L. — basso Friuli, Istria.
- R. arvensis* L. — dal mare all'alto Friuli, Goriziano, Carso, Istria.
- R. parviflorus* L. — litorale friulano or. (Grado), Goriziano (Monfalcone, Capriva).
- R. chius* DC. — Triestino, Istria.
- R. illyricus* L. — Carso.
- R. auricomus* L. (G: *R. cassubicus* subsp. *auricomus*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso. Nell'ambito di *Ranunculus auricomus* sarebbero presenti nel Friuli-Venezia Giulia e nei territori vicini le seguenti agamospecie (specie elementari): *R. palaeoeuganeus* Pign. (Nogaro), *R. gortanii* Pign. basso Friuli, *R. aesontinus* Pign. (Friuli or.: S. Pietro al Natisone, Goriziano: Oslavia), *R. pospichalii* Pign. (Carso: Škocjan), (cf. Pignatti, Gior. Bot. Ital., 110 (3):203, 1976).
- R. cassubicus* L. — Prealpi Giulie, Goriziano.
- R. sceleratus* L. — litorale friulano or. (Grado).
- R. ficaria* L.
 subsp. *nudicaulis* (Kern.) Hegi (F: *R. ficaria* subsp. *calthifolius*; M: *R. calthaeifolius*) — Carso, Istria;
 subsp. *bulbifer* (Marsden — J.) Lawalrée — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria;
 subsp. *ficaria* (G: *R. Ficaria* subsp. *typicus*; M: *R. Ficaria*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria, ma probabilmente confuso con il precedente;
 subsp. *ficariiformis* (F. W. Schultz) Rouy & Fouc. (G: *R. Ficaria* subsp. *ficariaeformis*) — basso Friuli e Friuli or., Istria (Strugnano).
- R. hybridus* Bria (G: *R. hybridus* et *R. Thora*) — regione montana.
- R. alpestris* L. (G: *R. alpester* subsp. *typicus* et subsp. *Traunfellneri* p.p.) — regione montana.
- R. traunfellneri* Hoppe (G: *R. alpester* subsp. *Traunfellneri* p.p.) — regione montana or. (Alpi Giulie, Alpi Tolmezzine).
- R. aconitifolius* L. — Alpi Carniche (M. Paularo, Ca.ra Pramiosio, Ca.ra Razzo).
- R. platanifolius* L. (G: *R. aconitifolius* p.p.) — regione montana, ma molto più frequente del precedente.
- R. seguieri* Vill. — Alpi Carniche.
- R. glacialis* L. — Alpi Carniche occ.
- R. flammula* L. — dal mare all'alto Friuli (Collalto, S.Daniele), Goriziano, Istria.

- R. *lingua* L. — Friuli (Paradiso, Fagagna), Goriziano (Pietrarossa).
 R. *ophioglossipholius* Vill. — basso Friuli, antiche segnalazioni che andrebbero ricontrollate.
 R. *pyreneus* L.
 subsp. *plantagineus* (All.) Rouy & Fouc. — Alpi Carniche occ. (Monti di Volaja, Croda Nera, M. Cavallino).
 R. *baudoti* Godron (G: *R. aquatilis* subsp. *Baudoti*) — basso Friuli (Pradizziolo).
 R. *peltatus* Schrank (G: *R. aquatilis* subsp. *diversifolius* var. *triphyllus*) — Goriziano (Monfalcone alla Pineda sinistra).
 R. *aquatilis* L. — Istria.
 R. *tricophyllus* Chaix (G: *R. aquatilis* subsp. *trichophyllus* et *paucistamineus*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano (Collio), Triestino, Istria.
 R. *circinatus* Sibth. (G: *R. aquatilis* subsp. *foeniculaceus*) — Goriziano (laghi di Doberdò e di Pietrarossa).
 R. *fluitans* Lam. — Goriziano (Monfalcone), segnalazione che andrebbe ricontrollata.

Aquilegia L.

- A. *vulgaris* L. (G: *A. vulgaris* subsp. *typica*) — Alpi Carniche occ. (Val Talagona, Valgrande, Pala Sappadina), trattasi probabilmente della specie seguente. Talvolta coltivata e rinselvatichita (castello di Strassoldo nel basso Friuli).
 A. *atrata* Koch (G: *A. vulgaris* subsp. *atroviolacea*) — regione montana.
 A. *nigricans* Baumg. — presente forse nelle Alpi Giulie occ., Carso (Vremščica).
 A. *einseleana* F.W.Schultz (G: *A. pyrenaica* subsp. *Einseleana*) — dall'alto Friuli (greti del Meduna e del Cellina) alla regione montana.
 A. *thalictrifolia* Schott & Kotschy (G: *A. pyrenaica* subsp. *thalictrifolia*) — indicata dalle Prealpi Carniche, ma da accogliere in forma dubitativa.

Thalictrum L.

- T. *aquilegifolium* L. — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano (Collio), Carso, Istria.
 T. *alpinum* L. — Alpi Carniche (Palon di Pizzul, Cima Valsessa).
 T. *foetidum* L. (G: *Th. foetidum* subsp. *typicum*) — Prealpi Clautane (Ciòl di Mont in Val Meluzzo, Vallone di S.Maria in Val Cimoliana).
 T. *minus* L.
 subsp. *minus* (G: *Th. foetidum* subsp. *minus*) — regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria;
 subsp. *majus* (Cr.) Rouy & Fouc. (G: *Th. foetidum* subsp. *elatum*) — dall'alto Friuli (Pradamano) alla regione montana, indicazioni che andrebbero ricontrollate;
 subsp. *saxatile* Gaud. — Alpi Carniche occ. (P.M.Croce del Comelico).
 T. *simplex* L.
 subsp. *simplex* (G: *Th. angustifolium* subsp. *simplex*) — Prealpi Clautane (Val Cellina), antica segnalazione da ricontrollare;
 subsp. *bauhinii* (Cr.) Tutin (G: *Th. angustifolium* subsp. *bauhinii*) — Friuli or. (S.Pietro al Natisone), regione montana.

subsp. *galiioides* (Nestl.) Borza (G: *Th. angustifolium* var. *galiioides*) — regione montana (Valcaldà, Forni di Sopra).

T. lucidum L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano.

T. morisonii C.C. Gmel. (G: *Th. angustifolium* subsp. *exaltatum*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., ma è probabile che corrisponda a *Th. lucidum* non segnalato da Gortani.

T. flavum L. (G: *Th. angustifolium* subsp. *flavum*) — dall'alto Friuli (S. Daniele) alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

PAEONIACEAE

Paeonia L.

P. officinalis L. (G: *P. officinalis* subsp. *foemina* et *peregrina*; M: *P. peregrina*) — Prealpi, Goriziano, Carso, Istria.

P. mascula (L.) Mill. (G: *P. officinalis* subsp. *mascula*; M: *P. corallina*) — Prealpi Carniche (Meduno e Peonis), Carso (Lipica, Cocusso, Orlek).

BERBERIDACEAE

Epimedium L.

E. alpinum L. — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano (Plessiva, Lucinico, Vallone).

Berberis L.

B. vulgaris L. — dal basso Friuli alla regione montana (—1400 m), Goriziano, Carso, Istria.

Mahonia Nutt.

M. aquifolium (Pursh) Nutt. — coltivata

LAURACEAE

Laurus L.

L. nobilis L. — coltivato diffusamente nella regione montana inf., talvolta spontaneizzato (M. Glemina sopra Gemonà), forse spontaneo nel Goriziano (abisso Bonetti nel Vallone), Triestino, Istria (Osopo).

MAGNOLIACEAE

Magnolia L.

M. grandiflora L. — coltivata.

Liriodendron tulipifera L. — coltivato.

CALYCANTHACEAE

Chimonanthus Lindley

C. praecox (L.) Link — coltivato.

RHOEADALES
PAPAVERACEAE

Papaver L.

- P. somniferum* L. (incl. subsp. *hortense* Huss.) — coltivato e talvolta subspontaneo.
P. rhoeas L. — dal basso Friuli alla regione montana inf. (*Verzegnig*, *Cedarchis*), Goriziano, Carso, Istria.
P. dubium L. — Friuli or. (Spessa di Cividale).
P. argemone L. (G: *P. hybridum* subsp. *Argemone*) — basso Friuli, Goriziano, Carso, Istria.
P. hybridum L. (G: *P. hybridum* subsp. *typicum*; M: *Roemeria hybrida*) — Goriziano (Cormons), Triestino.
P. rhaeticum Ler. ex Greml. (G: *P. alpinum* subsp. *Burseri* var. *decipiens* et subsp. *pyrenaicum*) — regione montana.
P. julicum E. May. & Merxm. (F: *P. alpinum* subsp. *ernesti-mayeri*; G: *P. alpinum* subsp. *Burseri*) — Alpi Giulie (gruppo del Canin), Alpi di Moggio (Crête di Gleris, M. Cjavalis).
P. kernerii Hayek — Alpi Carniche (catena di spartiacque), la sua effettiva presenza nella flora regionale resta ancora dubbia.

Glaucium Mill.

- G. flavum* Cr. (M: *G. luteum*) — litorale friulano, Triestino, Istria.

Chelidonium L.

- C. majus* L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Corydalis Vent.

- C. ochroleuca* Koch — Carso (Divača, Matavun), Istria (Osop).
C. cava (L.) Schweigg. & Koerte (G: *C. bulbosa*) — dal basso Friuli (Passariano) alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
C. intermedia (L.) Méral (G: *C. solida* subsp. *intermedia*) — Alpi Carniche (conca di Tolmezzo), Carso.
C. solida (L.) Clairv. (G: *C. solida* subsp. *typica*) — regione montana, Carso.
C. lutea (L.) DC. — antica segnalazione dal M. Cavallo di Aviano risalente allo Zannichelli (1726) non più confermata.

Fumaria L.

- F. capreolata* L. — Istria (Sezza in valle di Sicciole), antica segnalazione che andrebbe confermata.
F. officinalis L. — dal basso Friuli alla regione montana inf. (—900 m).
F. vaillantii Loisel. (G: *F. officinalis* subsp. *Vaillantii*) — Udine, Carso.
F. parviflora Lam. (G: *F. officinalis* subsp. *parviflora*) — Udine.

CAPPARIDACEAE

Capparis L.

C. spinosa L. — Triestino (costiera, Duino), Istria (Strugnano, Pirano).

BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

Sisymbrium L.

S. irio L. — Goriziano, avventizio, da verificarne l'attuale presenza.

S. loeselii L. — Triestino, avventizio, da verificarne l'attuale presenza.

S. altissimum L. — Udine, Alpi Carniche occ.

S. orientale L. (G, M: *S. Columnae*) — Goriziano, Triestino, avventizio.

S. officinale (L.) Scop. — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

Descurainia Webb & Berth.

D. sophia (L.) Webb ex Prantl (M: *D. Sophia*) — Alpi Carniche occ. (Candide), Prealpi Clautane (Val Zemola), Triestino, ma quivi probabilmente estinta.

Alliaria Scop.

A. petiolata (MB.) Cavara & Grande (G, M: *A. officinalis*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Arabidopsis Heynh.

A. thaliana (L.) Heynh. (G: *A. Thaliana*; M: *Sisymbrium Thalianum*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Triestino, Istria.

Myagrum L.

M. perfoliatum L. — basso Friuli, Goriziano, Carso, Istria.

Bunias L.

B. erucago L. — basso Friuli (Castions, Orgnano), Carso, Istria.

Erysimum L.

E. sylvestre (Cr.) Scop. (G: *E. hieracifolium* subsp. *lanceolatum* et *helveticum*) — regione montana.

E. odoratum Ehrh. (G: *E. hieracifolium* subsp. *pannonicum*) — Friuli or. (Manzano, Oleis, Cividalese), Prealpi Giulie (M. Cumieli, M. Chiampon).

E. repandum L. — Triestino, avventizio.

E. cheiri (L.) Cr. (M: *Cheiranthus Cheiri*) — Gorizia (Castello), Triestino (Duino e costiera), spontaneizzato.

Hesperis L.

H. matronalis L. (G: *H. matronalis* subsp. *matronalis*) — coltivata in Friuli e spesso spontaneizzata.

H. candida Kit. ex Hayek (F: *H. matronalis* subsp. *candida*; G: *H. matronalis* var. *euganea*) — Alpi Carniche, Prealpi Giulie (M. Plauris, Stupizza, Pradolino).

Matthiola R. Br. corr. Spreng.

M. incana (L.) R. Br. — Triestino (costiera, Duino).

M. fruticulosa (L.) Maire

subsp. *valesiaca* (J. Gray ex Boiss.) P. W. Ball (G: *M. tristis* subsp. *valesiaca*) —

alto Friuli (magredi) e regione montana inf. (alta Val del Bût nel bacino del T. Pontaiba).

Barbarea R. Br.

- B. vulgaris R. Br. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
B. verna (Mill.) Asch. — Alpi Carniche occ. (P. di M. Croce, Col Quaternà).

Rorippa Scop.

- R. austriaca (Cr.) Bess. — Goriziano (Vallone), Triestino, avventizia di recente introduzione.
R. amphibia (L.) Bess. (G: *Nasturtium amphibia*) — Friuli (Latisana, S. Daniele), antiche segnalazioni risalenti al Suffren e al Pirona che andrebbero controllate.
R. sylvestris (L.) Bess. (G, M: *Nasturtium sylvestre*) — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
R. palustris (L.) Bess. em. Jons. (F: *R. islandica*) — Prealpi Clautane (Val Cimoliana), Alpi Carniche (Ca.ra Festons in conca di Sauris).
R. pyrenaica (Lam.) Rchb. — Alpi Carniche (Peralba), antica indicazione del Pirona che andrebbe confermata.
R. lippizensis (Wulf.) Rchb. (G, M: *Nasturtium lippicense*) — Alpi Carniche (Stazione della Carnia) forse avventizia da confermare, Carso.

Armoracia G., M. & Sch.

- A. rusticana G., M. & Sch. (G: *Nasturtium Armoracia*; *Cochlearia Armoracia*) — coltivato e talvolta rinselvatichito.

Nasturtium R. Br.

- N. officinale R. Br. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Dentaria L.

- D. bulbifera L. (F: *Cardamine bulbifera*) — regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
D. heptaphylla Vill. (F: *Cardamine heptaphylla*; M: *D. pentaphylla* subsp. *pinnata*) — alto Friuli (M. di Ragnogna, Vito d'Asio), antiche segnalazioni risalenti al Suffren che andrebbero verificate.
D. pentaphyllos L. (F: *Cardamine pentaphylla*; G: *D. pentaphyllos* subsp. *digitata*) — regione montana inf.
D. enneaphyllos L. (F: *C. enneaphyllos*) — regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

Cardamine L.

- C. trifolia L. — dall'alto Friuli (Polcenigo, Romagno) alla regione montana, Goriziano (boschi di Plessiva).
C. amara L. — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso.
C. matthioli Moretti (G: *C. pratensis* subsp. *Hayneana*) — Alpi Carniche (Dosoledo, Candide, Pramollo).
C. pratensis L. (G: *C. pratensis* subsp. *typica*) — basso Friuli, Goriziano (paludi di Castelletto, M. Quarin).
C. resedifolia L. — regione montana.
C. alpina Willd. (F: *C. bellidifolia* subsp. *alpina*) — Alpi Carniche occ. (M. Cavallino, La Pitturina).

- C. *parviflora* L. — litorale friulano or. (Grado).
 C. *impatiens* L. — litorale friulano (Grado), regione montana, Goriziano, Carso.
 C. *hirsuta* L. — dal mare alla regione montana inf. (—900 m), Goriziano, Carso, Istria.

Cardaminopsis (C.A.Mey.) Hayek

- C. *arenosa* (L.) Hayek (M: *Arabis arenosa*) — Carso, Istria.
 C. *halleri* (L.) Hayek
 subsp. *ovirens* (Wulf.) Hegi & Schmid (G: *Arabis Halleri*) — Prealpi Carniche,
 Alpi Carniche (Ca.ra Festons in conca di Sauris), Tarvisiano.

Arabis L.

- A. *glabra* (L.) Bernh. — Alpi Carniche (Amariana, Val Degano, Val del Bût a Zuglio).
 A. *pauciflora* (Grimm) Garcke — regione montana (M. Verzegnis, Amariana, Chiampon).
 A. *planisilqua* (Pers.) Rchb. — distribuzione ignota nel suo complesso, esemplari raccolti nelle Alpi Carniche (Val Pesarina) sembrerebbero corrispondere a detta entità.
 A. *sagittata* (Bertol.) DC. (M: *A. hirsuta* var. *sagittata*) — Triestino, Carso, distribuzione ancora mal nota nel suo insieme, quasi certamente presente anche nel resto della regione.
 A. *hirsuta* (L.) Scop. (G: *A. hirsuta* subsp. *typica*; M: *A. hirsuta* p.p.) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
 A. *ciliata* Clairv. (F: *A. corymbiflora*; G: *A. hirsuta* subsp. *ciliata*) — regione montana.
 A. *serpillifolia* Vill. — Prealpi Giulie (malga Campo), antica segnalazione risalente al Pirona che andrebbe controllata.
 A. *vochinensis* Spreng. — Alpi Giulie, Prealpi Clautane (M. Cavallo di Aviano).
 A. *caerulea* All. — Alpi Giulie (M. Canin), Alpi Carniche occ. (Peralba, Cavallino, Palombino).
 A. *pumila* Jacq. — regione montana.
 A. *soyeri* Reut. & Huet
 subsp. *subcoriacea* (Gren.) Breistr. (F: *A. soyeri* subsp. *jacquinii*; G: *A. bellidifolia*) — Alpi Carniche occ. (Giogo Veranis, Peralba, laghi d'Olbe, Valvisdende, Palombino, Cavallino).
 A. *alpina* L. — regione montana.

Lunaria L.

- L. *rediviva* L. — regione montana, Carso (Dane presso Divača).
 L. *annua* L. — coltivata.

Peltaria Jacq.

- P. *alliacea* Jacq. — Istria (Hrastovlje).

Aurinia Desv.

- A. *petraea* (Ard.) Schur (F: *Alyssum petraeum*; G: *Alyssum saxatile* subsp. *petraeum*)
 — Prealpi Giulie (M. Glemina) e Prealpi Carniche (S. Simeone, Covria).

Alyssum L.

- A. *alyssoides* (L.) L. (G, M: *A. calycinum*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
 A. *desertorum* Stapf. — litorale friulano or. (Grado), da controllare.

- A. *wulfenianum* Bernh. — Alpi Giulie.
 A. *ovirense* Kern. — Alpi Giulie, Prealpi Clautane (M. Pramaggiore).
 A. *montanum* Kern. — regione montana inf. (Prealpi Carniche: falde inf. del M. Cavallo presso Aviano), Goriziano, Carso, Istria.
 A. *alpestre* L. — antica segnalazione del Brumati per la Carnia, quasi sicuramente priva di fondamento.

Berberoa DC.

- B. *incana* (L.) DC. — Goriziano, Triestino, avventizia.

Lobularia Desv.

- L. *maritima* (L.) Desv. — coltivata e talvolta rinselvatichita.

Draba L.

- D. *aizoides* L. (incl. D. *affinis* Host, presente forse nelle Alpi Giulie occ.) (G: D. *aizoides* subsp. *typica*) — regione montana.
 D. *hoppeana* Rchb. (G: D. *aizoides* subsp. *Zahlbruckneri*) — regione montana.
 D. *carinthiaca* Hoppe — Alpi Carniche (Zermula, Volaja, Clapsavon).
 D. *dubia* Suter (G: D. *tomentosa* subsp. *laevipes*) — regione montana.
 D. *tomentosa* Clairv. (G: D. *tomentosa* subsp. *typica*) — regione montana.
 D. *hladnizensis* Wulf. — Alpi Carniche (Creta Verde dei Fleons).

Erophila DC.

- E. *verna* (L.) Chevall. (F: E. *verna* subsp. *verna*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Petrocallis R. Br.

- P. *pyrenaica* (L.) R. Br. — regione montana (Alpi e Prealpi Giulie, Prealpi Clautane: Teverone, M. Cavallo di Aviano).

Kernera Med.

- K. *saxatilis* (L.) Rchb. (G: *Cochlearia saxatilis*) — regione montana.

Camelina Cr.

- C. *sativa* (L.) Cr. (G: *Chamaelina sativa* subsp. *typica*) — coltivata.
 C. *microcarpa* Andrz. ex DC.
 subsp. *sylvestris* (Wallr.) Hiit. (G: *Chamaelina sativa* subsp. *sylvestris*) — Goriziano (Cormons).

Neslia Desv.

- N. *paniculata* (L.) Desv. — Friuli, Triestino, Goriziano.

Capsella Med.

- C. *bursa-pastoris* (L.) Med. (G: C. *bursa-pastoris* subsp. *typica*) — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
 C. *rubella* Reut. (G: C. *bursa-pastoris* subsp. *rubella*, M: C. *bursa-pastoris* var. *rubella*) — Friuli, Carso, Istria.

Hutchinsia R. Br.

H. alpina (L.) R. Br.

subsp. *alpina* — regione alpina;

subsp. *brevicaulis* (Hoppe) Arc. (G: *H. alpina* var. *brevicaulis*) — regione montana;

subsp. *austroalpina* Trpin — Alpi Giulie.

Hymenolobus Nutt. ex Torr. & Gray

H. pauciflorus (Koch) Schinz & Thell. — regione montana (Prealpi Clautane; Val Cimoliana; Alpi Giulie: Val Resia).

Hornungia Rchb.

H. petraea (L.) Rchb. (G, M: *Hutchinsia petraea*) — Carso, Istria.

Thlaspi L.

T. arvense L. — regione montana inf., Goriziano, Carso.

T. alliaceum L. — pur non presentandosi in regione è prossimo ai suoi confini sudorientali (Montona in Istria).

T. perfoliatum L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

T. praecox Wulf. (G: *Th. montanum* subsp. *praecox*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

T. montanum L. (G: *Th. montanum* subsp. *typicum*) — indicazione del Pirona per Monfalcone che va riferita alla specie precedente.

T. sylvium Gaudin (F: *Thlaspi alpinum* subsp. *sylvium*; G: *Th. alpinum* var. *sylvium*) — trattasi di indicazione spuria che si riferisce probabilmente a individui albinici di *Th. rotundifolium*.

T. alpinum Cr. — indicato dal Pirona per il Peralba, cf. osservazione precedente.

T. minimum Ard. (F: *Th. kernerii*; G: *Th. montanum* subsp. *alpinum* var. *Kernerii*) — Prealpi Giulie (Chiampon, Musi, Zajavor) e Prealpi Carniche (T. Viellia, M. Raut, M. Cavallo d'Aviano).

T. rotundifolium (L.) Gaudin

subsp. *rotundifolium* — regione montana;

subsp. *cepaefolium* (Wulf.) Rouy & Fouc. (G: *Th. rotundifolium* var. *cepaefolium*) — Alpi Giulie (Vallone di Rio Freddo, M. Re).

Aethionema R. Br.

A. saxatile (L.) R. Br. — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

Iberis L.

I. amara L. — coltivata.

I. intermedia Guers. — Prealpi Carniche (M. Jôf di Maniago), Carso, Istria.

I. umbellata L. — coltivata e talvolta inselvaticata.

Biscutella L.

B. laevigata L. (incl. diverse subsp.) — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano

(Sabotino), Carso (Val Rosandra), Istria.

Lepidium L.

- L. campestre* (L.) R. Br. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
L. sativum L. — coltivato e talvolta inselvaticito, avventizio.
L. virginicum L. — distribuzione mal conosciuta, avventizio.
L. ruderale L. — dal mare all'alto Friuli, Goriziano, Carso, Istria.
L. perfoliatum L. — Triestino, sporadico.
L. graminifolium L. (G: *L. Iberis* var. *graminifolium*) — dal mare all'alto Friuli, Goriziano, Triestino, Istria.

Cardaria Desv.

- C. draba* (L.) (G, M: *Lepidium Draba*) — dal mare all'alto Friuli, Goriziano, Carso, Istria.

Conringia Fabr.

- C. orientalis* (L.) Dum. (M: *Erysimum orientale*) — vecchie segnalazioni dal Goriziano e dal Carso che attendono riconferma.

Diplotaxis DC.

- D. tenuifolia* (L.) DC. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
D. muralis (L.) DC. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Brassica L.

- B. elongata* Ehrh. — nel Triestino, avventizia ma non più confermata.
B. oleracea L. — coltivata e inselvaticita.
B. napus L. — coltivata e inselvaticita.
B. rapa L. (G: *B. campestris*) — coltivata e inselvaticita.
B. nigra (L.) Koch (M: *B. sinapioides*) — segnalata dal Triestino, ma da tempo non più raccolta.
B. glabrescens Poldini — alto Friuli (magredi del Cellina e Meduna, letto del Tagliamento presso Portis).

Sinapis L.

- S. arvensis* L. (G: *Brassica Sinapistrum*) — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
S. alba L. — basso Friuli, Goriziano, Triestino, avventizia.

Eruca Mill.

- E. sativa* Mill. (F: *E. vesicaria* subsp. *sativa*) — coltivata e inselvaticita.
E. palustre (Pir.) Vis. (G: *Brassica palustris*) — basso Friuli in sinistra Tagliamento.

Cakile Mill.

- C. maritima* Scop.
subsp. *aegyptiaca* (Willd.) Nyman (G: *C. maritima*) — litorale friulano, Triestino, Istria.

Rapistrum Cr.

- R. perenne* (L.) All. — Goriziano e Triestino, avventizia.

R. rugosum (L.) All. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Triestino, Istria.

Crambe L.

C. tataria Sebéok — alto Friuli (magredi del Cellina e del Meduna).

Calepina Adans.

C. irregularis (Asso) Thell. (M: *C. Corvini*) — Friuli or. (bassa valle dello Iudrio), Goriziano (Collio), Carso, Istria.

Raphanus L.

R. sativus L. — coltivato.

R. raphanistrum L. (F: *R. raphanistrum* subsp. *raphanistrum*; G: *R. Raphanistrum* subsp. *typicus*) — dal mare alla regione montana inf.

R. landra Moretti ex DC. (F, G: *R. raphanistrum* subsp. *Landra*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Triestino, (S. Giovanni di Duino).

RESEDACEAE

Reseda L.

R. phyteuma L. — basso Friuli (Castions di Strada) e Friuli or. (Cividale), Goriziano (Monfalcone), Istria, da verificare l'attuale consistenza.

R. odorata L. — coltivata.

R. lutea L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

SARRACENIALES

DROSERACEAE

Drosera L.

D. rotundifolia L. — dal basso Friuli (Gonars, Codroipo, Flambro, fra Flumignano e Torsa, molto compromessa dalle bonifiche) alla regione montana.

D. anglica Huds. (G: *D. longifolia*) — Alpi Carniche (P.M.Croce Comelico, Valcalda).

D. intermedia Hayne — alto Friuli (fra Collalto e Bueris), Goriziano (Castelletto, ma probabilmente estinta a opera delle bonifiche).

ROSALES

CRASSULACEAE

Sempervivum L.

S. wulfenii Hoppe ex Mert. & Koch — Alpi Carniche (Valvisdende, Col Quaternà, Cretabianca, Zermula).

S. arachnoideum L. — Alpi Carniche.

S. montanum L. — Alpi Carniche.

S. tectorum L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Jovibarba Opiz

J. arenaria (Koch) Opiz — Alpi Carniche (Valvisdende, V. Digon, Cavallino, Crostis,

Paularo).

J. hirta (L.) Opiz (G: *Sempervivum hirtum* et var. *soboliferum*) — Alpi Carniche.

Sedum L.

S. maximum (L.) Hofm. (F: *S. telephium* subsp. *maximum*) — regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

S. telephium L. — le indicazioni dalle Alpi Carniche (Rigolato, Forni Av., Sigilletto) in Gortani si riferiscono probabilmente alla specie precedente.

S. rupestre L.

subsp. *erectum* t'Hart — Carso (Aurisina).

S. montanum Song & Perr.

subsp. *orientale* t'Hart (G, M: *S. rupestre*) — regione montana inf. (Prealpi Carniche, Goriziano, Carso, Istria).

S. acre L. (G: *S. sexangulare* subsp. *acre*) — regione montana inf. (Val Aupa, Collina, Costa Robbia), Goriziano (Vallone), Carso.

S. sexangulare L. emend. Grimm. (G: *S. sexangulare* subsp. *mite*; M: *S. mite*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

S. alpestre Vill. — Alpi Carniche.

S. album L. — regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

S. dasyphyllum L. — regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

S. atratum L.

subsp. *atratum* — regione montana;

subsp. *carinthiacum* (Hoppe ex Pacher) D.A. Webb — distribuzione mal nota.

S. annuum L. — regione montana.

S. hispanicum L. — regione montana

Rhodiola L.

R. rosea L. (G: *Sedum roseum*) — regione montana.

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga L.

S. stellaris L.

subsp. *alpigena* Temesy (G: *S. stellaris*) — regione montana.

S. cuneifolia L. — regione montana.

S. rotundifolia L. — regione montana.

S. aspera L. (G: *S. bryoides* subsp. *aspera*) — Alpi Carniche.

S. bryoides L. (G: *S. bryoides* subsp. *typica*) — Alpi Carniche.

S. tridactylites L. (G: *S. tridactylites* subsp. *typica*) — regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

S. adscendens L. (G: *S. tridactylites* subsp. *adscendens*) — regione montana.

S. petraea L. — Friuli or. (Valli del Natisone), Carso (Škocjan).

S. aizoides L. — regione montana.

S. tenella Wulf. — Alpi Giulie, Alpi Carniche (Amariana).

S. androsacea L. — regione montana.

- S. sedoides* L.
 subsp. *sedoides*
 var. *sedoides* — regione montana;
 var. *tomentosa* Zenari — Prealpi Clautane, Clapsavon.
S. hohenwartii Sternb. (G: *S. sedoides* var. *Hohenwartii*) — Alpi Giulie.
S. moschata Wulf. — regione montana.
S. oppositifolia L. — regione montana.
S. burserana L. — regione montana.
S. caesia L. (G: *S. caesia* subsp. *typica*) — regione montana.
S. squarrosa Sieb. (G: *S. caesia* subsp. *squarrosa*) — regione montana.
S. crustata Vest. — regione montana, Goriziano (Sabotino), Carso (Škocjan).
S. paniculata Mill. (G: *S. Aizoon* subsp. *typica*) — regione montana.
S. hostii Tausch (G: *S. Aizoon* subsp. *Hostii*) — regione montana.
S. mutata L. — Alpi Carniche (Val Frison).

Chrysosplenium L.

- C. alternifolium* L. — regione montana, Carso.

PARNASSIACEAE

Parnassia L.

- P. palustris* L. — dal basso Friuli alla regione montana.

HYDRANGEACEAE

Philadelphus L.

- P. coronarius* L. — coltivato e inselvaticito.

Hydrangea L.

- H. hortensis* Sm. — coltivata.

GROSSULARIACEAE

Ribes L.

- R. rubrum* L. — coltivato e talvolta inselvaticito.
R. petraeum Wulf. — Alpi Carniche (P. M. Croce Comelico, Col Quaternà, Zoncolan, Malga Lôsa, Malins, Lateis).
R. ūva-crispa L. emend. Lam. (incl. *R. grossularia* L. e *R. reclinatum* L.) (G: *R. Grossularia*) — Alpi Carniche, talvolta spontaneo, coltivato e talvolta inselvaticito, Carso.
R. alpinum L. — Alpi Carniche, Istria (Slavnik).

PITTOSPORACEAE

Pittosporum Banks & Solander ex Gaerter

- P. tobiria* (Thunb.) Aiton — coltivato.

PLATANACEAE

Platanus L.

P. hybrida Brot. (*P. orientalis* sensu Gortani non L., p.max.p.) — coltivato.

ROSACEAE

Spiraea L.

S. salicifolia L. — coltivata e talvolta naturalizzata (Polcenigo, Goriziano).

S. decumbens Koch

subsp. *decumbens* (G: *S. lancifolia* subsp. *decumbens*) — regione montana;

subsp. *tomentosa* (Poech) Dostál (G: *S. lancifolia* subsp. *typica*) — Prealpi Carniche occ.

S. japonica L. fil. — coltivata.

S. chamaedryfolia L. (G: *S. chamaedryfolia* subsp. *ulmifolia*; M: *S. ulmifolia*) — Friuli or. (Valli del Natisone, M. Mia), Carso (Val della Raša).

S. media Franz Schmidt — Istria (Slavnik).

S. cana W. & K. — indicata dal M. Cavallo di Aviano, cf. Huber in Hegi. Ill. Fl. Mitteleur. 4(2):225—304, 1964, da verificare.

Aruncus L.

A. dioicus (Walter) Fernald (G, M: *Spiraea Aruncus*) — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

Filipendula Mill.

F. ulmaria (L.) Maxim.

subsp. *ulmaria* (G, M: *Spiraea Ulmaria*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria;

subsp. *denudata* (J. & K. Presl) — Alpi Carniche, distribuzione mal nota.

F. vulgaris Moench (G, M: *Spiraea Filipendula*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Kerria DC.

K. japonica (L.) DC. — coltivata.

Rubus L.

R. saxatilis L. — regione montana.

R. idaeus R. — regione montana.

R. nessensis W. Hall (G: *R. fruticosus* subsp. *suberectus*) — Alpi Carniche (fra i monti Dobis e Deverdalse, Rigolato, Forni di Sopra).

R. sulcatus Vest s.lat. (G: *R. fruticosus* subsp. *sulcatus*) — regione montana (Carnia: Costa Robbia), Goriziano (M. Quarin, Prevali), Carso.

R. macrophyllus Weihe & Nees — Goriziano.

R. bifrons Vest ex Tratt. (incl. *R. trifolius* Pospichal) — Goriziano (S. Floriano, Quisca, Borgnano), Triestino.

R. procerus P.J.Müll. (F: *R. discolor* Weihe & Nees; G: *R. fruticosus* subsp.

- macrostemon*; M: *R. macrostemon*) — regione montana (Verzegnis, Tolmezzo, Rivalpo), Goriziano, Carso.
- R. *candicans* Weihe & Nees (incl. *R. fragrans* Focke e *R. thyrsanthus* Focke) (G: *R. fruticosus* subsp. *thyrsoides*) — Goriziano (Collio), Triestino (Duino).
- R. *canescens* DC. (G: *R. fruticosus* subsp. *tomentosus* p.p. et *collinus*) — litorale friulano, Goriziano, Triestino.
- R. *gremlii* Focke — Goriziano (Collio).
- R. *radula* Weihe (G: *R. fruticosus* subsp. *radula*) — regione montana, da controllare l'effettiva presenza in regione.
- R. *flexuosus* P.J.Mill & Lef. (G: *R. fruticosus* subsp. *saltuum*) — Alpi Carniche (Givigliana), da controllarne l'effettiva presenza in regione.
- R. *pallidus* Weihe & Ness (F: *R. glandulosus*; G: *R. fruticosus* subsp. *pallidus*) — regione montana, Goriziano.
- R. *koehlerii* Weihe & Nees — cf. regione montana.
- R. *schleicheri* Weihe — Goriziano (Cormons, Prevali, Lucinico).
- R. *bellardii* Weihe & Nees (F: *R. glandulosus*; G: *R. fruticosus* subsp. *bellardii*) — regione montana, da accogliere dubitativamente.
- R. *hirtus* W. & K. s.lat. (G: *R. fruticosus* subsp. *hirtus*) — regione montana.
- R. *caesius* L. — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

Rosa L.

- R. *sempervirens* L. — basso Friuli (Aquileia), Triestino (costiera), Istria.
- R. *arvensis* Huds. — dal basso Friuli alla regione montana inf. (—1000m), Goriziano, Carso, Istria.
- R. *pimpinellifolia* L. (M: *R. gentilis* et *pimpinellifolia*) — Carso (Cocusso, Vremštica), Istria (Sidavnik), le indicazioni del Brumati dal Monfalconese con ogni probabilità sono destituite di qualsiasi fondamento.
- R. *glauca* Pourr. non al. (G: *R. rubrifolia*; M: *R. ferruginea*) — regione montana, Carso.
- R. *pendulina* L. (G: *R. alpina*) — regione montana.
- R. *gallica* L. — basso Friuli (Nogaro, S.Giorgio) e Friuli or. (valli del Natisone), Goriziano, Carso, Istria.
- R. *canina* L. — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
- R. *andegavensis* Bast. (G: *R. canina* subsp. *andegavensis*; M: *R. canina* subsp. *hispidula* var. *Andegavensis*) — regione montana inf. (Carnia: Casanova), Goriziano, Triestino.
- R. *vosagiaca* Desp. (*R. glauca* subsp. *coriifolia*) — regione montana (Casera Razzo).
- R. *obtusifolia* Desf. (G, M: *R. tomentella*) — Goriziano (Collio), Carso, Istria.
- R. *corymbifera* Borkh. (G: *R. canina* subsp. *dumetorum*; M: *R. dumetorum*) — regione montana (Carnia: Magnanins), Triestino, Istria.
- R. *tomentosa* Sm. — regione montana.
- R. *villosa* L. (G: *R. villosa* subsp. *pomifera*) — Alpi Carniche.
- R. *rubiginosa* L. — Goriziano (Monfalcone), antica segnalazione del Brignoli.
- R. *agrestis* Savi (M: *R. sepium*) — Carso, Istria.
- R. *micrantha* Borr. ex Sm. — dal mare (Grado) alla regione montana inf. (Carnia: Magnanins, Givigliana).

Agrimonia L.

- A. eupatoria L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria. Andrebbe verificata la presenza della subsp. *grandis* (Andrz. ex Asch. & Gr.) Bornm.

Aremonia Neck. ex Nestl.

- A. agrimonioides (L.) DC. — regione montana (M. Candole — gruppo del M. Cavallo di Aviano, altipiano di Lauco in Carnia, Friuli or.), Carso, Istria.

Sanguisorba L.

- S. officinalis L. (G: *Poterium officinale*) — dal mare all'alto Friuli (Artegna, Fagagna), Goriziano, Carso, Istria.
S. minor Scop.
subsp. *minor* (G: *Poterium Sanguisorba* subsp. *minor*) — dall'alto Friuli (Udine) alla regione montana inf. (Tolmezzo), Friuli or. (Valli del Natisone);
subsp. *muricata* Briq. (G: *Poterium Sanguisorba* subsp. *polygamum*; M: *Poterium muricatum*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Dryas L.

- D. octopetala L. — dall'alto Friuli (greti del Meduna e del Cellina) alla regione montana.

Geum L.

- G. reptans L. — Alpi Carniche.
G. montanum L. — Alpi Carniche.
G. rivale L. — regione montana.

Potentilla L.

- P. palustris (L.) Scop. — Alpi Carniche.
P. anserina L. — Alpi Giulie (Resiutta, Pontebba, Val Raccolana).
P. rupestris L. — Alpi Carniche occ. (Candide, Val Digon sul M. Spina), Tarvisiano, Collio.
P. argentea L. — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
P. inclinata Vill. (M: *P. canescens*) — Carso (Farnetto, Lipica).
P. norvegica L. — Alpi Giulie (Val Raccolana).
P. recta L., (incl. P. pedata Nestl.) (G: *P. hirta*; M: *P. laeta*) — basso Friuli, Goriziano, Carso, Istria.
P. brauneana Hoppe (G: *P. verna* subsp. *minima*) — Alpi Carniche (Tudaio di Razzo, C.ra Montemaggiore).
P. crantzii (Cr.) Beck ex Fritsch (G: *P. verna* subsp. *salisburgensis*) — regione montana.
P. aurea L. — regione montana.
P. australis Krašan (G: *P. verna* subsp. *opaca*) — regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
P. pusilla Host (G: *P. verna* subsp. *Tabaernemontani*, *hirsuta* et *Gaudini*; M: *P. verna*) — regione montana inf.
P. arenaria Borkh. (G: *P. opaca*) — regione montana inf., Goriziano.
P. tommasiniana F.W.Schultz (F: *P. cinerea* p.p.; G: *P. subacaulis* subsp. *incana* et

- cinerea*; M: *P. subacaulis* var. *tommasiniana*) — Goriziano (Peci, Sabotino), Carso, Istria.
P. erecta (L.) Räuschel (M: *P. tormentilla*) — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
P. reptans L. — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
P. caulescens L. — regione montana inf.
P. nitida L. — regione montana.
P. alba L. — regione montana inf., Goriziano, Carso.
P. micrantha Ramond ex DC. — regione montana (Alpi Carniche: alta Val Degano e Valcalda; valli del Natisone e dello Iudrio), Carso.

Sibbaldia L.

- S. procumbens* L. (G: *Potentilla Sibbaldi*) — Alpi Carniche.

Fragaria L.

- F. vesca* L. (G: *F. vesca* subsp. *typica*) — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
F. moschata Duchesne (G: *F. vesca* subsp. *elatior*; M: *F. elatior*) — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
F. viridis Duchesne (G: *F. vesca* subsp. *collina*; M: *F. collina*) — basso Friuli e Valli del Natisone, Goriziano, Carso, Istria.

Duchesnea Sm.

- D. indica* (Andrews) Focke (G: *Fragaria indica*) — Friuli, Goriziano, Trieste (Cologna, Verniellis, Villa Necker), avventizia stabilmente insediata.

Alchemilla L.

- A. alpina* L. — regione montana.
A. plicatula Gdgr.s.str. — regione montana.
A. splendens Christ ex Favrat — Alpi Carniche, da controllare.
A. glaucescens Wallr. emend. Sav. (G: *A. vulgaris* subsp. *hybrida* var. *galucescens*) — Alpi Carniche.
A. flabellata Buser (G: *A. vulgaris* subsp. *hybrida* var. *flabellata*) — Alpi Carniche.
A. cinerea Buser — regione montana.
A. colorata Buser (G: *A. vulgaris* subsp. *hybrida* var. *colorata*) — regione montana.
A. exigua Buser — regione montana.
A. monticola Opiz — regione montana.
A. strigosula Buser — Alpi Carniche.
A. subcrenata Buser (G: *A. vulgaris* subsp. *alpestris* var. *subcrenata*) — Alpi Carniche.
A. gracilis Opiz — regione montana.
A. xanthochlora Rothm. — regione montana.
A. undulata Buser — regione montana.
A. connivens Buser (G: *A. vulgaris* subsp. *alpestris* var. *connivens*) — regione montana.
A. obtusa (Buser) Buser — Alpi Carniche occ.
A. coriacea Buser — Alpi Carniche.
A. impexa Buser — Alpi Carniche occ.
A. glabra Neygenf. (G: *A. vulgaris* subsp. *alpestris* var. *genuina*) — regione montana.

- A. straminea Buser — Alpi Carniche occ.
- A. semisecta Buser — regione montana.
- A. fallax Buser — regione montana.
- A. pyrenaica Dufour — regione montana.
- A. fissa Günth. & Schum. (G: *A. vulgaris* subsp. *fissa*) — regione montana.

Aphanes L.

- A. arvensis L. (G, M: *Alchemilla arvensis*) — alto Friuli (Udine, Lestans), Istria (Valle della Dragogna).

Chaenomeles Lindley

- C. speciosa (Sweet) Nak. — coltivata.

Cydonia Mill.

- C. oblonga Mill. — coltivata.

Pyrus L.

- P. pyraeaster Burgsd. (incl. P. achras Gaertn.) (G: *P. communis* subsp. *Achras*; M: *P. communis*) — regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- P. spinosa Forsk. (M: *P. amygdaliformis*) — Istria (Strugnano, Isola, Valle della Dragogna).
- P. communis L. — coltivato.

Malus Mill.

- M. sylvestris Mill. (G: *Pyrus Malus* subsp. *sylvestris*) — regione montana inf., Carso, Istria.
- M. dasycphylla Borkh. (G: *Pyrus Malus* subsp. *dasycphylla*) — le località delle Alpi Carniche vanno controllate (V. Frison, V. Talagona, V. Sesis), Carso, talvolta coltivata.
- M. domestica Borkh. — coltivata.

Sorbus L.

- S. domestica L. (G: *Pyrus domestica*) — spontaneo nel Friuli or. (Bosco Romagno) e nel Triestino, coltivato altrove.
- S. aucuparia L. (G: *Pyrus Aucuparia*)
subsp. *aucuparia* — regione montana;
subsp. *glabrata* (Wimm. & Grab.) Caj. — regione montana, Alpi Carniche (Cresta del Palombino, Cresta alta di Mimosias), Alpi Giulie (M. Poviz).
- S. torminalis (L.) Cr. (G: *Pyrus torminalis*) — alto Friuli (Polcenigo, Buttrio), Goriziano, Carso, Istria.
- S. chamae — mespilus (L.) Cr. (G: *Pyrus Chamaemespilus*) — regione montana.
- S. aria (L.) Cr. (G: *Pyrus aria*) — regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Eriobotrya Lindley

- E. japonica (Thunb.) Lindley — coltivato.

Amelanchier Med.

- A. ovalis Med. (G: *A. vulgaris*) — regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

Cotoneaster Med.

- C. integerrimus* Med. (G: *C. integerrima* subsp. *vulgaris*; M: *C. vulgaris*) — Alpi Carniche occ. (P.so Monte Croce Comelico).
C. tomentosus Lindl. (G: *C. nebrodensis*) — regione montana, Carso, Istria.

Pyracantha M.J. Roemer

- P. coccinea* Roem. (G: *Crataegus pyracantha*) — coltivato.

Mespilus L.

- M. germanica* L. — Carso, Istria, coltivato altrove e quivi talvolta subspontaneo.

Crataegus L.

- C. laevigata* (Poir.) DC. (G, M: *C. oxyacantha*) — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
C. monogyna Jacq. — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
C. azarolus L. — coltivata.

Prunus L.

- P. persica* (L.) Batsch (M: *Persica vulgaris*) — coltivato.
P. dulcis (Mill.) D.A. Webb. (G: *Prunus Amygdalus*; M: *Amygdalus communis*) — coltivato.
P. armeniaca L. — coltivato.
P. cerasifera Ehrh. var. *pissardii* (Carr.) Bailey — coltivato.
P. spinosa L. — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
P. domestica L.
 subsp. *domestica* (G: *P. domestica* subsp. *oeconomica* et *Claudiana*; M: *P. domestica*) — coltivato;
 subsp. *insititia* (L.) O.K. Schneid (M: *P. insititia*) — coltivato e talvolta inselvatichito in Friuli.
P. avium L. — regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria e coltivato.
P. cerasus L. — coltivato.
P. mahaleb L. — regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
P. padus L. — dal basso Friuli (Pordenone, Nogaro) alla regione montana (Alpi Carniche occ.: falde occ. del Col Quaternà; fra Sappada e Forni, ecc.; anfiteatro morenico; Tarvisiano).
P. laurocerasus L. — coltivato.

FABACEAE LEGUMINOSAE

Cercis L.

- C. siliquastrum* L. — Triestino (costiera), Istria, anche coltivato.

Acacia Willd.

- A. dealbata* Link — coltivato.

Gleditsia L.

- G. triacanthos* L. — coltivato.

Sophora L.

S. japonica L. — coltivato.

Laburnum Med.

L. anagyroides Med. (G: *Cytisus Laburnum* subsp. *Linnaeanus*; M: *Cytisus Laburnum*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, talvolta coltivato e inselvatichito.

L. alpinum (Mill.) Bercht & J. Presl. (G; M: *Cytisus alpinus*) — regione montana.

Lembotropis Griseb.

L. nigricans (L.) Griseb.

subsp. *mediterraneus* (Pant.) Holub (G; M: *Cytisus nigricans* var. *australis*) — Carso, Istria;

subsp. *nigricans* (G; M: *Cytisus nigricans*) — regione montana inf., Goriziano, Carso.

L. emeriflorus (Rchb.) Scalička (F: *Cytisus emeriflorus* Rchb.) — Prealpi Carniche.

Cytisus L.

C. pseudoprocumbens Markgr. (G: *Genista pedunculata* subsp. *diffusa*; M: *Genista diffusa*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

C. scoparius (L.) Lk. — coltivato.

Chamaecytisus Link

C. purpureus (Scop.) Lk. (G, M: *Cytisus purpureus*) — alto Friuli, regione montana inf., Carso.

C. hirsutus (L.) Lk.

subsp. *hirsutus* (G: *Cytisus hirsutus* subsp. *typicus*; M: *Cytisus hirsutus*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria;

subsp. *polytrichus* (MB.) E. May. (G: *Cytisus hirsutus* subsp. *prostratus*) — Alpi Carniche (M. Paularo, Dimon, Cas. Varmost), Carso, Istria.

C. supinus (L.) Lk. (G: *Cytisus hirsutus* subsp. *supinus*; M: *Cytisus supinus*) — Friuli, regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Genista L.

G. tinctoria L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

G. januensis Viv. (M: *G. triangularis*) — Carso (Val Rosandra).

G. sericea Wulf. — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

G. pilosa L. — Goriziano (Collio), Carso, Istria.

G. sylvestris Scop. — Carso, Istria.

G. germanica L. (G: *G. germanica* subsp. *typica et inermis*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

G. radiata (L.) Scop. — regione montana.

G. holopetala (Fleischm. ex Koch) Bald. (M: *Cytisus holopetalus*) — Carso (Val Rosandra).

Chamaespartium Adans.

C. sagittale (L.) Gibbs (G: *Genista sagittalis*; M: *Cytisus sagittalis*) — Friuli, Carnia, Goriziano, Carso.

Spartium L.

- S. junceum* L. — littorale friulano or. (Grado alla Pineda), Goriziano (Brazzano), Triestino, Istria.

Lupinus L.

- L. angustifolius* L. — coltivato.
L. albus L. — coltivato.
L. polyphyllus Lindl. — coltivato.

Argyrolobium Ecklon & Zeyher

- A. zanonii* (Turra) P.W. Ball (G, M: *Cytisus argenteus*) — Goriziano (Vallone), Carso, Istria.

Robinia L.

- R. pseudacacia* L. — coltivata e subspontanea.

Wisteria Nutt.

- W. sinensis* (Sims) Sweet — coltivata.

Galega L.

- G. officinalis* L. — dal basso Friuli alla regione montana inf. (Tolmezzo), Goriziano, Triestino (foci del Timavo), Istria.

Colutea L.

- C. arborescens* L. — Carso, Istria.

Astragalus L.

- A. cicer* L. — Alpi Carniche, Goriziano.
A. purpureus Lam. subsp. *gremlii* (Burnat) Asch. & Gr. (G: *A. hypoglottis* subsp. *Gremlii*) — Alpi Carniche (Val Pesarina, M. Tersadia, Tolmezzo, Formeaso).
A. frigidus (L.) A. Gray — antica indicazione per la Carnia, da controllare.
A. penduliflorus Lam. — Alpi Carniche.
A. depresus L. — Alpi Giulie (Mangart).
A. australis (L.) Lam. — regione montana (Prealpi Clautane, Alpi Carniche: Pic Cjadin, Peralba, Pleros, Creta di Aip).
A. glycyphyllos L. — dal basso Friuli (Nogaro) alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
A. onobrychis L. — dal basso Friuli alla regione montana inf. (R. Orteglâs, sotto la Tersadia), Goriziano, Carso.
A. leontinus Wulf. — Alpi Carniche (Colle di S. Giorgio di Comeglians, Enemonzo).
A. monspessulanus L. subsp. *illyricus* (Bernh.) Chater (M: *A. illyricus*) — Triestino, Istria.
A. vesicarius L.
subsp. *carniolicus* (Kern.) Chater (M: *A. vesicarius* et var. *Pastellianus*) — Carso, Istria.
var. *albus* Beck. — Prealpi Giulie (Plauris, Chiampon, M. Glemina).

- L. heterophyllus* L. — Alpi Carniche occ. (Comelico, Dosoleto).
L. sphaericus Retz. — basso Friuli (Ornacco, Udine), Goriziano, Carso, Istria.
L. setifolius L. — Goriziano (Medea), Carso, Istria.
L. cicera L. (G: *L. cicera* subsp. *typicus*) — coltivato.
L. sativus L. (G: *L. cicera* subsp. *sativus*) — coltivato.
L. annuus L. — Istria (S. Dorligo, Villa Decani).
L. hirsutus L. — basso Friuli, Triestino, Istria.
L. nissolia L. — Friuli, Goriziano, Carso, Istria.
L. aphaca L. — dall'alto Friuli alla regione montana inf. (Tolmezzo, Forni di Sopra), Triestino, Istria.

Pisum L.

- P. sativum* L.
 subsp. *sativum* (incl. *P. arvense*) (G: *P. sativum* subsp. *typicum* et *arvense*; M: *P. sativum* et *P. arvense*) — coltivato.
 subsp. *elatius* (MB.) Asch. & Gr. (M: *P. elatius*) — Istria (Osop, Muggia).

Ononis L.

- O. natrix* L. — alto Friuli (Savico, Roveredo in Piano in loc. Brentella).
O. reclinata L. — Istria (S. Pietro ad Isola).
O. pusilla L. (M: *O. Columnae*) — Goriziano (Vallone), Triestino, Istria.
O. spinosa L.
 subsp. *spinosa* — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria;
 subsp. *antiquorum* (L.) Arc. (M: *O. spinosa* var. *antiquorum*) — Goriziano (Grado, Monfalcone), da controllare.
 subsp. *austriaca* (Beck.) Gams (G: *O. spinosa* subsp. *mitis*) — regione montana (piana di Tolmezzo, Passo M. Croce Comelico, Val Frisone).

Melilotus Mill.

- M. altissima* Thuill. (M: *M. macrorrhiza*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Istria (Sicciolo, Capodistria).
M. alba Med. (G: *M. officinalis* subsp. *alba*) — dal mare alla regione montana (Paularo, Forni di Sopra), Goriziano, Carso, Istria.
M. officinalis (L.) Pall. (G: *M. officinalis* subsp. *Petitpierreana*) — dal basso Friuli alla regione montana inf. (Pesariis, Forni di Sopra), Goriziano, Carso, Istria.
M. indica (L.) All. — basso Friuli, Triestino, Istria (Strugnano, Capodistria, Sicciolo).

Trigonella L.

- T. corniculata* (L.) L. — litorale friulano (Belvedere di Aquileia), Triestino (S. Sabba), Istria (Buje).
T. gladiata Stev. ex MB. — Goriziano (Monfalcone e Gradisca), da controllare.

Medicago L.

- M. lupulina* L. — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
M. sativa L. (G: *M. sativa* subsp. *typica*) — coltivata e rinselvatichita fino alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

- M. falcata* L. (G: *M. sativa* subsp. *falcata*) — dal basso Friuli alla regione montana (Paularo, Rigolato), Goriziano, Carso, Istria.
- M. × varia* Martyn (G: *M. sativa* subsp. *varia*) — dal basso Friuli alla regione montana inf. (—750 m.).
- M. prostrata* Jacq. — dal Friuli alla regione montana (—500 m. Dobis, Strabùt), Goriziano, Carso, Istria.
- M. orbicularis* (L.) Bartal. — Goriziano, Triestino, Istria.
- M. carstiensis* Jacq. — regione montana inf. (Amariana, Cazzaso, Paluzza), Goriziano, Carso.
- M. marina* L. — litorale friulano (da Caorle a Monfalcone).
- M. truncatula* Gaertn. — vecchia indicazione per Monfalcone, da confermare.
- M. rigidula* (L.) All. — Istria (Isola, Pirano).
- M. pironae* Vis. — Prealpi Giulie (Matajur, M. Quarnan, M. Glemina, Maniaglia), Prealpi Clautane (Costa Colovan), Goriziano (Sabotino).
- M. littoralis* Rhode ex Loisel. — litorale Friulano (da Lignano a Porto Buso).
- M. arabica* (L.) Huds. — Triestino, Istria (Strignano).
- M. nigra* (L.) Krock. (F: *M. polymorpha*; G: *M. hispida*) — Triestino, Istria.

Trifolium L.

- T. montanum* L. — Friuli, regione montana (—1800 m.), Goriziano, Carso, Istria.
- T. repens* L. — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
- T. pallescens* Schreb. (G: *T. repens* subsp. *pallescens*) — regione montana.
- T. thalii* Vill. — Alpi Carniche.
- T. hybridum* L.
subsp. *hybridum* (G: *T. hybridum* subsp. *typicum*) — dal mare alla regione montana, Goriziano;
subsp. *elegans* (Savi) Asch. & Gr. (M: *T. elegans*) — Goriziano (Isola Morosini, Staranzano, Cormons), Triestino (Rojano).
- T. nigrescens* Viv. — litorale friulano or. (Grado), Triestino, Istria.
- T. fragiferum* L. — dal mare alla regione montana inf. (Tolmezzo, Cedarchis, Zuglio), Triestino, Istria.
- T. resupinatum* L. — Istria (S. Pietro d'Isola).
- T. badium* Schreb. — regione montana.
- T. patens* Schreb. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- T. aureum* Pollich — Alpi Carniche.
- T. campestre* Schreb. — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
- T. striatum* L. — Goriziano (Merna), Carso, Istria.
- T. arvense* L. — dal Friuli alla regione montana (—1150 m. Givigliana), Carso, Istria.
- T. scabrum* L. — dal mare all'alto Friuli (Ospedaletto), Goriziano, Carso, Istria.
- T. dalmaticum* Vis. — Istria (Valle della Dragogna).
- T. stellatum* L. — alto Friuli (Tricesimo), Goriziano (Medea, Monfalcone), Istria (S. Pietro d'Isola).
- T. incarnatum* L.
subsp. *incarnatum* — coltivato e talvolta naturalizzato in Friuli e Goriziano;
subsp. *molineri* (Balb. ex Hornem.) Syme (M, G: *T. incarnatum* var. *Molineri*) — Carso, Istria.

- T. pratense* L.
 subsp. *pratense* (F: *T. pratense* var. *pratense*; G: *T. pratense* subsp. *typicum*) — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria;
 subsp. *sativum* (Schreb.) Schübl. (F: *T. pratense* var. *sativum*) — spesso coltivato, dal mare alla regione montana;
 subsp. *expansum* (W. & K.) Sink — Istria (Zaule, Capodistria, Strugnano, Sicciole);
 subsp. *nivale* Arc. (F: *T. pratense* var. *frigidum* Gaud.) — regione montana.
T. pallidum W. & K. — Goriziano (Selz, Medea), Triestino (Duino, Sistiana).
T. noricum Wulf. — Alpi Carniche.
T. lappaceum L. — Triestino, Istria (Osopo, Buie, Capodistria).
T. cherleri L. — Istria (S. Pietro d'Isola).
T. medium L. — alto Friuli, regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
T. alpestre L. — Carso, Istria.
T. rubens L. — dal Friuli alla regione montana inf. (Verzegnis, Cedarchis), Goriziano, Carso.
T. angustifolium L. — Triestino, Istria.
T. ochroleucum Huds. — Friuli or. (Fagagna, Torlano, Taipana, Cividale, Qualso), Carso, Istria.
T. squamosum L. — Istria (S. Nazario di Capodistria).
T. squarrosus L. (M: *T. panormitanum*) — Triestino (S. Dorligo), Istria (Capodistria); probabilmente estinto.
T. subterraneum L. — Istria (Isola).

Dorycnium Mill.

- D. germanicum* (Gremli) Rikli (F: *D. pentaphyllum* subsp. *germanicum*; G: *D. pentaphyllum* subsp. *suffruticosum*; M: *D. suffruticosum*) — litorale friulano or. (Grado), Carso, Istria.
D. herbaceum Vill. (G: *D. pentaphyllum* subsp. *herbaceum*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Lotus L.

- L. tenuis* W. & K. — dal mare (Grado) alla regione montana inf. (Tolmezzo), Triestino, Istria.
L. pilosus Jord. (F: *L. delortii* p.p.; G: *L. corniculatus* var. *hirsutus*; M: *L. corniculatus* var. *ciliatus* et *hirsutus*) — alto Friuli, Carso.
L. corniculatus L. (G: *L. corniculatus* subsp. *arvensis*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
L. alpinus (Ser.) Ramond sensu Žertova (G: *L. corniculatus* subsp. *alpinus*) — regione montana.
L. uliginosus Schkuhr (G: *L. corniculatus* subsp. *pedunculatus*) — Grado.
L. ornithopodioides L. — Istria (Pirano, Sicciole).

Tetragonolobus Scop.

- T. maritimus* (L.) Roth (G: *Lotus siliquosus*; M: *Tetragonolobus siliquosus*) — dal mare alla regione montana inf. (Tolmezzo, Arta, Cedarchis), Goriziano, Carso, Istria.

Securigera DC.

- S. securidaca* (L.) Degen ex Dörfler (M: *S. lutea*) — Istria (Isola, Pirano, Strugnano).

Anthyllis L.

A. montana L.

subsp. *jacquinii* (Kern.) Hayek (G: *A. montana*; M: *A. Jacquinii*) — Prealpi Giulie (M. Cumeli), Carso, Istria.

A. vulneraria L.

subsp. *vulneraria* (G: *A. vulneraria* subsp. *typica*) — da verificare;
subsp. *polyphylla* (DC.) Nyman (M: *A. vulneraria* var. *polyphylla*) — Carso;
subsp. *praepropera* (Kern.) Bornm. (M. *A. vulneraria* var. *rubriflora*) — Carso, Istria;
subsp. *weldeniana* (Rchb.) Cullen — da verificare;
subsp. *carpatica* (Pant.) Nyman (G: *A. vulneraria* subsp. *vulgaris*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf;
subsp. *alpestris* (Kit. ex Schult.) Asch. & Gr. — regione montana.

Coronilla L.

C. emerus L.

subsp. *emerus* (G: *C. Emerus* subsp. *typica*) — regione montana;
subsp. *emeroides* (Boiss. & Sprun.) Holmboe (M: *C. Emerus* var. *emeroides*) — alto Friuli, regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

C. vaginalis Lam. (G: *C. minima* subsp. *vaginalis*) — dal mare (Monfalcone) alla regione montana inf., Carso, Istria.

C. *coronata* L. — regione montana inf. (Tolmezzo, Caneva), Goriziano, Carso, Istria.

C. *varia* L. — dal mare alla regione montana inf. (fino a 900 m.: Zovello), Goriziano, Carso, Istria.

C. *cretica* L. — Istria (Capodistria, Isola, Pirano).

C. *scorpioides* (L.) Koch — alto Friuli (Tricesimo), Goriziano (Monfalcone), Triestino, Istria.

Hippocrepis L.

H. *comosa* L. — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

H. *unisiliquosa* L. — Istria (S. Pietro d'Isola), Triestino (Duino), da verificare quest'ultima località.

Scorpiurus L.

S. *subvillosus* L. (F: *S. muricatus* p.p.) — Istria (Pirano, Capodistria).

Hedysarum L.

H. hedysaroides (L.) Schinz & Thell.

subsp. *hedysaroides* (G: *H. obscurum* subsp. *typicum*) — regione montana;
subsp. *exaltatum* (Kern.) Žertova — Prealpi Carniche (M. Raut).

Onobrychis Mill.

O. *montana* DC. (F: *O. montana* subsp. *montana*; G: *O. viciaefolia* subsp. *montana*) — Alpi Carniche (Clapsavon).

O. arenaria DC.

subsp. *arenaria* — regione montana inf;

- subsp. *tommasinii* (Jord.) Asch. & Gr. (G: *O. viciaefolia* subsp. *Tommasinii*; M: *O. Tommasinii*) — Goriziano?, Carso, Istria.
- O. viciifolia* Scop. (G: *O. viciaefolia* subsp. *sativa*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso.

GERANIALES OXALIDACEAE

Oxalis L.

- O. corniculata* L. (G: *O. corniculata* subsp. *typica*) — regione montana inf. (Tolmezzo), Goriziano, Triestino.
- O. fontana* Bunge (F: *O. europaea*; G: *O. corniculata* subsp. *stricta*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, avventizia, naturalizzata.
- O. acetosella* L. — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

GERANIACEAE

Geranium L.

- G. macrorrhizum* L. — regione montana.
- G. argenteum* L. — (Prealpi Carniche: M. Cavallo di Aviano; Prealpi Giulie: M. Plauris, M. Ongarina).
- G. sanguineum* L. — regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- G. pratense* L. — regione montana.
- G. sylvaticum* L. — regione montana, Goriziano (forre dell'Isonzo).
- G. nodosum* L. — dal basso Friuli (Pradizziolo) alla regione montana inf., Goriziano, Carso.
- G. phaeum* L.
subsp. *phaeum* — dall'alto Friuli alla regione montana;
subsp. *lividum* (G: *G. phaeum* var. *lividum*) — regione montana.
- G. palustre* L. — regione montana (Moggio, Studena, alta Carnia).
- G. pyrenaicum* Burm. — regione montana inf.
- G. rotundifolium* L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- G. molle* L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- G. pusillum* L. — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
- G. columbinum* L. — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- G. dissectum* L. — dal mare (S. Giorgio) all'alto Friuli (S. Daniele), Triestino, Istria.
- G. lucidum* L. — Carso, Istria.
- G. robertianum* L. — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
- G. purpureum* Vill. — regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Erodium L'Hér.

- E. malacoides* (L.) L'Hér. — Goriziano (Monfalcone), Istria (Sgrugnano).
- E. cicutarium* (L.) L'Hér — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- E. moschatum* (L.) L'Hér — coltivato.

TROPAEOLACEAE
TROPAEOLUM L.

T. majus L. — coltivato e talvolta subspontaneo.

ZYGOPHYLLACEAE

Tribulus L.

T. terrestris L. — litorale friulano or. (Grado), Triestino (Castello di Moccò), forse scomparso, Istria (Strugnano, Isola).

LINACEAE

Linum L.

L. flavum L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Carso (raro), Triestino (Muggia vecchia).

L. nodiflorum L. — Istria (Punta Grossa, Muggia, Pirano).

L. narbonense L. — regione montana inf., Carso, Istria.

L. tommasinii (Rchb.) Nyman — Carso, Istria.

L. julicum Hayek (G: *L. perenne* subsp. *alpinum*) — regione montana.

L. bienne Mill. (G: *L. usitatissimum* subsp. *angustifolium*; M.: *L. angustifolium*) — litorale friulano da Lignano a Monfalcone, Goriziano (Doberdò), Triestino, Istria.

L. usitatissimum L. (G: *L. usitatissimum* subsp. *typicum*) — talora inselvatichito quale relitto culturale.

L. viscosum L. — dal mare alla regione montana.

L. maritimum L. — litorale friulano (da Lignano a Monfalcone), Istria (Muggia, Capodistria, Sicciole).

L. tryginum L. (G, M: *L. gallicum*) — basso Friuli (Nogaro), Triestino, Istria.

L. strictum L.

subsp. *corymbulosum* (Rchb.) Rouy (M: *L. corymbulosum*) — Triestino, Istria.

L. catharticum L. — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

EUPHORBIACEAE

Mercurialis L.

M. annua L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

M. perennis L. (G: *M. perennis* subsp. *typica*) — dal basso Friuli (Nogaro, Muzzana) alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

M. ovata Stern. & Hoppe (G: *M. perennis* subsp. *ovata*) — regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

M. × paxii Graebn. — distribuzione mal nota, regione montana inf. (Val Canale), Triestino.

Acalypha L.

A. virginica L. — alto Friuli (Pordenone, Polcenigo, Udine), Goriziano (Collio).

Ricinus L.

R. communis L. — coltivato.

Euphorbia L.

- E. nutans Lag. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Triestino, avventizia.
- E. peplis L. — litorale friulano, Istria.
- E. humifusa Willd. — basso Friuli, Goriziano, avventizia.
- E. chamaesyce L. — Goriziano, Triestino, Istria.
- E. maculata L. (M: *E. preslii*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Triestino, avventizia.
- E. villosa W. & K. — basso Friuli.
- E. palustris L. — basso Friuli, Triestino (foci del Timavo, Rio Osopo).
- E. fragifera Jan. (M: *E. epithymoides*) — Carso, Istria.
- E. dulcis L.
subsp. dulcis (G: *E. dulcis* subsp. *typica*) — da accertare;
subsp. incompta (Ces.) Nym. (G: *E. dulcis* var. *purpurata*) — sembra la sola presente dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- E. angulata Jacq. (G: *E. dulcis* subsp. *angulata*) — regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- E. carniolica Jacq. — Friuli or. (Valli del Natisone), Goriziano (Collio).
- E. verrucosa L. (F: *E. brittingeri*; G: *E. epithymoides* subsp. *verrucosa*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- E. platyphyllos L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- E. helioscopia L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- E. lathyris L. — coltivata e talora inselvatichita.
- E. falcata L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Carso, Goriziano, Istria.
- E. peplus L. (G: *E. peplus* subsp. *typica*) — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
- E. peploides Gouan (G: *E. peplus* subsp. *peploides*) — Goriziano (Medea, S. Floriano), Istria (Sicciole).
- E. nicaeensis All. (M: *E. seguieriana* subsp. *nicaeensis*) — rara in Friuli (Belvedere, Villanova, Manzano, Buttrio), Goriziano, Carso, Istria.
- E. triflora Schott. Nym. & Ky.
subsp. kernerii (Huter) Poldini (F: *E. kernerii*, G: *E. barrelieri* subsp. *carnica*) — alto Friuli, regione montana inf.
- E. paralias L. — litorale friulano, Istria.
- E. esula L. (F: *E. esula* subsp. *esula*) — Friuli, Goriziano, Triestino.
- E. virgata W. & K.
subsp. tommasiniana (Bertol.) Nyman (F: *E. esula* subsp. *tommasiniana*; M: *E. tommasiniana*) — Goriziano (Sabotino), Carso, Istria.
- E. cyparissias L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- E. amygdaloides L. — dal basso Friuli (Nogaro) alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- E. wulfenii Hoppe ex Koch (F: *E. characias* subsp. *wulfenii*) — Triestino (costiera).

RUTALES
RUTACEAE

Ruta L.

R. graveolens L. — coltivata.

R. divaricata Ten. — alto Friuli (Gemona), Carso, Istria.

Dictamnus L.

D. albus L. — regione montana inf. (M.S.Simeone), M. Glemina (Gemona), Valli del Natisone: Albana, Purgessimo, S.Canziano; Carso, Istria.

SIMARUBACEAE

Ailanthus Desf.

A. altissima (Mill.) Swingle (G, M: *A. glandulosa*) — coltivata e spesso inselvatichita.

POLYGALACEAE

Polygala L.

P. chamaebuxus L. — regione montana.

P. nicaeensis Risso ex Koch

subsp. *mediterranea* Chodat (G: *P. vulgaris* subsp. *nicaeensis*; M: *P. nicaeensis*) — Goriziano, Carso, Istria;

subsp. *forojulensis* (Kern.) Graebn. (G: *P. vulgaris* subsp. *nicaeensis* var. *forojulensis*) — dall'alto Friuli alla regione montana.

P. comosa Schkuhr. (G: *P. vulgaris* subsp. *comosa*) — Friuli, Carso, Goriziano, Istria.

P. vulgaris L. (G: *P. vulgaris* subsp. *typica*) — dal mare alla regione montana, Carso, Istria.

P. alpestris Rchb. (G: *P. vulgaris* subsp. *alpestris*) — regione montana.

P. serpyllifolia Hose (G: *P. vulgaris* subsp. *serpyllacea*) — regione montana.

P. amara L. — regione montana (Val Raccolana, Tolmezzo, Val Pesarina).

SAPINDALES
ANACARDIACEAE

Rhus L.

R. typhina L. — basso Friuli (Mortegliano, Lavariano, Basiliano, Orcenigo, Codroipo, Casarsa), Goriziano (Medea), coltivato e spontaneo.

Cotinus Mill.

C. coggygria Scop. (G, M: *Rhus cotinus*) — litorale friulano or. (Grado), regione montana inf. (Prealpi Carniche: M.S.Simeone, Val Aupa, vallone di S. Tomè presso Dardago; valli del Natisone: Cras, Albana), Goriziano, Carso, Istria.

Pistacia L.

P. terebinthus L. — litorale friulano or. (Grado), Prealpi Giulie (M. Cumieli sopra il lago di Ospedaletto, Val dello Judrio presso Cras), Goriziano, Carso, Istria.

ACERACEAE

Acer L.

- A. platanoides L. — regione montana (Varmost, Costa Palantina, Ovaro), Goriziano, Carso, Istria.
- A. campestre L. — dal mare alla regione montana (— 800 m), Carso, Istria.
- A. pseudoplatanus L. — dall'alto Friuli alla regione montana, Carso, Goriziano, Istria.
- A. obtusatum W. & K. ex Willd. (M: *A. opulifolium* var. *obtusatum*) — Carso (Valdella Raša), Istria (Slavnik).
- A. monspessulanum L. — Carso, Istria.
- A. negundo L. — coltivato e talvolta inselvatichito.

HIPPOCASTANACEAE

Aesculus L.

- A. hippocastanum L. — coltivata e talvolta inselvatichita.
- A. carnea Hayne — coltivata.

BALSAMINACEAE

Impatiens L.

- I. parviflora DC. — alto Friuli (Venezia), naturalizzata.
- I. noli-tangere L. — regione montana.
- I. balsamina L. — coltivata.

CELASTRALES AQUIFOLIACEAE

Ilex L.

- I. aquifolium L. — dall'alto Friuli (S. Daniele, Susans, Faedis, Attimis, S. Pietro al Natisone) alla regione montana (Prealpi Carniche: Val di Gere presso C. ra Casavento; Tramontino: T. Silisia, St. li Già; Alpi Carniche: M. Forcella nel gruppo dell'Amariana).

CELASTRACEAE

Euonymus L.

- E. europaeus L. — dal mare alla regione montana (— 800 m), Carso, Goriziano, Istria.
- E. latifolia (L.) Mill. — regione montana (Valli del Natisone, Val Settimana, Illegio).
- E. verrucosa Scop. — Friuli or. (Valli del Natisone), Goriziano, Carso, Istria.
- E. japonica L.f. — coltivato, talvolta spontaneo.

STAPHYLEACEAE

Staphylea L.

- S. pinnata L. — basso Friuli, Friuli or., Goriziano, Carso, Istria.

BUXACEAE

Buxus L.

B. sempervirens L. — coltivato e talvolta subspontaneo (castello di Gemona).

RHAMNALES RHAMNACEAE

Paliurus Mill.

P. spina — christi Mill. (M: *P. australis*) — Goriziano, Carso, Istria.

Ziziphus Mill.

Z. jujuba Mill. (G: *Z. sativa*, M: *Z. vulgaris*) — coltivata.

Rhamnus L.

R. alaternus L. — Triestino (costiera), ma forse estinto.

R. saxatilis Jacq. — litorale friulano or. (Grado), regione montana inf. (Verzegnis, Tolmezzo), Istria (Slavnik).

R. catharticus L. — dal basso Friuli alla regione montana (—900 m Fusea), Goriziano, Carso, Istria.

R. fallax Boiss. (F: *Rh. alpinus* subsp. *fallax*, M: *Rh. alpina*) — Carso (Vremščica), Istria (Slavnik).

R. pumilus Turra — regione montana.

Frangula Mill.

F. alnus Mill. (G, M: *Rhamnus frangula*) — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

F. rupestris (Scop.) Schur (G, M: *Rhamnus rupestris*) — regione montana inf. (M. Cumieli, M.S. Simeone, Val Aupa), Goriziano, Carso, Istria.

VITACEAE

Vitis L.

V. vinifera L.

subsp. *vinifera* (G: *V. vinifera* subsp. *sativa*) — coltivata;

subsp. *sylvestris* (C.C. Gmel.) Hegi — regione montana inf.

V. labrusca L. — coltivata.

V. rotundifolia Michx — coltivata.

V. rupestris Scheele — coltivata.

V. vulpina L. (G: *V. riparia*) — coltivata.

Parthenocissus

P. tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch. — coltivata.

P. inserta (Kern.) Fritsch — coltivata e talvolta inselvaticata.

MALVALES

TILIACEAE

Tilia L.

T. tomentosa Moench — coltivata.

T. platyphyllos Scop. — Prealpi Giulie (valli del Natisone, val di Resia), Carso, Istria.

T. cordata (M: *T. ulmifolia*) — regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

T. × vulgaris Hayne — regione montana inf. (bacino medio del Natisone, M. Strabut).

MALVACEAE

Malva L.

M. alcea L. — dal litorale friulano (Grado) alla regione montana inf., Carso (M. Lanaro).

M. sylvestris L. (G: *M. sylvestris* subsp. *typica*) — dal basso Friuli alla regione montana.

M. mauritiana L. (G: *M. sylvestris* subsp. *mauritiana* et *erecta*) — Friuli (Polcenigo), Istria (Ospo).

M. nicaeensis All. — Istria.

M. neglecta Wallr. (G, M: *M. rotundifolia*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

M. crispa (L.) L. — regione montana.

Althaea L.

A. hirsuta L. — Friuli, Triestino, Istria.

A. cannabina L. — litorale friulano or. (Grado), Triestino, Istria.

A. officinalis (G: *A. officinalis* subsp. *typica*) — litorale friulano (foci del Tagliamento), Goriziano (La Cona), Triestino (Foci del Timavo), Istria.

A. taurinensis DC.; (G: *A. officinalis* subsp. *taurinensis*) — basso Friuli.

A. rasea (L.) Cavill. — coltivata e talvolta inselvatichita.

Alcea L.

A. biennis Winterl (F, M: *A. pallida*) — Istria (Ospo).

Abutilon Mill.

A. theophrasti Med. (G: *A. avicennae*) — basso Friuli (paludi di Aquileia), da verificare.

Hibiscus L.

H. syriacus L. — coltivato.

H. palustris L. (G: *H. roseus*) — basso Friuli occ. (Fossone dei Lanzoni).

H. trionum L. — basso Friuli, Goriziano, Triestino, Istria.

Kosteletzkya K. Presl

K. pentacarpos (L.) Ledeb. (G: *Hibiscus pentacarpos*) — basso Friuli (lungo il Lemene presso Caorle e Concordia), da confermare.

THYMELEALES
THYMELEACEAE

Daphne L.

- D. mezereum L. — regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
D. laureola L. — Friuli or. (valli del Natisone e valle dello Judrio), Carso (Škocjan).
D. alpina L. — regione montana inf. (M. Cucco, Avaglio, M.S.Simeone, M. Lavara), Carso.
D. cneorum L. — dall'alto Friuli alla regione montana inf.
D. striata Tratt. — regione montana.

Thymelaea Mill.

- T. passerina (L.) Coss. & Germ. (M: *Th. annua*) — *littorale friulano, Istria.*

ELEAGNACEAE

Hippophaë L.

- H. rhamnoides — dall'alto Friuli alla regione montana.

GUTTIFERALES
HYPERICACEAE (GUTTIFERAE)

Hypericum L.

- H. calycinum L. — coltivato.
H. androsaemum L. — alto Friuli (Polcenigo, Fanna, Travesio, Valvasone, Tricesimo, Cividale).
H. hirsutum L. — alto Friuli (Tricesimo, Faedis), regione montana inf. (Prescudin), Goriziano (Oslavia), Carso.
H. montanum L. — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
H. tetrapterum Fries (G: *H. quadrangulum* subsp. *acutum*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
H. maculatum Cr. (G: *H. quadrangulum* subsp. *typicum*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
H. perforatum L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
H. veronense Schrank (M: *H. perforatum* var. *angustifolium*) — Goriziano, Carso, Istria.

VIOLALES
VIOLACEAE

Viola L.

- V. odorata L. (G: *V. hirta* subsp. *odorata*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
V. suavis Bieb. (incl. V. austriaca A. & J. Kern. e V. beraudii Boreau) (G: *V. hirta* subsp. *beraudii*; M: *V. adriatica*, *V. austriaca*) — regione montana inf. (M. Glemina presso Gemonia), Goriziano (Vallone), Carso, Istria.
V. alba Bess.
subsp. *scotophylla* (Jord.) Greml. (G: *V. hirta* subsp. *alba* et var. *scotophylla*;

- M: *V. alba* var. *violacea*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- V. hirta* L. (G: *V. hirta* subsp. *typica*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- V. collina* Bess. — regione montana (Prealpi Clautane: Val Cimoliana, V. Chialledine, Val Senons).
- V. thomasiana* Per. & Song. — Alpi Carniche occ. (Passo M. Croce Comelico, Val Digon), da verificare.
- V. mirabilis* L. — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano.
- V. rupestris* F.W.Schultz (M: *V. canina* var. *sabulosa*) — regione montana inf. (Val Cimoliana, Val di Gere, M. Faeit, Gemonese), Carso, Istria.
- V. reichenbachiana* Jord. ex Boreau (G: *V. canina* subsp. *silvatica*; M: *V. sylvatica*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- V. riviniana* Rchb. (G: *V. canina* subsp. *silvatica* var. *riviniana*; M: *V. sylvatica* var. *riviniana*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- V. canina* L.
 subsp. *canina* — dall'alto Friuli alla regione montana, Carso;
 subsp. *montana* (L.) Hartm. (G: *V. canina* subsp. *typica*) — Carso (Lanaro);
 subsp. *schantzii* (Billot) Kirschl. — Alpi Carniche (Stua di Ramaz, Valpudria).
- V. elatior* Fries — basso Friuli (Muzzana — Code di Manin), Goriziano (Pietrarossa, Doberdò, Castelletto), Carso (Volčjgrad).
- V. palustris* L. — Alpi Carniche (M. Paularo, Bordaglia, Risumiela).
- V. pinnata* L. — regione montana (M. Plauris, Rio degli Uccelli, Pizzo di Timau), Carso (M. Sidavnik presso Sežana).
- V. biflora* L. — regione montana, Goriziano (forre dell'Isonzo).
- V. tricolor* L.
 subsp. *subalpina* (Latourr.) Gaudin (M: *V. tricolor* subsp. *saxatilis*) — regione montana.
- V. arvensis* Murray (G: *V. tricolor* subsp. *arvensis*; M: *V. tricolor* var. *arvensis*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Carso, Goriziano, Istria.

CISTACEAE

Cistus L.

- C. salvifolius* L. — Triestino.

Helianthemum Mill.

- H. ovatum* (Viv.) Dunal (F: *H. nummularium* subsp. *obscurum*; F: *H. Chamaecistus* subsp. *vulgare*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Carso, Goriziano, Istria.
- H. grandiflorum* (Scop.) DC. (F: *H. nummularium* subsp. *grandiflorum*; F: *H. chamaecistus* subsp. *grandiflorum*) — regione montana.
- H. alpestre* (Jacq.) DC. (F: *H. oelandicum* subsp. *alpestre*; G: *H. canum* subsp. *italicum*) — dall'alto Friuli (magredi del Cellina e Meduna) alla regione montana.
- H. canum* (L.) Baumg. — alto Friuli (greto del Cellina), Carso (M. Spaccato), Istria (Slavnik).

Fumana (Dunal) Spach

F. procumbens Gren. & Godr. — Carso, Istria.

F. ericoides (Cav.) Gdgr. — litorale friulano or. (Grado), Prealpi Giulie (M. Cumieli) da verificare, Carso (Štanjel).

TAMARICACEAE

Tamarix L.

T. dalmatica Baum — Istria (Strugnano).

T. parviflora DC. — coltivata e talvolta subspontanea.

T. africana Poir. — coltivata.

T. gallica L. — litorale friulano.

Myricaria Desv.

M. germanica (L.) Desv. — dall'alto Friuli (Spilimbergo) alla regione montana (Paularo, Sutrio).

CUCURBITALES
CUCURBITACEAE

Ecballium Rich. f.

E. elaterium (L.) Rich. f. — Triestino.

Bryonia L.

B. dioica Jacq. (M: *B. cretica* subsp. *dioica*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Citrullus Schrad.

C. lanatus (Thunb.) Mansf. — coltivato.

Lagenaria Ser.

L. siceraria (Molina) Stand. — coltivata e talvolta inselvatichita nel litorale friulano or. (Grado) e nel Goriziano (Cormons).

Cucumis L.

C. melo L. — coltivato.

C. sativus L. — coltivato.

Cucurbita L.

C. pepo L. — coltivata.

C. moschata Duchesne ex Poiret — coltivata.

C. maxima Duchesne — coltivata.

Echinocystis Torr. & Gray

E. lobata (Michx.) Torr. & Gray — Friuli or. (Valli del Natisone), avventizia.

MYRTALES
LYTHRACEAE

Lythrum L.

L. salicaria L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

L. hyssopifolia L. — basso Friuli, Istria (Pirano, Muggia, Salvore).

Peplis L.

P. portula L. (F: *Lythrum portula*) — regione montana (Carnia: Rigolato), Goriziano (Molino di Sdobba, Cormons, Mossa).

TRAPACEAE

Trapa L.

T. natans L. — alto Friuli (Valvasone, Fagagna, S. Daniele), Goriziano (fra Borgnano e Cormons).

MYRTACEAE

Myrtus L.

M. communis L. — Triestino (costiera), Istria (Strugnano).

PUNICACEAE

Punica L.

P. granatum L. — forse spontaneo nel Goriziano (Vallone), Triestino (S. Giovanni di Duino, costiera), Istria, coltivato altrove.

ONAGRACEAE

Circaea L.

C. lutetiana L. — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso.

C. × intermedia Ehrh. — regione montana.

C. alpina L. — regione montana.

Oenothera L.

O. biennis L. s.l. (G: *O. biennis* subsp. *typica*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Triestino, spontaneizzata.

O. parviflora L. (G: *O. biennis* subsp. *muricata*) — basso Friuli, spontaneizzata.

Ludwigia L.

L. palustris (L.) Elliot (M: *Isnardia palustris*) — dal basso Friuli alla regione montana inf. (Venzone), Goriziano (Doberdò, Castelletto), Istria (Sicciòle).

Epilobium L.

E. angustifolium L. — regione montana, Carso (Vremščica).

- E. dodonaei* Vill. — litorale friulano (Grado), alto Friuli e regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
E. hirsutum L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
E. parviflorum Schreb. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
E. montanum L. — regione montana, Carso.
E. collinum C.C.Gmel. — regione montana.
E. alpestre (Jacq.) Krock. — regione montana.
E. tetragonum L. — basso Friuli, Goriziano, Carso, Istria.
E. roseum Schreb. — regione montana, Istria (Valle del Padež).
E. anagallidifolium Lam. (G: *E. alpinum*) — regione montana.
E. alsinifolium Vill. (G: *E. alpinum* subsp. *alsinaefolium*) — regione montana.

HALORAGACEAE

Myriophyllum L.

- M. verticillatum* L. — dal basso Friuli alla regione montana inf. (lago di Cavazzo), Goriziano (Doberdò, Castelletto), Triestino (foci del Timavo).
M. alternifolium DC. — alto Friuli (Cordenons in loc. Vinchiaruzzo).
M. spicatum L. — dal basso Friuli alla regione montana inf. (lago di Cavazzo), Triestino (foci del Timavo).

HIPPURIDACEAE

Hippuris L.

- H. vulgaris* L. — dal basso Friuli (S.Giorgio) alla regione montana inf. (lago di Ospedaletto), Goriziano (lago di Doberdò).

UMBELLIFLORAE

CORNACEAE

Cornus L.

- C. sanguinea* L.
 subsp. *australis* (C.A.Meyer) Jav. (G, M: *C. sanguinea*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
C. mas L. — dal basso Friuli (S.Giorgio), alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Aucuba Thunb.

- A. japonica* Thunb. — coltivata.

ARALIACEAE

Hedera L.

- H. helix* L. — dal mare alla regione montana (-1300 m Collina), Goriziano, Carso, Istria.

APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Hydrocotyle L.

H. vulgaris L. — basso Friuli.

Sanicula L.

S. europaea L. — regione montana, Carso, Istria.

Hacquetia DC.

H. epipactis (Scop.) DC. — Friuli or. (Valli del Natisone e dello Judrio), Goriziano (Collio, Mossa, M.S.Michele), Carso.

Astrantia L.

A. major L.

subsp. *carinthiaca* Arc. (G, M: *A. major*) — regione montana, Carso (Vremščica, Klanec).

A. bavarica F.W. Schultz — Prealpi Giulie (M. Chiampon), da confermare.

A. carniolica Jacq. (G: *A. minor* subsp. *carniolica*) — Prealpi Giulie (M. Chiampon).

Eryngium L.

E. maritimum L. — litorale friulano, Istria.

E. alpinum L. — regione montana.

E. creticum Lam. — Istria (Oltre).

E. amethystinum L. — dall'alto Friuli alla regione montana inf. (Ovaro), Goriziano, Carso, Istria.

E. campestre L. — dal basso Friuli (Grado, Palmanova) alla regione montana inf. (Gemona, Ospedaletto).

Echinophora L.

E. spinosa L. — litorale friulano.

Chaerophyllum L.

C. hirsutum L. (G: *Ch. hirsutum* subsp. *typicum*) — regione montana.

C. elegans Gaudin (G: *Ch. hirsutum* subsp. *elegans*) — regione montana (Alpi Carniche: Casera Collinetta).

C. villarsii Koch (G: *Ch. hirsutum* subsp. *villarsii*) — regione montana.

C. aureum L. — regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

C. temulum L. (F: *Ch. temulum*) — dall'alto Friuli (Udine) alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Anthriscus Pers.

A. sylvestris (L.) Hoffm. — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

A. nitida (Wahlenb.) Hazsl. — Alpi Carniche occ. (Passo M. Croce Comelico, Dosole, Candide, Casamazzagno).

A. fumarioides (W. & K.) Spreng. — Istria (Slavnik).

A. cerefolium (L.) Hoffm. — coltivato e talvolta inselvatichito, Carso (Kreplje, Dutovlje, fra Lipica e Gropada).

Scandix L.

- S. grandiflora* L. (M: *S. australis* subsp. *grandiflora*) — Istria (Risano).
S. pecten—veneris L. — Goriziano (Ronchi, Brazzano, Sagrado, Vallone), Carso, Istria.

Myrrhis Mill.

- M. odorata* (L.) Scop. — regione montana.

Molopospermum Koch

- M. peloponnesiacum* (L.) Koch — regione montana (Prealpi Giulie: Plauris, Quarnan, Gran Monte); Prealpi Carniche (Cuar, Flagel, Cavallo di Aviano).

Coriandrum L.

- C. sativum* L. — coltivato.

Bifora Hoffm.

- B. testiculata* (L.) Roth — Istria (Pirano, Capodistria).
B. radians Bieb — Friuli or. (Manzano, Albana), Goriziano.

Smyrniurn L.

- S. perfoliatum* L. — Carso (Sales), Istria (S. Servolo).

Bunium L.

- B. bulbocastanum* L. (M: *Carum bulbocastanum*) — Carso (Val della Raša).

Pimpinella L.

- P. anisum* L. — coltivata.
P. major (L.) Huds.
 subsp. *major* — dal basso Friuli (Nogaro) alla regione montana inf., Goriziano, Carso (Lipica), Istria (Padež);
 subsp. *rubra* (Hoppe) O. Schwartz (G: *P. major* var. *rubra*) — regione montana.
P. saxifraga L. (G: *P. saxifraga* subsp. *typica*) — dal basso Friuli (Castions) alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
P. alpina Host (G: *P. saxifraga* subsp. *hircina* var. *alpestris*) — regione montana prevalentemente nella sua parte più orientale.
P. nigra Mill. — resta da confermare.

Aegopodium L.

- A. podagraria* L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Sium L.

- S. latifolium* L. — Goriziano (Molino di Sdobba), Istria (Sicciole).

Berula Koch

- B. erecta* (Huds.) Covile (G: *Sium erectum*, M: *B. angustifolium*) — dal basso Friuli alla regione montana inf. (Somplago, Caneva), foci del Timavo, Istria.

Crithmum L.

C. maritimum L. — litorale friulano, Triestino, Istria.

Seseli L.

S. libanotis (L.) Koch — regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

S. tommasinii Rchb. f. — sfiora il territorio a Obrov (Istria).

S. gouanii Koch — Goriziano (M. Sabotino), Carso.

S. austriacum (Beck) Wohlf. (G: *S. montanum* subsp. *glaucum*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf.

S. annuum L. — Alpi Carniche (Ovaro, S. Pietro in Zuglio), Goriziano (Medea, Mariano, S. Michele), Carso, Istria.

Oenanthe L.

O. fistulosa L. — basso Friuli (Aquileia), Goriziano.

O. pimpinelloides L. — alto Friuli, Goriziano, Triestino, Istria.

O. lachenalii C.C.Gmel. — basso Friuli, Triestino (foci del Timavo).

O. aquatica (L.) Poir. — basso Friuli (Aquileia, Strassoldo).

Aethusa L.

A. cynapium L. — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso.

Athamanta L.

A. turbith (L.) Brot. (G: *A. cretensis* subsp. *Matthioli*; M: *A. Matthioli*) — Prealpi, Carso, Istria.

A. cretensis L. (G: *A. cretensis* subsp. *typica*) — regione montana.

Grafia Rchb.

G. golaka (Hacq.) Rchb. (G: *Hladnikia Golaka*) — regione montana (Prealpi Giulie: Matajur, Quarnan, Chiampon; Alpi Giulie: Jof di Miezegnôt).

Foeniculum Mill.

F. vulgare Mill. — Carso, Istria e coltivato qua e là.

Anethum L.

A. graveolens L. — Carso, Istria.

Silaum Mill.

S. silaus (L.) Schinz & Thell. — Alpi Carniche (Volaja), indicazione di Fornaciari in Gior. Bot. Ital., 66(1/2), 1959 che attende conferma.

Conium L.

C. maculatum L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Triestino, Carso.

Pleurospermum Hoffm.

P. austriacum (L.) Hoffm. — regione montana.

Bupleurum L.

- B. rotundifolium L. — Goriziano, Carso, Istria.
B. veronense Turra (G: *B. Odontites*; M: *B. aristatum*) — Friuli or. (Cividale, Gagliano), Goriziano, Carso, Istria.
B. praealtum L. (G, M: *B. junceum*) — litorale friulano or. (Grado), Goriziano (Vallone), Carso, Istria.
B. tenuissimum L. — litorale friulano or. (Grado), Triestino, Istria.
B. semicompositum L. — basso Friuli (Aquileia), Goriziano (Colle di Medea), Istria (Muggia, Pirano).
B. petraeum L. (G: *B. graminifolium*) — regione montana.
B. ranunculoides L. (incl. *B. canalense* Wulf., *B. gramineum* Vill.) (M: *B. gramineum* p.p.) — regione montana, Carso (Vremščica), Istria (Slavnik).

Trinia Hoffm.

- T. glauca (L.) Dum. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Carso, Istria.

Apium L.

- A. graveolens L. — litorale friulano or. (Monfalcone, Isola Morosini, Belvedere, Molino di Sdobba), coltivato altrove.
A. nodiflorum (L.) Lag. — basso Friuli (Strassoldo, Aquileia, Virco, Fagagna).

Sison L.

- S. amomum L. — Goriziano (Mossa).

Petroselinum Hill

- P. crispum (Mill.) A.W.Hill (G: *P. hortense*, M: *P. sativum*) — coltivato.

Ammi L.

- A. majus L. — Goriziano (Gradisca).

Carum L.

- C. carvi L. — regione montana, Carso, Istria.

Cnidium Cuss. ex Juss.

- C. silaifolium (Jacq.) Simk. (M: *C. apioides*) — dal litorale friulano or. (Grado) alla regione montana inf. or. (valle dello Judrio), Goriziano, Carso, Istria.

Selinum L.

- S. carvifolia (L.) L. — dal basso Friuli (Nogaro) alla regione montana inf. (Pani, Stua di Ramaz), Goriziano, Carso (Vreme, Obrov).

Ligusticum L.

- L. mutellinoides (Cr.) Vill. (G: *Pachypleurum simplex*) — Alpi Carniche or. (M. Cavallodi Pontebba); l'indicazione della Val Raccolana risalente al Brignoli è da scartare.
L. mutellina (L.) Cr. (G: *Meum Mutellina*) — Alpi Carniche (Comelico, Peralba, Val Visdende, Col Quaternà, Bordaglia, Veranis, Clapsavon, Risumiela).
L. lucidum Mill.

subsp. *seguieri* (Jacq.) Leute (F: *L. lucidum* subsp. *lucidum*) — Prealpi Giulie (Gran Monte, Jôf di Ungarina, Chiampôn, Quarnan), Prealpi Carniche (S. Simeone, M. Cavallo di Aviano, M. Buscada).

Angelica L.

A. *sylvestris* L.

subsp. *sylvestris* — basso Friuli, Triestino, Istria;

subsp. *montana* (Brot.) Arc. (G: *A. sylvestris* var. *montana*) — regione montana.

Levisticum Hill

L. *officinale* Koch — coltivato.

Ferulago Koch

F. *galbanifera* (Mill.) Koch (F: *F. campestris*; G: *Ferula Ferulago*) — alto Friuli, Goriziano, Carso, Istria.

Peucedanum L.

P. *coriaceum* Rchb. (M: *P. parisiense* var. *Petteri*) — Triestino, Istria.

P. *carvifolia* Vill. — alto Friuli (Fagagna, S. Daniele, Fanna), Goriziano (Mariano, Cormons, Pietrarossa), Carso (Percedol, Orlek, Lipica, S. Canziano).

P. *schottii* Bess. ex DC. — regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

P. *venetum* (Spreng.) Koch — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

P. *austriacum* (Jacq.) Koch (G: *P. austriacum* subsp. *typicum*) — dall'alto Friuli (Lestans, Fanna) alla regione montana, Istria (Slavnik).

P. *rablense* (Wulf.) Koch (G: *P. austriacum* subsp. *rablense*) — regione montana.

P. *oreoselinum* (L.) Moench — dal basso Friuli alla regione montana inf. (1300 m), Goriziano, Carso, Istria.

P. *palustre* (L.) Moench — basso Friuli (Pradizziolo, Strassoldo, Mulino di Sdobba), Goriziano (Pietrarossa, Castelletto).

P. *cervaria* (L.) Lapeyr. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
var. *microphyllum* Posp. — prevale nel Friuli.

P. *ostruthium* (L.) Koch — regione montana.

P. *verticillare* (L.) Koch — regione montana, Goriziano (lungo l'Isonzo, M.S.Michele).

Pastinaca L.

P. *sativa* L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Heracleum L.

H. *austriacum* L.

subsp. *sifolium* (Scop.) Nyman — forse nelle Alpi Giulie occ.

H. *sphondylium* L.

subsp. *pollinianum* (Bertol.) Neumay. (G: *H. sphondylium* subsp. *pyrenaicum*)
— forse presente nella regione montana.

subsp. *elegans* (Cr.) Schübl. & Mart. (F: *H. sphondylium* subsp. *montanum*; G:

H. sphondylium subsp. *longifolium*) — regione montana.
subsp. *sphondylium* (G: *H. sphondylium* subsp. *typicum*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Tordylium L.

T. maximum L. — Goriziano (Quisca, Piuma).

T. apulum L. — Istria (Val di Sicciole).

Laserpitium L.

L. siler L. — regione montana, Carso, Istria.

L. latifolium L. — regione montana, Carso.

L. peucedanoides L. — regione montana.

L. prutenicum L. — dal basso Friuli (Castions) alla regione montana inf., Goriziano, Triestino, Istria.

Torilis Adans.

T. nodosa (L.) Gaertn. — Goriziano (Villaraspa, Sagrado, Brazzano), Triestino, Istria.

T. arvensis (Huds.) Lk.

subsp. *arvensis* (M: *T. helvetica*) — basso Friuli, Valli del Natisone, Carso, Istria;

subsp. *heterophylla* (Guss.) Thell. — Carso (Orlek), Istria (Ospo, Muggia vecchia).

T. japonica (Houtt.) DC. (G, M: *T. Anthriscus*) — dal basso Friuli alla regione montana inf. (fino a 900 m., Rivalpo, Forni Avoltri), Carso, Istria.

Caucalis L.

C. platycarpus L. (G, M: *C. daucooides*) — alto Friuli (Lestizza, S. Daniele, Pradamano, Corno di Rosazzo, Cividale), Carso, Istria.

Turgenia Hoffm.

T. latifolia (L.) Hoffm. — basso Friuli (Nogaro, Lavariano), Carso, Istria.

Orlaya Hoffm.

O. grandiflora (L.) Hoffm. (G: *Daucus gradiflorus*) — dal litorale friulano (Grado) all'alto Friuli (S. Pietro al Natisone, Ospedaletto), Goriziano, Carso, Istria.

Daucus L.

D. carota L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

SYMPETALAE

ERICALES

PYROLACEAE

Pyrola L.

P. minor L. — regione montana.

P. media Sw. — regione montana, Carso (Povir).

P. chlorantha Swartz — Alpi Carniche (falde NW della Tersadia, lungo il R. Ortegglàs).

P. rotundifolia L. — regione montana.

Orthilia Rafin.

O. secunda (L.) House (G: *Pyrola secunda*) — regione montana.

Moneses Salisb. ex S.F.Gray

M. uniflora (L.) A.Gray (G: *Pyrola uniflora*) — regione montana, Carso (M. Sidavnik).

Monotropa L.

M. hypophegea Wallr. (G: *Hypopithys multiflora* var. *glabra*; M: *M. Hypopitis* var. *glabra*) — regione montana, Carso.

ERICACEAE

Erica L.

E. herbacea L. (G, M: *E. carnea*) — dal mare (foci del Tagliamento, Grado) alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

Calluna Salisb.

C. vulgaris (L.) Hull — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

Rhododendron L.

R. ferrugineum L. — regione montana.

R. hirsutum L. — regione montana.

R. × intermedium Tausch — regione montana.

Rhodothamnus Rchb.

R. chamaecystus (L.) Rchb. — regione montana.

Loiseleuria Desv.

L. procumbens (L.) Desv. — regione montana.

Arbutus L.

A. unedo L. — Triestino (costiera), Istria (Strugnano) e qua e là coltivato.

Arctostaphylos Adans.

A. uva-ursi (L.) Spreng. — regione montana.

A. alpinus (L.) Spreng. — regione montana.

Andromeda L.

A. polifolia L. — Alpi Carniche occ. (Col Quaternà).

Vaccinium L.

V. oxycoccos L. — Alpi Carniche occ. (Col Quaternà).

V. vitis-idaea L. — regione montana.

V. uliginosum L. — regione montana.

V. gaultherioides Bigelow — probabilmente presente ma di distribuzione sconosciuta.

V. myrtillus L. — regione montana, Istria (M. Kuk, Odolina).

EMPETRACEAE

Empetrum L.

E. nigrum L. — Alpi e Prealpi Carniche (F.lla Oberenge, gruppo del Crep Nudo, Valli di Giau e di Suola).

PRIMULALES PRIMULACEAE

Primula L.

P. vulgaris Huds. (G: *P. acaulis*) — dal basso Friuli alla regione montana inf. (fino a 1200 m, Valcalda), Goriziano, Carso, Istria.

P. elatior (L.) Hill — regione montana (Alpi Giulie: M. Sart; Prealpi Carniche: Val Cimoliana).

P. veris L.

subsp. *veris* (G: *P. officinalis*) — dall'alto Friuli (Pavia di Udine) alla regione montana inf. (fino a 1200 m).

subsp. *columnae* (Ten.) Lüdi (G: *P. officinalis* subsp. *suaveolens*) — Prealpi Carniche (Val Zemola), Valli del Natisone, Carso (Basovizza, Gorjansko).

P. farinosa L. — basso Friuli, regione montana.

P. halleri J.F.Gmel. (G: *P. longiflora*) — regione montana.

P. glutinosa Wulf. — Alpi Carniche occ. (Cima Vanscuro, M. Cavallino, Col Quaternà).

P. wulfeniana Schott (G: *P. spectabilis* subsp. *Wulfeniana*) — Alpi e Prealpi Carniche.

P. minima L. — regione montana.

P. tyrolensis Schott. — Prealpi Carniche occ. (Cridola, Monfalconi, Pramaggiore).

P. auricula L.

subsp. *auricula* — regione montana, Goriziano (Sabotino), Carso (Orlek, Škocjan);

subsp. *balbisii* (Lehm.) Nyman — Prealpi Carniche.

Androsace L.

A. obtusifolia All. — Alpi Carniche occ. (Val Visdende, La Pitturina).

A. vitaliana (L.) Lapeyr. (F: *Vitaliana primuliflora*; G: *Douglasia Vitaliana*) — Alpi Carniche (Pic Cjadin, Coglians).

A. villosa L. — Alpi e Prealpi Giulie (Canin, Sart, Casariuvaz, Ongarina, Plauris), Prealpi Carniche (Val Cimoliana, M. Cavallo).

A. hausmannii Leyb. — Alpi Carniche (Monfalconi, Dolomiti Pesarine).

A. alpina (L.) Lam. — Alpi Carniche occ. (M. Cavallino).

Cortusa L.

C. matthioli L. — M. Cavallo di Aviano, indicazione dubbia risalente allo Zannichelli (1726).

Soldanella L.

S. pusilla Baumg. — regione montana.

S. minima Hoppe — regione montana.

S. alpina L. — regione montana.

Hottonia L.

H. palustris L. — alto Friuli (lago di S. Daniele), Goriziano (lago di Pietrarossa).

Cyclamen L.

C. purpurascens Mill. (G, M: *C. europaeum*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Lysimachia L.

L. vulgaris L. — dal mare alla regione montana inf. (—1000 m, Rivalpo, Forni di Sopra), Goriziano, Carso, Istria.

L. nummularia L. — basso Friuli (Bistrigna, Scodovacca), Goriziano (Medea, Monfalcone, Cormonese, Doberdò), Istria (Osopo).

L. punctata L. — alto Friuli (Udine, Fagagna, Martignacco, Susans; Cividale), Carso, Istria.

Trientalis L.

T. europaea L. — Alpi Carniche (Comeglians), indicazione dubbia.

Anagallis L.

A. tenella (L.) L. — basso Friuli (Virco, Belizza, fra Castions di Strada e Corgnolo).

A. arvensis L. (G: *A. arvensis* subsp. *phoenicea*) — dal mare alla regione montana inf. (—1000 m, Rigolato, Ludaria), Goriziano, Carso, Istria.

A. foemina Mill. (G: *A. arvensis* subsp. *caerulea*; M: *A. arvensis* var. *caerulea*) — alto Friuli (Udine, Cividale), Goriziano (Brazzano, Cormons), Triestino.

Samolus L.

S. valerandi L. — basso Friuli, Triestino, Istria (Muggia, Capodistria, Strugnano).

PLUMBAGINALES
PLUMBAGINACEAE

Armeria Willd.

A. purpurea Koch (F: *A. maritima* subsp. *purpurea*; G, M: *A. vulgaris* subsp. *elongata*) — basso Friuli (Virco, Torsa, Paradiso, Corgnolo, Castions).

A. alpina Willd. (F: *A. maritima* subsp. *alpina*; G: *A. vulgaris* subsp. *alpina*) — regione montana.

Limonium Mill.

L. serotinum (Rchb.) Pign. (F: *L. vulgare* subsp. *serotinum*; G: *Statice Limonium* subsp. *typicum*; M: *Statice Limonium*) — Triestino (Duino, Zaule), Istria (Strugnano).

L. bellidifolium (Gouan) Dum. (G: *Statice bellidifolia*) — litorale friulano.

L. ramosissimum (Poiret) Maire subsp. *tommasinii* (Pign.) Pign. (G: *Statice olaeifolia* subsp. *confusa*) — litorale friulano (Pineda sinistra presso Grado, Isola Morosini, foci dell'Isonzo).

L. cancellatum (Bernh. ex Bartol.) O. Kuntze (M: *Statice cancellata*) — cresce in prossimità dei limiti meridionali del territorio qui considerato, in Istria a Salvore.

EBENALES
EBENACEAE

Diospyros L.

D. kaki L.f. — coltivato.

OLEALES
OLEACEAE

Jasminum L.

J. nudiflorum Lindl. — coltivato.

J. officinale L. — coltivato.

Forsythia Lab.

F. suspensa (Thunb.) Vahl — coltivata.

Fraxinus L.

F. ornus L. — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

F. excelsior L. — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso (Veliko Gradišče), Istria.

F. angustifolia Vahl — basso Friuli, regione montana inf., (fra Cludinico e Trava), Goriziano (Iago di Pietrarossa), Carso, Istria.

Syringa L.

S. vulgaris L. — coltivato, talvolta spontaneizzato.

Ligustrum L.

L. vulgare L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Olea L.

O. europaea L. — spontaneo forse soltanto nel Triestino (costiera), coltivato altrove.

Phillyrea L.

P. angustifolia L. (G: *Ph. angustifolia* subsp. *typica*) — Grado, S. Giovanni di Duino, indicazioni dubbie.

P. latifolia L. (G: *Ph. angustifolia* subsp. *latifolia*) — Goriziano (Colle di Medea), Triestino, Istria (Osopo).

GENTIANALES
GENTIANACEAE

Blackstonia Huds.

B. perfoliata (L.) Huds. (G: *Chlora perfoliata* subsp. *typica*; M: *Chlora perfoliata*) — dal mare alla regione montana inf. (Amaro), Goriziano, Triestino, Istria.

B. acuminata (Koch & Ziz) Domin (F: *B. perfoliata* subsp. *serotina*; G: *Chlora perfoliata* subsp. *serotina*; M: *Chlora serotina*) — dal basso Friuli (Nogaro, Castions, Friuli or.) alla regione montana inf.

Centaureum Hill.

- C. erythraea* Rafn.
subsp. *erythraea* (G, M: *Erythraea Centaurium*) — dal basso Friuli alla regione montana inf. (—700 m, Magnanins);
subsp. *turcicum* (Velen.) Meleris — Carso, probabilmente anche altrove, ma di distribuzione mal nota.
- C. pulchellum* (Sw.) Druce (G: *Erythraea pulchella* subsp. *typica*; M: *Erythraea pulchella*) — basso Friuli, Goriziano.
- C. tenuiflorum* (Hoffm. & Lk.) Fritsch (G: *Erythraea pulchella* subsp. *tenuiflora*) — litorale friulano, basso Friuli, Goriziano, Istria.
- C. spicatum* (L.) Fritsch (G, M: *Erythraea spicata*) — litorale friulano, basso Friuli, Goriziano, Istria.

Gentiana L.

- G. lutea* L.
subsp. *lutea* — Prealpi Clautane (M. Cavallo di Aviano), Alpi Carniche (Col Gentile, M. Verzegnis);
subsp. *symphyandra* Murb. (G: *G. lutea* p.p.; M: *G. lutea* var. *symphyandra*) — regione montana, Carso (Vremščica), Istria (Slavnik).
- G. punctata* L. — Alpi Carniche.
- G. asclepiadea* L. — regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
- G. pneumonanthe* L. — dal mare alla regione montana inf. (Ligosullo, Forni di Sopra), Goriziano, Carso.
- G. froelichii* Jan ex Rchb. — regione montana (Prealpi Clautane, Prealpi Giulie: M. Plauris).
- G. cruciata* L. — regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- G. clusii* Perr. & Song. (G: *G. acaulis* subsp. *clusii*) — dall'alto Friuli alla regione montana.
- G. acaulis* L. s.str. (G: *G. acaulis* subsp. *kochiana*) — regione montana.
- G. verna* L. (G: *G. verna* subsp. *typica*) — dal basso Friuli alla regione montana.
- G. tergestina* (Beck) Fritsch (F: *G. verna* subsp. *tergestina*; M: *G. angulosa* var. *tergestina*) — Goriziano (M.S.Valentino), Carso, Istria.
- G. brachyphylla* Vill. — Alpi Carniche occ. (Cima Vallona, M. Cavallino, Fleons occ.).
- G. orbicularis* Schur (F: *G. brachyphylla* subsp. *favratii*) — regione montana.
- G. pumila* Jacq. (G: *G. verna* subsp. *pumila*) — regione montana.
- G. bavarica* L. — Alpi Carniche.
- G. terglouensis* Hack. (G: *G. verna* subsp. *imbricata* Gortani non Froel.) — regione montana.
- G. nivalis* L. — regione montana.
- G. utriculosa* L. — dal basso Friuli (Castions) alla regione montana, Carso.

Gentianella Moench

- G. tenella* (Rottb.) Börner — Alpi Carniche occ. (Peralba, Palombino).
- G. nana* Wulf. — indicata dal Pirona per il M. Peralba ma probabilmente confusa con la precedente.

- G. ciliata (L.) Borkh. (G: *Gentiana ciliata*) — regione montana, Carso.
 G. pilosa (Wettst.) Holub (G: *Gentiana amarella* subsp. *pilosa* et *sturmiana*: M: *Gentiana anisodonta* Marchesetti non Borb.) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Istria (Slavnik).
 G. anisodonta (Borb.) A. & D. Löve (G: *Gentiana amarella* subsp. *calycina*, *antecedens* et *carnica*) — regione montana.
 G. germanica (Wild.) Börner (G: *Gentiana amarella* subsp. *rhaetica* p.p.) — regione montana.
 G. austriaca (A. & J. Kern.) Holub — Prealpi Giulie (Matajur, sopra Montemaggiore, M. Seriz, Sella Foredôr).

Lomatogonium A. Br.

- L. carinthiacum (Wulf.) Rchb. (G: *Pleurogyne carinthiaca*) — Alpi Carniche (M. Paularo, Pal Piccolo, Passo Volaja, Peralba).

Swertia L.

- S. perennis L. — Alpi Carniche occ. (Col Quaternà).

MENYANTHACEAE

Menyanthes L.

- M. trifoliata L. — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano (lago di Pietrarossa).

APOCYNACEAE

Trachomitum Woodson

- T. venetum (L.) Woodson (G, M: *Apocynum venetum*) — litorale friulano (foci del Tagliamento, Grado), Triestino (estinto).

Vinca L.

- V. minor L. — dal basso Friuli alla regione montana inf. (—750 m., Comeglians, Entrampo), Goriziano, Carso, Istria.
 V. major L. — coltivata e subspontanea.

ASCLEPIADACEAE

Periploca L.

- P. graeca L. — Triestino, coltivata e talvolta inselvatichita.

Asclepias L.

- A. syriaca L. — coltivata e talvolta inselvatichita.

Vincetoxicum Wolf

- V. hirundinaria Med. (G, M: *Cynanchum vincetoxicum*) — dal mare alla regione montana

inf, (—350 m, Collina, Forni di Sopra), Goriziano, Carso, Istria.

RUBIACEAE

Sherardia L.

S. arvensis L. — dal basso Friuli alla regione montana inf. (—1300 m, Sauris, Collina).

Asperula L.

A. aristata L.

subsp. *oreophila* (Briq.) Hayek (G: *A. cynanchica* subsp. *densiflora*, *aristata* et *longiflora*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

A. cynanchica L. — dal basso Friuli alla regione montana inf. (—1000 m, Forni di Sopra), Goriziano, Carso, Istria.

A. taurina L. — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano.

A. tinctoria L. — Istria (Osopo).

A. arvensis L. — Friuli (Udine), Carso, Istria.

A. purpurea (L.) Ehrend. (G, M: *Galium purpureum*) — dall'alto Friuli (Dignano) alla regione montana inf., Carso, Istria.

Galium L.

G. rotundifolium L. — Carso (Veliko Gradišče).

G. boreale L. — dall'alto Friuli alla regione montana inf.

G. odoratum (L.) Scop. (G, M: *Asperula odorata*) — dall'alto Friuli (bosco Romagno) alla regione montana, Carso (Veliko Gradišče, Vremščica).

G. constrictum Chaub. (G: *G. debile*) — Triestino, forse estinto.

G. palustre L. (G: *G. palustre* subsp. *typicum*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., (Cavazzo, Somplago), foci del Timavo, Istria.

G. elongatum K. Presl (G: *G. palustre* subsp. *elongatum*; M: *G. strictum* — basso Friuli (Pordenonese, Aquileia, Nogaro), Goriziano (Pietrarossa).

G. verum L. (F: *G. verum* subsp. *verum*; G: *G. verum* subsp. *typicum*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

G. wirtgenii F.W. Schultz (F: *G. verum* subsp. *wirtgenii*; G: *G. verum* subsp. *ambiguum*) — litorale friulano or. (Sdobba, Madonna Marcellina).

G. mollugo L. (G: *G. mollugo* subsp. *elatum*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

G. album Mill. (G: *G. mollugo* subsp. *erectum*; M: *G. erectum*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

G. corrudifolium Vill. — Istria (Osopo, Strugnano).

G. lucidum All. (G: *G. lucidum* subsp. *Gerardi* et *corrudaefolium*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

G. glaucum L. (G: *Asperula glauca*) — dall'alto Friuli (Pradamano), alla regione montana inf. (Strabût, Cedarchis), Goriziano (lungo l'Isonzo fra la Madonnina del Fante a Mochetta).

G. laevigatum L. (G: *G. aristatum*) — dal basso Friuli (Muzzana) alla regione montana inf. (—1300 m Nevaio d'Avrint), Goriziano.

G. schultesii Vest — Carso, Istria.

- G. rubrum* L. — Alpi Carniche (Terza Piccola, Passo della Mauria).
G. × centroniae Cariot — regione montana inf. (M. Prât, Campone, Valli del Natisone).
G. pumilum Murray (G: *G. silvestre* subsp. *asperum*) — regione montana inf.
G. anisophyllum Vill. (G: *G. silvestre* subsp. *austriacum*) — regione montana.
G. margaritaceum Kern. — Alpi e Prealpi Carniche occ. (dalla Valcellina alla Terza Grande e Brentoni).
G. baldense Sprengel — Prealpi Clautane (M. Cavallo di Aviano).
G. spurium L. (G: *G. aparine* subsp. *spurium*; M: *G. aparine* var. *spurium*) — Alpi Carniche (Collinetta), Istria.
G. noricum Ehrend. — Alpi Giulie (gruppo del Canin).
G. aparine L. — dal mare alla regione montana inf., (—1000 m, Forni Avoltri, Forni di Sopra), Goriziano, Carso, Istria.
G. tricornutum Dandy (G, M: *G. tricorne*) — valli del Natisone (Cividale, Albana), Triestino, Carso, Istria.
G. parisiense L. (G: *G. parisiense* subsp. *typicum*) — alto Friuli (Viscone al T. Torre, Fagagna, S. Daniele), Triestino (Rojano, Terstenicco), Istria (Pirano).
G. divaricatum Lam. (G: *G. parisiense* subsp. *divaricatum*) — alto Friuli (Dignano, Fagagna).

Cruciata Mill.

- C. laevipes* Opiz (G, M: *Galium cruciata*) — dal basso Friuli alla regione montana inf. (—1100 m Frassenetto, Forni di Sopra), Goriziano, Carso, Istria.
C. glabra (L.) Ehrend. (G, M: *Galium vernum*) — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso.

Valantia L.

- V. muralis* L. — Istria (Salvore).

Rubia L.

- R. peregrina* L. — litorale friulano or. (Grado alla Pineda sinistra e a Punta Spin), Triestino (costiera), Istria.
R. tinctorum L. — Triestino, antica segnalazione, probabilmente estinta.

TUBIFLORAE CONVOLVULACEAE

Cuscuta L.

- C. australis* R. Br.
 subsp. *cesatiana* (Bertol.) Feinbr. — litorale friulano or. (Grado), Triestino, avventizia naturalizzata.
C. europaea L. — dall'alto Friuli alla regione montana inf. (—1100 m, Val di Collina), Carso, Istria.
C. epilinum Weihe — Alpi Carniche, avventizia naturalizzata.
C. epithymum (L.) L.
 subsp. *epithymum* — dal mare alla regione montana (—100 m, Forni Avoltri);

- subsp. *kotschyi* (Desm.) Arc. — Istria (Strugnano).
C. campestris Yuncker — Carso (Trebiciano).

Calystegia R. Br.

- C. soldanella* (L.) R. Br. (G, M: *Convolvulus soldanella*) — littorale friulano or., Goriziano (Marina di Monfalcone, Porto Buso, Grado).
C. sepium (L.) R. Br. (G, M: *Convolvulus sepium*) — dal mare alla regione montana (—800 m, Comeglians, Rigolato), Goriziano, Carso, Istria.
C. silvatica (Kit.) Griseb. (M: *Convolvulus sylvestris*) — Triestino (siepi di Guardiella).

Convolvulus L.

- C. cantabrica* L. — alto Friuli (alture di Aviano, val dello Judrio presso Cras), Goriziano, Carso, Istria.
C. arvensis L. — dal mare alla regione montana inf. (—1150 m), Goriziano, Carso, Istria.

Ipomoea L.

- I. purpurea* Roth. — coltivata, spesso inselvatichita.

BORAGINACEAE

Heliotropium L.

- H. europaeum* L. — dal mare all'alto Friuli (S. Daniele), Carso, Istria.

Lithospermum L.

- L. officinale* L. — dal basso Friuli alla regione montana inf. (—1100 m), Goriziano, Carso, Istria.

Buglossoides Moench

- B. purpureocaerulea* (L.) I.M.Johnst. (G, M: *Lithospermum purpureocaeruleum*) — dal mare (Grado) alla regione montana inf. (Avaglio, Cludinico), Goriziano, Carso, Istria.
B. arvensis (L.) I.M.Johnst. (G, M: *Lithospermum arvense*) — dal mare alla regione montana inf. (—600 m.), Goriziano, Carso, Istria.

Onosma L.

- O. visianii* Clementi — Carso (Monrupino) — v. Cacciato in Gior.Bot.It.(1965).
O. helveticum Boiss. emend. Teppn.
subsp. *fallax* (Borb.) Teppn. F, M: *O. echioides*; G: *O. echioides* subsp. *arenarium*) — Goriziano (Agro cormonese), Carso, Istria.
O. javorkae Simk. (F,M: *O. stellatum*; G: *O. echioides* subsp. *cinereum*) — Carso, Istria.

Cerinthe L.

- C. minor* L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Echium L.

- E. italicum* L. (G: *E. italicum* subsp. *altissimum*; M: *E. italicum* var. *altissimum*) — Goriziano (Monfalcone, Sagrado, Gradisca), Istria (Osso, Isola, Strugnano).

E. vulgare L. — dal mare alla regione montana inf. (— 950 m Rivalpo, Ligosullo), Goriziano, Carso, Istria.

Pulmonaria L.

P. officinalis L. (G: *P. officinalis* subsp. *typica*, *saccharata* et *mollis*) — dal basso Friuli (Nogaro, Muzzana) alla regione montana inf. (—1500 m), Goriziano, Carso, Istria.

P. australis (Murr) Sauer (F: *P. visianii*; G: *P. officinalis* subsp. *azurea*; M: *P. angustifolia*) — Prealpi Carniche (Maniago, M. Cavallo di Aviano), Friuli or. (Valli del Natisone), Carso, Istria.

Symphytum L.

S. officinale L. — basso Friuli (Latisana, Cormons, Udine), Goriziano, Carso.

S. bohemicum F.W.Schmid (F: *S. officinale* subsp. *uliginosum*; G: *S. officinale* var. *bohemicum*) — basso Friuli (Porto Rosega, Aquileia), Istria (Strugnano).

S. tuberosum L. (G: *S. tuberosum* subsp. *typicum*) — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

S. bulbosum Schimper (G: *S. tuberosum* subsp. *bulbosum*) — Goriziano (fra Monfalcone e Ronchi), Istria (Muggia, Risano).

Anchusa L.

A. officinalis L. — basso Friuli (Belvedere di Aquileia), Cervignano (fra Villesse e Sagrado), Carso triestino.

A. azurea Mill. (M: *A. italica*) — Triestino (Zaule, Noghere), Istria (Osopo, Muggia, Isola, Pirano, Sicciole).

A. cretica Mill. (M: *Lycopsis variegata*) — Istria (Sicciole).

Borago L.

B. officinalis L. — dal mare alla regione montana inf. (—1250 m), Goriziano, Carso, Istria.

Asperugo L.

A. procumbens L. — Alpi Carniche occ. (Col Quaternà), antica segnalazione di Venzo che andrebbe verificata.

Myosotis L.

M. arvensis (L.) Hill (G: *M. arvensis* subsp. *intermedia*; M: *M. intermedia*) — dal mare alla regione montana inf. (—1300 m Givigliana, Forni di Sopra), Goriziano, Carso, Istria.

M. ramosissima Roch. ex Schult. (G: *M. arvensis* subsp. *collina*; M: *M. hispida*) — dal mare alla regione montana inf. (—1120 m, Givigliana), Istria.

M. stricta Lk. ex Roem. & Schult (G: *M. arvensis* subsp. *stricta*) — basso Friuli (Aquileia, Belvedere), Goriziano (S.Lorenzo di Mossa).

M. sylvatica (L.) Hoffm. (G: *M. pyrenaica* subsp. *silvatica*) — dall'alto Friuli alla regione montana (—1600 m).

M. alpestris F.W.Schmidt (G: *M. pyrenaica* subsp. *typica*) — regione montana.

M. scorpioides L. (G, M: *M. palustris*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

M. nemorosa Bess. (G: *M. palustris* var. *strigulosa*) — regione montana.

Eritrichum Schrad.

E. nanum (L.) Schrad. ex Gaudin — Prealpi Carniche (M. Teverone, M. Cavallo di Aviano), Alpi Carniche (M. Sernio, M. Peralba).

Lappula Gilib.

L. squarrosa (Retz.) Dum. (G: *L. myosotis*; M: *Echinosperrum lappula*) — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso.

Omphalodes Mill.

O. verna Moench — Prealpi Carniche, Friuli or. (Valli del Natisone), Goriziano (Prevali), Carso, Istria.

Cynoglossum L.

C. officinale L. — dal basso Friuli (Belvedere, Strassoldo) alla regione montana (—1300 m Sigillette), Carso, Istria.

C. creticum Mill. (M: *C. pictum*) — Udine, Carso, Istria.

VERBENACEAE

Vitex L.

V. agnus — castus L. — litorale friulano or. (Grado), Goriziano (Villaraspa, Monfalcone), Triestino (Duino, foci del Timavo), Istria (Salvore).

Verbena L.

V. officinalis L. — dal mare alla regione montana (—900 m, Valcalda, Forni di Sopra).

CALLITRICHACEAE

Callitriche L.

C. hermaphrodita L. (M: *C. autumnalis*) — indicata dal Marchesetti per Doberdò, deve trattarsi di un errore, stante la sua distribuzione.

C. stagnalis Scop. (G: *C. palustris* subsp. *stagnalis*) — basso Friuli (S. Vito, Castions, Bagnaria Arsa), Triestino (foci del Timavo), Istria (Capodistria).

C. obtusangula Le Gall (G: *C. palustris* subsp. *obtusangula*) — basso Friuli (Castions).

C. palustris L. (G: *C. palustris* subsp. *verna*) — dal basso Friuli alla regione montana.

LAMIACEAE (LABIATAE)

Ajuga L.

A. genevensis L. — dal mare alla regione montana (—1100 m Forni di Sopra).

A. pyramidalis L. — regione montana.

A. reptans L. — dal mare alla regione montana (—1350 m, Val di Suola).

A. chamaepitys (L.) Schreb. — basso Friuli, Triestino, Istria.

Teucrium L.

- T. scordium* L. (F: *T. scordium* subsp. *scordium*; G: *T. scordium* subsp. *typicum*) — Friuli (Nogaro, Lago di Ospedaletto), Goriziano (Doberdò, Pietrarossa).
T. scordioides Schreb. (G: *T. scordium* subsp. *scordioides*) — litorale friulano (Centinara, Belvedere, Grado), Triestino.
T. botrys L. — Goriziano (Villesse, Mariano, Farra, Vallone), Carso, Istria.
T. chamaedrys L. — dal mare alla regione montana inf. (—900 m), Goriziano, Carso, Istria.
T. flavum L. — Triestino (costiera), Istria.
T. montanum L. — dal mare (Pineda) alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
T. polium L. — litorale friulano (da Caorle a Grado).

Scutellaria L.

- S. galericulata* L. — basso Friuli (Scodovacca, Fiumicello, Castelletto), Goriziano (Molino di Sdobba, Staranzano, Monfalcone).
S. hastifolia L. — Goriziano (Rocca di Monfalcone, Pietrarossa), Istria (Valle del Risano).

Marrubium L.

- M. incanum* Desr. (M: *M. candidissimum*) — Carso, Istria.
M. vulgare L. — Goriziano (Ronchi), Carso.

Melittis L.

- M. melissophyllum* L. — dal basso Friuli (Muzzana, Nogaro) alla regione montana inf. (—1500 m), Goriziano, Carso, Istria.

Galeopsis L.

- G. ladanum* L. (G: *G. ladanum* subsp. *intermedia*) — regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
G. angustifolia (Ehrh.) Hoffm. (G, M: *G. ladanum* subsp. *angustifolia*) — dal basso Friuli alla regione montana, Carso, Istria.
G. speciosa Mill. (G: *G. Tetrahit* subsp. *speciosa*; M: *G. versicolor*) — dall'alto Friuli alla regione montana, Carso, Istria.
G. pubescens Bess. (G: *G. Tetrahit* subsp. *pubescens*) — dal basso Friuli alla regione montana inf. (—900 m, Pesariis, Rivalpo).
G. tetrahit L. (G: *G. Tetrahit* subsp. *typica*) — dal mare alla regione montana inf., Istria.

Lamium L.

- L. orvala* L. — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
L. maculatum L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., (—370 m, Villa, Verzegnis) Goriziano, Carso, Istria.
L. album L. — dall'alto Friuli alla regione montana.
L. purpureum L. — dal mare alla regione montana (—900 m), Goriziano, Carso, Istria.
L. hybridum Vill. (G: *L. intermedium*) — regione montana (da Tolmezzo a Forni di Sopra).
L. amplexicaule L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Lamiastrum Heist. ex Fabr.

- L. flavidum* (F. Herm.) Ehrend. (G: *Lamium galeobdolon*) — dal basso Friuli (Nogaro) alla regione montana.

L. montanum (Pers.) Ehrend. (M: *Lamium galeobdolon*) — Carso, Istria.

Leonurus L.

L. cardiaca L. — dal mare all'alto Friuli (S. Daniele, Fagagna), Goriziano, Carso, Istria.

Ballota L.

B. rupestris (Biv.) Vis. — Istria (a Oltre presso Muggia), antica segnalazione del Loser non più confermata.

B. nigra L.

subsp. *foetida* Hayek (G: *B. nigra* subsp. *typica* var. *borealis*; M: *B. nigra*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

subsp. *velutina* (Posp.) Patzak (G: *B. nigra* subsp. *meridionalis*) — estremamente improbabile in quanto entità più meridionale.

Betonica L.

B. alopecurus L. (F: *Stachys alopecurus*; G: *Stachys Alopecurus* subsp. *typica* et *Jacquini*) — regione montana.

B. hirsuta L. (F: *Stachys monieri*; G: *Stachys densiflora*) — regione montana (Zermula, Crostis, Dimon).

B. officinalis L.

subsp. *officinalis* (F, G, M: *Stachys officinalis*) — regione montana;

subsp. *serotina* (Host) Murb. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Stachys L.

S. alpina L. — regione montana.

S. germanica — alto Friuli (Dignano, Clauzetto), Goriziano, Carso, Istria.

S. cretica L.

subsp. *salviifolia* (ten.) Rech.f. — Goriziano, Carso, Istria.

S. sylvatica L. — dal mare (Nogaro) alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

S. palustris L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

S. recta L. (F: *S. recta* subsp. *recta*; G: *S. recta* subsp. *typica*) — dal mare alla regione montana inf. (Zuglio), Goriziano, Carso, Istria.

S. labiosa Bertol. (F, G: *S. recta* subsp. *labiosa*) — regione montana, Goriziano (Sabotino), Carso, Istria.

S. subcrenata Vis. (F, G: *S. recta* subsp. *subcrenata*) — litorale friulano or. (dune di Grado), Carso, Istria.

var. *fragilis* (Vis.) Boiss. (M: *S. subcrenata* var. *angustifolia*) — Triestino, Istria, forme analoghe anche sulle Prealpi (M. Farra, M. Simeone).

S. annua (L.) L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

S. maritima Gouan — litorale friulano (Lignano, Grado, Primero, Marina di Monfalcone).

Nepeta L.

N. cataria L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

N. pannonica L. (F: *N. nuda* subsp. *nuda*; G: *N. nuda* subsp. *pannonica* et *violacea*; M: *N. nuda*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Glechoma L.

- G. hederacea L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
G. hirsuta W. & K. (M: *G. hederacea* subsp. *hirsuta*) — Goriziano (Collio), Istria (da Ospoa Podpeč).

Prunella L.

- P. laciniata (L.) L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
P. grandiflora (L.) Scholler — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
P. vulgaris L. — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

Melissa L.

- M. officinalis L.
subsp. officinalis — dal mare alla regione montana inf., Goriziano;
subsp. altissima (Sibth. & Sm.) Arc. (M: *M. officinalis* var. *villosa*) — Carso, Istria.

Satureja L.

- S. variegata Host (F: *S. montana* subsp. *variegata*; G: *S. montana* subsp. *communis* et *variegata*; M: *S. montana* subsp. *communis*, *variegata* et *humifusa*) — regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
S. subspicata Bartl. ex Vis.
subsp. liburnica Šilić (M: *S. subspicata*) — Carso, Istria.
S. hortensis L. — coltivata.

Acinos Mill.

- A. arvensis (Lam.) Dandy (G: *Satureja Acinos*; M: *Calamintha Acinos*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
A. alpinus (L.) Moench (G: *Satureja alpina*) — regione montana.

Calamintha Mill.

- C. grandiflora (L.) Moench (G: *S. grandiflora*) — Prealpi Carniche (Meduno, Avrint), Prealpi Giulie (Erbezzo), Carso, Istria.
C. sylvatica Bromf.
subsp. sylvatica (G: *Satureja calamintha* subsp. *typica*; M: *C. officinalis*) — dal mare alla regione montana inf. (—900 m), Goriziano, Carso, Istria;
subsp. ascendens (Jord.) P.W.Ball (G: *Satureja calamintha* subsp. *ascendens*) — basso Friuli.
C. nepetoides Jordan (F: *C. nepeta* subsp. *nepeta*; G: *Satureja nepeta* subsp. *typica* et *nepetoides*; M: *C. nepeta*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
C. glandulosa (Req.) Benth. (incl. *C. subnuda* auct.) (F: *C. nepeta* subsp. *glandulosa*; G: *Satureja nepeta* subsp. *subnuda*) — Friuli or., Alpi Carniche (Tolmezzo), da verificare.

Clinopodium L.

- C. vulgare L. (G: *Satureja vulgaris*; M: *Calamintha clinopodium*) — dal mare alla regione montana inf. (—1450 m, Sauris di Sopra), Goriziano, Carso, Istria.

Micromeria Benth.

- M. thymifolia (Scop.) Fritsch (G: *Satureja thymifolia*; M: *Calamintha rupestris*) — regione montana inf. (Timau loc. Fontanon, Plauris, Gemona), Goriziano, Carso, Istria.

Hyssopus L.

- H. officinalis L. — Triestino (Contovello, Val Rosandra), Istria (Črni Kal).

Origanum L.

- O. vulgare L.
 subsp. vulgare — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria;
 subsp. prismaticum Gaudin — Triestino (costiera), Istria (Ospo, Presnica verso lo Slavnik).
 O. majorana L. — coltivato.

Thymus L.

- T. longicaulis K. Presl. (incl. T. illyricus Ronn.) (G: *T. Serpyllum* subsp. *longicaulis*) — alto Friuli (Manzano, Sequals), Goriziano, Carso, Istria.
 T. praecox Opiz
 subsp. praecox — di distribuzione mal nota;
 subsp. polytrichus (Kern. ex Borb.) Ronn. emend. J alas (G: *T. Serpyllum* subsp. *polytrichus*) — regione montana.
 T. pulegioides L. (G: *T. Serpyllum* subsp. *ovatus* incl. subsp. *subcitratus* et subsp. *polytrichus* var. *carniolicus*; M: ? *T. pannonicus*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
 T. montanus W. et K. (F: *T. alpestris*; G: *T. Serpyllum* subsp. *subcitratus* f. *alpestris*) — Alpi Carniche (M. Peralba, Sorgenti del Piave, prati di Sesis, Tudajo, Col Rosson, M. Spino, M. Crostis).

Lycopus L.

- L. europaeus L. — dal mare alla regione montana inf. (900 m), Goriziano, Carso, Istria.
 L. exaltatus L.f. — Goriziano (Ronchi, Villaraspa), Triestino (Grignano, Bagnoli della Rosandra), Istria (Muggia).

Mentha L.

- M. pulegium L. (G: *M. pulegium* subsp. *erecta*) — dal mare all'alto Friuli (Sequals, S. Daniele).
 M. arvensis L.
 subsp. arvensis (G: *M. arvensis* subsp. *palustris*) — regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria;
 subsp. parietariifolia (Beck) Brig. — basso Friuli (Nogaro);
 subsp. austriaca (Jacq.) Brig. — regione montana inf. (Studena, Paularo, Moscardo, Rigolato).
 M. × verticillata L. — Goriziano (Mossa, Russiz, Castelletto).
 M. × gentilis L. — segnalata dal Friuli (Fagagna) e dal Goriziano (Monfalcone), da verificare.
 M. × smithiana R.A. Graham (G: *M. rubra*) — Alpi Carniche (Roggia di Tolmezzo).
 M. aquatica L. — dall'alto Friuli alla regione montana inf.
 M. × piperita L. — coltivata.

- M. × *dumetorum* Schult. — basso Friuli (Aquileia, S. Giorgio, Scodovacca, Macile di Solimbergo).
 M. × *rotundifolia* (L.) Huds. (G: *M. rotundifolia* subsp. *niliaca*) — dal basso Friuli alla regione montana inf. (Aiello, Chiopris, Torreano, bacino medio del Natisone).
 M. *longifolia* (L.) Huds.
 subsp. *longifolia* (G: *M. longifolia* subsp. *typica*, *cordata* et *mollissima*; M: *M. sylvestris*;) — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria;
 subsp. *grisella* (Brig.) Brig. — dal basso Friuli alla regione montana inf. (Castions, Grions del Torre, Sequals, Cavazzo), Goriziano, Carso, Istria.
 M. *spicata* L. (G: *M. viridis* subsp. *typica*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano.

Rosmarinus L.

- R. *officinalis* L. — coltivato e talvolta spontaneo.

Lavandula L.

- L. *angustifolia* Mill. (G: *L. Spica*; M. *L. vera*) — coltivata.

Horminum L.

- H. *pyrenaicum* L. — regione montana.

Salvia L.

- S. *officinalis* L. — Triestino (costiera), Carso, Istria, coltivata altrove.
 S. *glutinosa* L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
 S. *pratensis* L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
 S. *bertolonii* Vis. — distribuzione malnota perchè confusa con la precedente, probabilmente dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
 S. *verbenaca* L. — Triestino, antica segnalazione non più confermata.
 S. *verticillata* L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Ocimum L.

- O. *basilicum* L. — coltivato.

SOLANACEAE

Nicandra Adans.

- N. *physalodes* (L.) Gaertn. — Carso, avventizia.

Lycium L.

- L. *barbarum* L. — coltivato, talvolta inselvatichito.
 L. *chinense* Mill. — coltivato, talvolta inselvatichito.

Atropa L.

- A. *bella-donna* L. — regione montana inf., Carso.

Hyoscyamus L.

- H. niger* L. — dal mare alla regione montana inf. (1250 m), Goriziano, Carso, Istria.
H. albus L. — Friuli (Udine, Cussignacco), antiche segnalazioni del Pirona non più confermate, Istria (Isola, Strignano, Pirano).

Physalis L.

- P. alkekengi* L. — dal mare alla regione montana inf. (—950 m), Goriziano, Carso, Istria.

Capsicum L.

- C. annuum* L. — coltivato.

Solanum L.

- S. nigrum* L.
 subsp. *nigrum* (G: *S. nigrum* subsp. *vulgare*) — dal mare alla regione montana inf. (—850 m), Goriziano, Carso, Istria. Parte della distribuzione dovrà essere attribuita alla sottospecie seguente;
 subsp. *schultesii* (Opiz) Wessely — distribuzione sconosciuta.
S. humile Bernh. ex Willd. (G: *S. nigrum* subsp. *humile*) — regione montana inf. (Carnia: Caneva, Cedarchis).
S. luteum L. (F: *S. luteum* subsp. *luteum*; G: *S. nigrum* subsp. *villosum*) — Goriziano (Lucinico), Triestino.
S. alatum Moench (F: *S. luteum* subsp. *alatum*; G: *S. nigrum* subsp. *miniatum*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Triestino, Istria.
S. nitidibaccatum Bitter — Goriziano, avventizio.
S. dulcamara L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
S. tuberosum L. — coltivato, talvolta inselvatichito.
S. melongena L. — coltivato.

Lycopersicum Mill.

- L. esculentum* Mill. (F, G: *Solanum lycopersicum*) — coltivato, talvolta inselvatichito.

Datura L.

- D. stramonium* L. — dal mare alla regione montana inf. (—900 m), Goriziano, Carso, Istria, spontaneizzato.
D. tatula L. — litorale friulano (Rotta di Primiero), Triestino, avventizio.

BUDDLEJACEAE

Buddleja L.

- B. davidii* Franch. — coltivata e spesso inselvatichita.

SCROPHULARIACEAE

Gratiola L.

- G. officinalis* L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Limosella L.

- L. aquatica* L. — alto Friuli (S.Daniele) antica segnalazione del Suffren mai più confermata, Alpi Carniche occ. (P.M.Croce Comelico).

Verbascum L.

- V. blattaria* L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
V. phoeniceum L. — Friuli (Pozzuolo, Orgnano, Campoformido, Silvela), Goriziano (Pietrarossa, Doberdò).
V. phlomoides L. — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
V. densiflorum Bertol. (G: *V. thapsiforme* subsp. *cuspidatum*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Triestino.
V. thapsus L. — dal mare (Grado) alla regione montana, Goriziano.
V. crassifolium DC. (F: *V. thapsus* subs. *crassifolium*; G: *V. montanum*) — litorale friulano (Canal d'Anfora, Grado), segnalazione di Pospichal che andrebbe verificata.
V. sinuatum L. — Istria (Salvore, Strugnano).
V. pulverulentum Vill. — dal basso Friuli alla regione montana inf. (Amaro, Tolmezzo), Goriziano, Triestino, Istria.
V. lychnitis L. — Friuli or. (Valli del Natisone: M. Mia, Drenchia), Goriziano (Medea), Carso (M. Stena), Istria (Ospo).
V. chaixii Vill. (F: *V. chaixii* subsp. *chaixii*; G: *V. chaixii* subsp. *typicum*; M: *V. nigrum* subsp. *chaixii*) — regione montana inf., Carso, Istria.
V. austriacum Schott ex Roem. & Schult. (F, G: *V. chaixii* subsp. *austriacum*; M: *V. nigrum* subsp. *orientale*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
V. nigrum L. — regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
V. alpinum Turra (F: *V. lanatum*; G: *V. nigrum* subsp. *lanatum*) — regione montana, indicato dal Triestino da Marchesetti, ma forse confuso con il precedente.

Scrophularia L.

- S. vernalis* L. — Friuli or. (Valli del Natisone: stretta di Pradolino, M. Mia, alta valle del T. Malina a Salandri), Carso (Škocjan).
S. nodosa L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
S. auriculata L. (G: *S. aquatica* subsp. *Balbisii* et *alata*) — dal mare (Monfalcone: Porto Rosega) all'alto Friuli (Udine, Cividale), Goriziano.
S. canina L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
S. juratensis Schleich (F: *S. canina* subsp. *hoppii*; G: *S. canina* subsp. *Hoppel*) — regione montana.

Antirrhinum L.

- A. latifolium* Will. — Cividale, antica segnalazione del Pirona non più confermata.
A. majus L. — coltivato e inselvaticito qua e là, probabilmente spontaneo nel Triestino (costiera).

Misopates Rafin.

- M. orontium* (L.) Rafin (G, M: *Antirrhinum Orontium*) — basso Friuli, Goriziano, Triestino, Istria.

Chaenarrhinum (DC.) Rchb.

- C. minus (L.) Lange (F: *Ch. aenorhinum minus* subsp. *minus*; G, M: *Linaria minus*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
C. litorale (Willd.) Fritsch (F: *Chaenorhinum minus* subsp. *litorale*; M: *Linaria litoralis*) — litorale friulano or. (Grado), Carso, Istria.

Linaria Mill.

- L. chalepensis (L.) Mill. — Triestino (costiera), Carso (San Pelagio).
L. vulgaris Mill. (G: *L. vulgaris* subsp. *typica*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
L. angustissima (Loisel.) Borb. (G: *L. vulgaris* subsp. *italica*; M: *L. italica*) — regione montana, Istria (Črnotiče, Ocizla).
L. alpina (L.) Mill. — regione montana.

Cymbalaria Hill

- C. muralis Gärtn., Mey & Scherb. (G, M: *Linaria Cymbalaria*) — dal mare alla regione montana inf. (—950 m), Goriziano, Carso, Istria.

Kickxia Dum.

- K. elatine (L.) Dum.
subsp. elatine (G, M: *Linaria Elatine*) — dal mare all'alto Friuli, Goriziano;
subsp. crinita (Mab.) Greut. (G: *Linaria Elatine* subsp. *Sieberi*; M: *L. Elatine* var. *lasiopoda*) — basso Friuli, Triestino, Istria.
K. spuria (L.) Dum. (G, M: *Linaria spuria*) — Goriziano (Quisca), Triestino (costiera), Istria.

Digitalis L.

- D. grandiflora Mill. (G, M: *D. ambigua*) — regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
D. lutea L. — le indicazioni di J. Ball per le sorgenti del Piave e di Pirona per i colli di Spessa nel Friuli or. si riferiscono con tutta probabilità alla specie precedente.
D. laevigata W. & K. — Carso (M. Ermada, S. Croce, Val Rosandra, Škocjan), Istria (Osopo).

Wulfenia Jacq.

- W. carinthiaca Jacq. — Alpi Carniche (malga Anernig, P. di Pramollo).

Veronica L.

- V. bellidioides L. — Alpi Carniche.
V. serpyllifolia L. — dal mare alla regione montana (—2250 m), Goriziano, Carso, Istria.
V. tenella All. — Alpi Carniche (monti di Sauris: Casera Festons).
V. alpina L. — regione montana.
V. fruticans Jacq. (G: *V. fruticulosa* subsp. *fruticans*) — regione montana, su arenarie e argilloscisti.
V. fruticulosa L. (G: *V. fruticulosa* subsp. *typica*) — regione montana, su rocce carbonatiche.
V. urticifolia Jacq. (G, M: *V. latifolia*) — dall'alto Friuli alla regione montana (—1300 m),

Goriziano, Carso, Istria.

- V. *jacquinii* Baumg. (F: *V. austriaca* subsp. *austriaca*; G: *V. Teucrium* subsp. *austriaca*; M: *V. austriaca*) — Prealpi Giulie (Gemona), Goriziano (Doberdò), Carso, Istria.
- V. *teucrium* L. (F: *V. austriaca* subsp. *teucrium*; G: *V. Teucrium* subsp. *typica*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- V. *aphylla* L. — regione montana.
- V. *officinalis* L. — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- V. *chamaedrys* L. — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
- V. *scutellata* L. — basso Friuli (Nogaro, Aquileia), Goriziano (Castelletto).
- V. *beccabunga* L. — dal mare alla regione montana (—1700 m), Goriziano, Carso, Istria.
- V. *anagalloides* Guss. — Goriziano (Monfalcone, Staranzano), foci del Timavo, Istria (Isola).
- V. *anagallis*—*aquatica* L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- V. *catenata* Pennell — Goriziano (lago di Doberdò), da ricercarsi altrove.
- V. *arvensis* L. — dal mare alla regione montana inf. (—1000 m), Goriziano, Carso, Istria.
- V. *agrestis* L. (G: *V. agrestis* subsp. *typica*) — dal mare alla regione montana inf. (—1100 m), Goriziano, Carso, Istria.
- V. *polita* Fries (G: *V. agrestis* subsp. *didyma*) — dal mare (Grado) alla regione montana inf. (Tolmezzo), Goriziano, Carso, Istria.
- V. *persica* Poir. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- V. *hederifolia* L. — dal mare alla regione montana inf. (—950 m), Goriziano, Carso, Istria.
- V. *sublobata* M. Fisch. (F: *V. hederifolia* subsp. *lucorum*) — Friuli (Passariano, Treppo Grande), Triestino.
- V. *barrelieri* Schott ex Roem. & Schult.
subsp. *barrelieri* (F: *V. spicata* subsp. *barrelieri*; M: *V. spicata*) — Goriziano, Carso, Istria;
subsp. *nitens* (Host) M. Fisch. (F: *V. spicata*; G: *V. spicata* subsp. *typica*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf.

Paederota L.

- P. *bonarota* (L.) L.: (G: *Veronica Bonarota*) — regione montana.
- P. *lutea* Scop. (G: *Veronica lutea*) — regione montana.

Melampyrum L.

- M. *cristatum* L. — basso e alto Friuli, Goriziano, Carso, Istria.
- M. *arvense* L. — basso e alto Friuli, Goriziano, Carso, Istria.
- M. *barbatum* W. & K. — Prealpi Clautane (Val Talagona), da controllare, si riferirà probabilmente alla specie seguente.
- M. *carstiense* (Ronn.) Fritsch. — (F: *M. barbatum* subsp. *carsteiense*; G, M: *M. barbatum*) — basso Friuli (S.Giorgio), Goriziano (Collio), Carso, Istria.
- M. *fimbriatum* Vandas — Triestino (Val Rosandra). Da verificare.
- M. *velebiticum* Borb. (G, M: *M. nemorosum*) — dal basso Friuli (Muzzana) alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- M. *sylvaticum* L. — regione montana.
- M. *pratense* L. — dal basso Friuli (Nogaro) alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

Tozzia L.

T. alpina L. — Alpi Carniche (Palon di Pizzul, M. Tinisa, Peralba).

Euphrasia L.

E. rostkoviana Hayne (G: *E. alpina* subsp. *Rostkoviana*) — regione montana.

E. kernerii Wettst. (F: *E. picta* subsp. *kernerii*; G: *E. alpina* subsp. *Kernerii* incl. *E. tricuspidata* subsp. *italica*) — regione montana, Goriziano, Carso.

E. picta Wimm. (F: *E. picta* subsp. *picta*; G: *E. alpina* subsp. *picta*) — regione montana.

E. pulchella Kern. (G: *E. officinalis* subsp. *minima* var. *pulchella*) — regione montana.

E. marchesettii Wettst. (G: *E. tricuspidata* subsp. *italica* var. *tenuis* Gort. non Posp.) — dal basso Friuli (risorgive) alla regione montana inf., Goriziano (Lisert), Carso.

E. stricta Wolff ex Lehm. (G: *E. officinalis* subsp. *stricta*; M: *E. tatarica*) — regione montana.

E. liburnica Wettst. — Carso, Istria.

E. minima Jacq. ex DC. (G: *E. officinalis* subsp. *minima*) — regione montana.

E. salisburgensis Funck ex Hoppe (G: *E. salisburgensis* subsp. *typica*) — regione montana.

E. portae Wettst. (G: *E. salisburgensis* subsp. *Portae*) — Prealpi Clautane (Forcella Scodovacca, Cima dei Preti).

E. illyrica Wettst. (G: *E. salisburgensis* subsp. *illyrica*) — Carso, Istria. Le indicazioni dalle Alpi Carniche sono dubbie.

E. cuspidata Host (G: *E. tricuspidata* subsp. *typica* et *cuspidata*) — regione montana con predilezione per i gruppi esterni.

Odontites Ludw.

O. lutea (L.) Clairv. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

O. verna (Bell.) Dum. (F: *O. verna* subsp. *verna*; G: *O. serotina* subsp. *verna*) — dal mare alla regione montana inf.

O. vulgaris Moench (F: *O. verna* subsp. *serotina*; G: *O. serotina* subsp. *typica*; M: *O. serotina*) — dal mare (Grado) e basso Friuli (Cordovado, Castions) all'alto Friuli (Udine) e alla regione montana inf., Istria.

Bartsia L.

B. alpina L. — regione montana.

Pedicularis L.

P. acaulis Scop. — regione montana (Alpi Carniche: Amariana, Dimon; Alpi Giulie: Canin), antiche segnalazioni non più confermate, Carso (Senožeh).

P. hoermanniana K. Malý (M: *P. Hacquetii* var. *Tommasinii*) — Prealpi Giulie (Joanaz, Chiampon, Quarnan, Musi, M. Maggiore), Prealpi Carniche (M. Brancot), Istria (Slavnik).

P. hacquetii Graf (G: *P. foliosa* subsp. *typica* et subsp. *sumana*) — Alpi Carniche (Col Gentile, Zermula, Dimon, Zoncolan, Fleons).

P. recutita L. — regione montana.

P. rosea Wulf. — regione montana.

- P. verticillata* L. — regione montana.
- P. palustris* L. — dal basso Friuli (Castions, Paradiso) alla regione montana (Cavazzo, Col Quaternà).
- P. comosa* L. — Prealpi Carniche (Vallone di S. Tomè sopra Dardago), Prealpi Giulie (Matajur), resta da confermare quest'ultima località.
- P. friderici-augusti* Tommas. — Istria (Slavnik, fra Pese e Nazirec).
- P. tuberosa* L. (G: *P. tuberosa* subsp. *typica*) — Alpi Carniche occ. (M. Cavallino, Col Quaternà, Col Rosson, P.M.Croce Comelico).
- P. elongata* Kern. (G: *P. tuberosa* subsp. *leptostachya*) — Alpi Carniche.
- P. julica* E. May. — Alpi e Prealpi Giulie.
- P. rostratospicata* Crantz (G: *P. incarnata*) — Alpi Carniche (Volaia).
- P. rostratocapitata* Crantz (G: *P. rostrata* subsp. *typica* et *Jacquinii*) — regione montana.
- P. kernerii* DT. — Alpi Carniche occ. (P.M.Croce Comelico, Val Digon, M. Palombino).
- P. gyroflexa* Vill. — Alpi Carniche (M. Dimon, Crasulina sopra Casera Tarond), antiche segnalazioni risalenti al Morassi che andrebbero riviste poichè si trovano completamente al di fuori dell'areale della specie il cui limite sec. Hartl, in Hegi, Ill. Fl. Mitteur. 6(1):241-320 (1969), decorrerebbe a est fra Bolzano e la Val di Fiemme.

Rhinanthus L.

- R. minor* L. — dal basso Friuli alla regione montana inf. (—1300 m), Goriziano, Carso, Istria.
- R. glacialis* Personn. (F: *Rh. aristatus*; G: *Rh. angustifolius* subsp. *typicus*, *lanceolatus* et *subalpinus*; M: *Rh. angustifolius*) — littorale friulano (Grado) e dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
- R. pampaninii* Chab. (G: *Rh. angustifolius* var. *Pampaninii*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., distribuzione da verificare.
- R. freynii* (Sterneck) Fiori (G: *Rh. Alectorolophus* subsp. *Freynii* et cf. *Rh. major* subsp. *Burnati*; M: *Rh. Alectorolophus* var. *Freynii*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- R. alectorolophus* Pollich (G: *Rh. Alectorolophus* subsp. *typicus* et *modestus*) — dal Gortani dato per frequente dal mare alla regione montana inf., ma probabilmente scambiato con il precedente.
- R. facchinii* Chab. (G: *Rh. alectorolophus* subsp. *Facchinii*) — Alpi Carniche (Sigilletto e Frassenetto), da controllare.

Lathraea L.

- L. squamaria* L. — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

GLOBULARIACEAE

Globularia L.

- G. punctata* Lapeyr. (G: *G. vulgaris*; M: *G. Willkommii*) — dalmare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- G. cordifolia* L. — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria. Trattasi probabilmente di *G. meridionalis* (Podp.) O. Schwarz.

BIGNONIACEAE

Campsis Lour.

C. radicans (L.) Seem. — coltivata e talvolta inselvatichita.

Catalpa Scop.

C. bignonioides Walter — coltivata e talvolta inselvatichita.

OROBANCACEAE

Orobanche L.

O. ramosa L. (G: *Kopsia ramosa*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Istria (Oltre).

O. mutelii F.W.Schultz (F: *O. ramosa* subsp. *mutelii*) — Istria (S.Nicolò).

O. alba Steph. ex Willd. — dal mare (Grado) alla regione montana, Carso (Val della Raša).

O. loricata Rchb. — Alpi Carniche occ. (Cima Sappada, Val Rinaldo).

O. picridis F.W.Schultz (F: *O. loricata* p.p.) — Triestino (costiera), Istria (Capodistria).

O. minor Sm. — dal basso Friuli (Aquileia) alla regione montana (P. Pura).

O. hederæ Duby — basso Friuli (Aquileia), Friuli or. (Purgessimo), Triestino (Miramare).

O. caryophyllacea Sm. — alto Friuli (Udine), Goriziano (S. Floriano, Quisca), Carso, Istria.

O. lutea Baumg. (M: *O. rubens*) — dal mare alla regione montana inf. (— 1450 m), Goriziano, Carso, Istria.

O. flava Mart. ex F.W.Schultz — regione montana (Valcellina, Bordaglia).

O. lucorum A. Br. — litorale friulano or. (Grado).

O. gracilis Sm. — dal basso Friuli alla regione montana inf. (—1000 m), Goriziano, Carso, Istria.

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula L.

P. alpina L. — basso Friuli (risorgive di Paradiso, S. Giorgio), regione montana.

P. leptoceras Rchb. (G: *P. alpina* subsp. *leptoceras*) — Prealpi Carniche (M. Cavallo di Aviano), antica segnalazione risalente allo Zannichelli non più confermata.

P. vulgaris L. — regione montana.

Utricularia L.

U. minor L. — dal mare (Punta Sdobba, Porto Rosega) alla regione montana inf. (lago di Cima Corso), Goriziano (Castelletto, Cormons).

U. vulgaris L. (G: *U. vulgaris* subsp. *typica*) — dal basso Friuli (S. Giorgio, Cordovado, Corgnolo) alla regione montana inf. (Cavazzo, lago di Cima Corso), Triestino (S. Giovanni di Duino).

U. australis R. Br. (G: *U. vulgaris* subsp. *neglecta*) — Goriziano (Doberdò, Castelletto, Mossa).

PLANTAGINALES
PLANTAGINACEAE

Plantago L.

P. major L.

subsp. *major* — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria;
subsp. *intermedia* (Godr.) Arc. (G: *P. major* subsp. *paludosa*) — dal mare (Grado, Primiero, Canal d'Anfora, Isola Morosini) al basso Friuli (Muzzana).

P. cornuti Gouan — litorale friulano (da Lignano alle foci del Timavo), Istria (Strugnano).

P. coronopus L. — antiche segnalazioni del Pirona per il basso Friuli (Aquileia, Monfalcone) che andrebbero verificate, Triestino, Istria.

P. crassifolia Forsk. — antiche segnalazioni dal litorale friulano risalenti al Pirona e al Tommasini che andrebbero verificate.

P. holosteuum Scop. (G: *P. maritima* subsp. *serpentina* e *P. subulata* subsp. *carinata*; M: *P. carinata*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

P. media L. — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

P. atrata Hoppe (G: *P. montana*) — regione montana.

P. lanceolata L. (incl. cf. *P. sphaerostachya* (Mert. & Koch) Kern., presente soprattutto nella zona magredile dell'alto Friuli) — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

P. altissima L. (G: *P. lanceolata* subsp. *altissima*) — dal basso Friuli alla regione montana inf. (Tolmezzo), Goriziano, Triestino, Istria.

P. argentea Chaix — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

P. indica L. (F, M: *P. arenaria*; G: *P. ramosa*) — litorale friulano, avventizia nel Triestino.

DIPSACALES
CAPRIFOLIACEAE

Sambucus L.

S. ebulus L. — dal basso Friuli alla regione montana inf. (— 1750 m, Ca.ra Tragonia), Goriziano, Carso, Istria.

S. nigra L. — dal basso Friuli alla regione montana inf. (—1150 m Val Pesarina), Goriziano, Carso, Istria.

S. racemosa L. — regione montana, Carso (Vremščica).

Viburnum L.

V. opulus L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

V. tinus L. — Triestino (costiera), Istria (Strugnano, Pirano, Isola).

V. lantana L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Symphoricarpos Duh.

S. rivularis Suksd. (F: *S. albus*; G: *S. racemosus*) — coltivato.

Lonicera L.

L. caerulea L. — regione montana.

- L. alpigena* L. — regione montana, Carso (Val della Raša).
L. nigra L. — regione montana.
L. xylosteum L. — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
L. japonica Thunb. — coltivato e diffusamente rinselvatichito.
L. caprifolium L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
L. etrusca Santi — litorale friulano or. (Grado), Goriziano, Carso, Istria.
L. sempervirens L. — coltivato.

ADOXACEAE

Adoxa L.

- A. moschatellina* L. — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

VALERIANACEAE

Valerianella Mill.

- V. locusta* (L.) Laterrade (G, M: *V. olitoria*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
V. carinata Loisel. — Triestino.
V. dentata (L.) Pollich — dal basso Friuli alla regione montana inf. (Frassenetto), Goriziano, Carso, Istria.
V. rimosa Bast. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
V. eriocarpa Desv. — Triestino, Istria.

Valeriana L.

- V. officinalis* L. (G: *V. officinalis* subsp. *typica*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano.
V. wallrothii Kreyer (F: *V. officinalis* subsp. *collina*; G: *V. officinalis* subsp. *tenuifolia*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
V. tuberosa L. — Carso.
V. dioica L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., (—1250 m), Goriziano, foci del Timavo.
V. tripteris (G: *V. tripteris* subsp. *typica* et *intermedia*) — regione montana, Carso (Val della Raša).
V. montana L. — regione montana.
V. saxatilis L. — regione montana.
V. elongata Jacq. — regione montana.

Centranthus DC.

- C. ruber* (L.) DC. — coltivato e talvolta inselvatichito.

DIPSACACEAE

Cephalaria Schrad. ex Roem. & Schult.

- C. leucantha* (L.) Schrad. ex Roem. & Schult. — Goriziano (Monfalcone), Carso

(Sistiana).

C. transylvanica (L.) Schrad. ex Roem. & Schult. — Istria (Buie).

C. alpina (L.) Schrad ex Roem. & Schult. — M. Cavallo di Aviano, antica segnalazione di Kellner in Gortani che attende conferma.

Dipsacus L.

D. fullonum L. (G, M: *D. sylvestris*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

D. laciniatus L. — dal basso all'alto Friuli (Udine, Buttrio), Goriziano (Villanova), Triestino, Istria (Capodistria).

D. pilosus L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano (foci dell'Isonzo).

Succisa Hall.

S. pratensis Moench — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso.

Succisella Beck

S. inflexa (Kluk) Beck (G: *Succisa australis*) — basso Friuli, Goriziano (Castelletto), Istria (Muggia).

Knautia L.

K. drymeia Heuff.

subsp. *drymeia* (G: *K. sylvatica* subsp. *typica*) — dal mare alla regione montana inf;

subsp. *tergestina* (Beck) Ehrend. (G: *K. sylvatica* subsp. *dipsacifolia*) — Friuli or. (bacino medio del Natisone) da confermare, Goriziano (Collio), Carso, Istria.

K. ressmannii (Pach.) Briq. (G: *K. arvensis* subsp. *rigidiuscula*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf.

K. longifolia (W. & K.) Koch — regione montana.

K. arvensis (L.) Coult. s.str. (G: *K. arvensis* subsp. *typica*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf. (soprattutto nella parte più occ. del territorio).

K. illyrica Beck (G: *K. arvensis* subsp. *typica* var. *integrifolia*) — Friuli or. (magredi), Goriziano, Carso, Istria.

K. fleischmannii (Hladn. ex Rchb.) Pach. — Istria (Slavnik).

K. integrifolia (L.) Bertol. (G: *K. integrifolia* subsp. *hybrida*; M: *K. hybrida*) — Goriziano (Bistrigna), Istria (Capodistria, Strugnano).

Scabiosa L.

S. graminifolia L. — dall'alto Friuli (magredi) alla regione montana, Goriziano (forre dell'Isonzo presso Salcano).

S. argentea L. (G: *S. argentea* subsp. *Wulfenii*) — litorale friulano (Porto Buso, Grado, Alberoni).

S. gramuntia L. (F: *S. triandra*; G: *S. gramuntia* subsp. *affinis* et *agrestis*, *S. Columbaria* subsp. *uniseta*; M: *S. Columbaria* var. *gramuntia* et *lejocephala*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

S. lucida Vill. (G: *S. Columbaria* subsp. *lucida*) — regione montana.

S. columbaria L. (G: *S. Columbaria* subsp. *typica*) — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano.

- S. dubia* Velen. — sarebbe presente nella regione montana, da confermare.
S. ochroleuca L. (G: *S. Columbaria* subsp. *ochroleuca*) — Goriziano (Castelnuovo presso Sagrado).

CAMPANULALES CAMPANULACEAE

Campanula L.

- C. zoysii* Wulf. — Alpi Giulie, Alpi Carniche (Amariana).
C. patula L. — regione montana.
C. rapunculus L. — dal basso Friuli alla regione montana inf. (Somplago, Mena), Goriziano, Carso, Istria.
C. persicifolia L. — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
C. barbata L. — regione montana.
C. sibirica L. — litorale friulano or. (Grado) e dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
C. glomerata L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
C. cervicaria L. — litorale friulano or. (Grado), Friuli or. (Castelmonte), Goriziano (Prevali, Russiz).
C. spicata L. — regione montana.
C. thyrsoides L.
 subsp. *thyrsoides* — regione montana;
 subsp. *carniolica* (Sünd.) Podl. — da verificare la presenza.
C. pyramidalis L. — dall'alto Friuli (Udine) alla regione montana inf. (Amaro, Venzona, Gemona), Goriziano, Carso, Istria.
C. morettiana Rchb. — Prealpi Clautane (Forcella delle Pregoiane).
C. trachelium L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
C. rapunculoides L. — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
C. bononiensis L. — alto Friuli (Castions, Udine, Dignano), Goriziano, Carso, Istria.
C. carnica Schiede ex Mert. & Koch (G: *C. rotundifolia* subsp. *linifolia*) — regione montana.
C. justiniana Witasek (M: *C. pusilla*) — Carso (Škocjan).
C. marchesettii Witasek — Istria (Slavnik).
C. witasekiana Vierh. — Prealpi Carniche e da ricercarsi altrove nella regione montana.
C. cochleriifolia Lam. (G: *C. Bellardi*) — regione montana.
C. caespitosa — dall'alto Friuli (magredi, forra del Natisone a Premariacco) alla regione montana, Goriziano (forre dell'Isonzo).
C. scheuchzeri Vill. (G: *C. rotundifolia* subsp. *Scheuchzeri*) — regione montana.
C. rotundifolia L. (G: *C. rotundifolia* subsp. *typica* et *tenuifolia*) — dall'alto Friuli alla regione montana.

Adenophora Fisch.

- A. liliifolia* (L.) A.DC. — regione montana inf. (Moggio, Cavazzo, Verzegnis, Tolmezzo, Illegio, Chiampon).

Legousia Durande

- L. hybrida* (L.) Delabre (M: *Specularia hybrida*) — Triestino, Istria.
L. speculum-veneris (L.) Chaix (G, M: *Specularia Speculum*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Phyteuma L.

- P. spicatum* L. — regione montana.
P. ovatum Honck. (G, M: *Ph. Halleri*) — regione montana, Carso (Vremščica, Val della Raša).
P. zahlbruckneri Vest (G, M: *Ph. Micheli*) — regione montana, Carso (Cocusso, Vremščica).
P. betonicifolium Vill. — Alpi Carniche occ. (Dosoledo, M. Cavallino, Col Quaternà).
P. orbiculare L. — regione montana, Carso, Istria (Slavnik).
P. sieberi Spreng. — regione montana.
P. scheuchzeri All.
 subsp. *columnae* (Gaudin) Becherer (G, M: *Ph. Scheuchzeri*) — regione montana inf. con preferenza dei gruppi esterni, Goriziano (forrea dell'Isonzo), Carso (Val della Raša).
P. hemisphaericum L. — regione montana.
P. globulariifolium Sternb. & Hoppe — Alpi Carniche occ. (Peralba, M. Ferro, Vanscuro, Cavallino, La Pitturina, Cima Vallona).

Physoplexis (Endl.) Schur

- P. comosa* (L.) Schur (G: *Phyteuma comosum*) — regione montana.

Edrajanthus A.DC.

- E. graminifolius* (L.) DC. — Istria (Materija).

Jasione L.

- J. montana* L. — antica segnalazione del Suffren per Pontebba, mai più confermata.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Eupatorium L.

- E. cannabinum* L. — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

Solidago L.

- S. virgaurea* L.
 subsp. *virgaurea* (G: *S. Virga-aurea* subsp. *vulgaris*) — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria;
 subsp. *minuta* (L.) Arc. (G: *S. Virga-aurea* subsp. *pygmaea et alpestris*) — regione montana.
S. gigantea Ait.
 var. *serotina* (O. Kuntze) Cronq. (G: *S. serotina*) — coltivata e frequentemente inselvaticata, dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
S. canadensis L. — coltivata e talvolta inselvaticata.

Bellis L.

B. perennis L. — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

B. sylvestris Cyr. — Istria (Buie, Pirano).

Aster L.

A. novi-belgii L. — coltivato e subspontaneo.

A. lanceolatus Willd. — alto Friuli (Pordenone), coltivato e subspontaneo.

A. tradescantii L. — coltivato e subspontaneo.

A. squamatus (Spreng.) Hieron — Goriziano (foci dell'Isonzo), coltivato e subspontaneo.

A. amellus L. — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

A. alpinus L. — regione montana.

A. bellidiastrum (L.) Scop. (G: *Bellidiastrum Michelis*) — regione montana.

A. tripolium L.

subsp. pannonicus (Jacq.) Soó — littorale friulano, basso Friuli (Aquileia), Istria.

A. linosyris (L.) Bernh. — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Erigeron L.

E. annuus (L.) Pers. (G: *Stenactis annua*)

subsp. annuus — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria, spontaneizzato;

subsp. strigosus (Mühlenb. ex Willd.) Wagenitz — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria, spontaneizzato.

E. acris L.

subsp. acris (G: *E. acer* subsp. *typicus*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria;

subsp. angulosus (Gaud.) Vacc. (G: *E. acer* subsp. *Droebachensis*) — regione montana (Paularo, Ramaz).

E. atticus Vill. — Alpi Carniche (Val de Carnia in Valvisdende, Col Gentile e M. Forchia).

E. alpinus L. (G: *E. alpinus* subsp. *typicus* p.p.) — regione montana.

E. polymorphus Scop. (F: *E. glabratus*; G: *E. alpinus* subsp. *typicus* p.p.) — regione montana.

E. uniflorus L. (G: *E. alpinus* subsp. *uniflorus*) — Alpi Carniche.

Conyza Less.

C. canadensis (L.) Cronq. (G: *Erigeron canadensis*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria, spontaneizzato.

C. bonariensis (L.) Cronq. (G: *Erigeron crispus*) — littorale e basso Friuli, Triestino, Istria, spontaneizzato.

Filago L.

F. vulgaris Lam. (G: *F. germanica* subsp. *typica*; M: *F. germanica*) — alto Friuli, Goriziano, Carso, Istria.

F. poyramidata L. (G: *F. germanica* subsp. *spathulata*; M: *F. spathulata*) — alto Friuli, Goriziano, Carso, Istria.

F. minima (Sm.) Pers. (F: *Logfia minima*) — Carso (Vreme), Istria (Padež, Beka, Očizla).

Micropus L.

M. erectus L. (F: *Bombycilaena erecta*) — Goriziano, Carso, Istria.

Gnaphalium L.

G. sylvaticum L. (F: *Omalotheca sylvatica*; G: *G. sylvaticum* subsp. *rectum*) — regione montana, Goriziano, Carso.

G. norvegicum Gunn. (F: *Omalotheca norvegica*; G: *G. sylvaticum* subsp. *norvegicum*) — Alpi Carniche.

G. hoppeanum Koch (F: *Omalotheca hoppeana*; G: *G. supinum* subsp. *hoppeanum*) — Alpi Carniche.

G. supinum L. (F: *Omalotheca supina*; G: *G. supinum* subsp. *typicum*) — Alpi Carniche.

G. uliginosum L. (F: *Filaginella uliginosa*; G: *G. uliginosum* subsp. *ramosum*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, foci del Timavo, Carso, Istria.

G. luteo-album L. — basso Friuli, Istria (Osso).

Helichrysum Mill. em. Pers.

H. italicum (Roth) Guss. — Carso (Sežana), Istria (Črni Kal, Podgorje).

Antennaria Gaertn.

A. dioica (L.) Gaertn. — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

A. carpatica (Wahlenb.) Bluff & Fing. — regione montana.

Leontopodium R. Br.

L. alpinum Cass. — regione montana.

Inula L.

I. helenium L. — Istria (Klanec, Padez, Obrov).

I. salicina L. — dal mare alla regione montana inf. (— 400 m), Goriziano, Carso, Istria.

I. spiraeifolia L. — littorale friulano or. (Grado), Prealpi Carniche (M.S. Simeone, M. Verzegnis in loc. Duebis), Goriziano, Carso, Istria, le indicazioni dalla Valcellina del Ball vanno accolte con grande riserva.

I. hirta L. (G: *I. hirta* subsp. *oblongifolia* et *rotundifolia*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

I. ensifolia L. — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano (Sabotino), Carso, Istria (Slavnik).

I. britannica L. — dal basso Friuli al Friuli or. (Valli del Natisone), Goriziano, Carso, Istria.

I. conyzia DC. — dal basso Friuli alla regione montana inf. (— 600 m), Goriziano, Carso, Istria.

I. crithmoides L. — littorale friulano, Goriziano (Locavez, Pietrarossa), Triestino, Istria.

I. viscosa (L.) Ait. (F: *Dittrichia viscosa*; M. *Cupularia viscosa*) — littorale friulano, Triestino (costiera), Istria.

I. graveolens (L.) Desf. (F: *Dittrichia graveolens*) — Istria (Salvore).

Pulicaria Gaertn.

P. dysenterica (L.) Bernh. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

P. vulgaris Gaertn. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Istria.

Carpesium L.

- C. cernuum L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso.
C. abrotanoides L. — basso Friuli, Goriziano.

Bupthalmum L.

- B. salicifolium L. (G: *B. salicifolium* subsp. *typicum*) — dal basso Friuli (Nogaro) alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
B. grandiflorum L. (G: *B. salicifolium* subsp. *grandiflorum*) — regione montana.

Telekia Baumg.

- T. speciosa (Schreb.) Baumg. — Istria (rio Padež).

Pallenis (Cass.) Cass

- P. spinosa (L.) Cass. — Istria.

Bidens L.

- B. tripartita L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
B. radiata Thuill. — Triestino, avventizia.
B. cernua L. — dal mare all'alto Friuli (Fagagna, Buia), Goriziano, Triestino (foci del Timavo).
B. frondosa L. — regione montana inf. (conca di Tolmezzo), Goriziano, Triestino, avventizia.
B. bipinnata L. — dal basso Friuli alla regione montana inf. ove viene talvolta coltivata, Goriziano, Triestino.

Cosmos Cav.

- C. bipinnatus Cav. — coltivato e talvolta inselvatichito.

Rudbeckia L.

- R. laciniata L. — coltivata e talvolta inselvatichita.

Helianthus L.

- H. annuus L. — coltivato, talvolta inselvatichito.
H. tuberosus L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria, avventizio.

Ambrosia L.

- A. maritima L. — litorale friulano (Lignano).
A. artemisiifolia L. — regione montana inf. (Villa Santina), Goriziano (Monfalcone, Jamiano), avventizia.
A. coronopifolia Torrey & A. Gray — Goriziano (Monfalcone), Triestino, avventizia.
A. trifida L. — litorale friulano or. (Grado), avventizia.

Xanthium L.

- X. strumarium L. — dal basso Friuli alla regione montana inf. (Tolmezzo, Enemonzo), Goriziano, Triestino, Istria.
X. italicum Moretti (F: *X. strumarium* subsp. *italicum*) — basso Friuli, Triestino, Istria.
X. spinosum L. — litorale friulano (Lignano), Goriziano, Carso, Istria, avventizio naturalizzato.

Galinsoga Ruiz & Pavon

- G. parviflora Cav. — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
G. ciliata (Rafin.) Blake — dall'alto Friuli (Tricesimo) alla regione montana inf., Triestino, avventizia.

Tagetes L.

T. minuta L. — Trieste, Istria, avventizia.

Anthemis L.

A. montana L. (F: *A. cretica* subsp. *cretica*) — Alpi Carniche occ. (M. Peralba), segnalazione riportata da Pampanini in "La Flora del Cadore": 774 (1958), ma da ritenersi dubbia.

A. arvensis L.

subsp. *arvensis* (G: *A. arvensis* subsp. *typica*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria;

subsp. *incrassata* (Loisel.) Nyman — basso Friuli, Istria.

A. cotula L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

A. tinctoria L. — Goriziano, Carso.

A. altissima L. — basso Friuli (Aquilaia), Triestino (Grignano), Istria.

A. segetalis Ten. (M: *A. Pseudo-Cota*) — Triestino, Istria.

Achillea L.

A. oxyloba (DC.) F.W.Schultz (G: *A. alpina*) — Alpi Carniche.

A. moschata Wulf. (G: *A. erba-rotta* subsp. *moschata*) — Alpi Carniche occ. (Col Quaternà, M. Cavallino; la vecchia segnalazione del De Santa da Tragonia non è stata confermata).

A. atrata L. — regione montana.

A. clavenae L. (G: *A. clavenae* subsp. *argentea*, *intercedens* et *capitata*) — regione montana.

A. macrophylla L. — Alpi Carniche (monti di Sauris: Festons, Malins; Cason di Lanza).

A. ptarmica L. — Alpi Carniche (Forni Av.).

A. distans W. & K. ex Willd. (F: *A. distans* subsp. *tanacetifolia*; G: *A. Millefolium* subsp. *tanacetifolia*; M: *A. tanacetifolia*). — regione montana, Goriziano (Sabotino), Carso (Slavnik).

A. millefolium L.

subsp. *millefolium* (G: *A. Millefolium* subsp. *asplenifolia*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria;

subsp. *sudetica* (Opiz) Weiss — regione montana.

A. roseo-alba Ehrend. — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

A. collina J. Becker ex Rchb. (G: *A. Millefolium* subsp. *colina*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

A. nobilis L. — Carso, Istria, avventizia.

A. virescens (Fenzl) Heimerl (G: *A. nobilis* subsp. *paucidentata*; M: *A. odorata*) — Goriziano, Carso, Istria.

Tripleurospermum C.H. Schultz

T. inodorum (L.) C.H.Schultz (F: *Matricaria perforata*; M: *Matricaria inodora*) — regione montana inf. (Villa Santina), Triestino, avventizia.

Matricaria L.

- M. chamomilla L. (F: *Chamomilla recutita*) — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
- M. discoidea DC. (G: *M. Chamomilla* var. *suaveolens*; M: *M. Chamomilla* var. *discoidea*) — dal basso Friuli (Castions, Palmanova) alla regione montana inf., Goriziano, Carso (Pliskovica).

Tanacetum L.

- T. vulgare L. (G: *Chrysanthemum vulgare*) — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Istria.
- T. corymbosum (L.) C.H.Schultz (G: *Ch. corymbosum* subsp. *typicum* et *Achilleae*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- T. parthenium (L.) C.H.Schultz (G: *Chrysanthemum parthenium*; M: *Pyrethrum parthenium*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria, coltivato e inselvatichito.
- T. balsamita L. (F: *Balsamita major*) — coltivato.
- T. alpinum (L.) C.H.Schultz (F: *Leucanthemopsis alpina*; G: *Chrysanthemum alpinum*) — Alpi Carniche.

Leucanthemum Mill.

- L. vulgare Lam. s.s. (F: *L. praecox* p.p.; G: *Chrysanthemum Leucanthemum* subsp. *vulgare* et *amplifolium* p.p.; M: *L. vulgare* p.p.) — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
- L. ircutianum DC. (F: *L. praecox* p.p.; G: *Chrysanthemum Leucanthemum* subsp. *vulgare* et *amplifolium* p.p.; M: *L. vulgare* p.p.) — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
- L. liburnicum (Horvatić) Horvatić (F: *L. atratum* subsp. *platylepis* p.p.; M: *L. vulgare* p.p., *L. montanum* p.max.p.) — Goriziano, Carso, Istria.
- L. maximum (Ramond) DC. s.l. (F: *L. heterophyllum* p.p.; G: *Chrysanthemum Leucanthemum* subsp. *heterophyllum* et *montanum*) — regione montana.

Artemisia L.

- A. vulgaris L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- A. verlotorum Lamotte — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria, avventizia in rapida espansione.
- A. absinthium L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- A. alba Turra (G: *A. camphorata*; M: *A. incanescens*) — regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- A. caerulea L. — litorale friulano, Istria.
- A. abrotanum L. — coltivata.
- A. mutellina Vill. (F: *A. umbelliformis*; G: *A. glacialis* subsp. *Mutellina*) — Alpi Carniche (Pizzo di Timau, Ca.ra Tartoi, Dosso Varmost).
- A. nitida Bertol. — regione montana (Prealpi Giulie: M. Lavara, Rio Nero in Val di Resia, M. Zajavor; Alpi Carniche: loc. Fontanona Timau, M. Veltri, Creta di Collina, Creta di Collinetta).
- A. genipi Web. — Alpi Carniche occ. (M. Pietrabianca, Peralba, La Pitturina).
- A. annua L. — Goriziano, Triestino, Istria, avventizia.
- A. dracunculus L. — coltivata.

A. campestris L. — regione montana inf., Carso, avventizia.

Tussilago L.

T. farfara L. — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

Petasites Mill.

P. albus (L.) Gaertn. — regione montana, Goriziano, Carso (Vremščica), Istria (Val Padež).

P. hybridus (L.) G., M. & Sch. (G, M: *P. officinalis*) — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

P. paradoxus (Retz.) Baumg. (G: *P. niveus*) — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano (Pieris, Isola Morosini).

Homogyne Cass.

H. alpina (L.) Cass. (G: *H. alpina* subsp. *typica*) — regione montana.

D. discolor (Jacq.) Cass. — regione montana.

H. sylvestris Cass. — regione montana (Alpi e Prealpi Giulie; Alpi Carniche or.: Vallone di Rio Bianco, Val Aupa, Amariana; Prealpi Carniche: Val Arzino).

Adenostyles Cass.

A. alliariae (Gouan.) Kern. (G: *A. alpina* subsp. *Alliariae*) — regione montana.

A. glabra (Mill.) DC. — (F: *A. alpina* subsp. *alpina*; G: *A. alpina* subsp. *glabra*) — regione alpina.

Arnica L.

A. montana L. — regione montana, Goriziano (Collio), Carso (Vremščica), Istria (Slavnik).

Doronicum L.

D. austriacum Jacq. — regione montana, Goriziano (Sabotino), Carso (Vremščica), Istria (Velike Loče).

D. columnae Ten. — Alpi Carniche (Ca.ra Varmost, Dolomiti Pesarine, Val di Suola, Val Popera, Col Quaternà).

D. pardalianches L. — Alpi Carniche occ. (Val Digon), antica segnalazione del Bolzon, probabilmente confuso con *D. austriacum*.

D. grandiflorum Lam. (G: *D. grandiflorum* subsp. *typicum* et *hirsutum*) — regione montana.

D. glaciale (Wulf.) Nym. (G: *D. grandiflorum* subsp. *glaciale*) — Alpi Carniche (Col Gentile, P.sso di Entralais, Peralba).

D. clusii (All.) Tausch. — Alpi Carniche occ. (Peralba, Tudajo), antiche segnalazioni risalenti a Pirona e a Chiovenda, non più confermate.

Senecio L.

S. incanus L.

subsp. *carniolicus* (Willd.) Br.—Bl. — Alpi Carniche.

S. inaequidens DC. — regione montana inf. (fra Amaro e Tolmezzo, Val del Bût), Goriziano, Triestino, avventizia.

- S. nemorensis* L. (G: *S. nemorensis* subsp. *typicus*; M: *S. nemorensis* var. *odorus*) — regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
- S. fuschsii* C.C.Gmel. (F, G: *S. nemorensis* subsp. *fuschsii*; M: *S. nemorensis* var. *fuschsii*) — regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
- S. cacaliaster* Lam. (G: *S. nemorensis* subsp. *cacaliaster*) — regione montana.
- S. doria* L. — basso Friuli (risorgive).
- S. paludosus* L. — basso Friuli (risorgive), Goriziano, Triestino (foci del Timavo).
- S. doronicum* (L.) L. — regione montana, Carso (M. Sidavnik), Istria (Slavnik).
- S. lanatus* Scop. (F: *S. scopolii*; M: *S. arachnoideus*) — Carso, Istria.
- S. rivularis* (W. & K.) DC. (G: *A. alpester* subsp. *crispatus*; M: *Cineraria alpestris*) — Goriziano (Rubbia, Sabotino), Carso (Vremščica), Istria (Slavnik), le località del Goriziano si riferiscono probabilmente alla specie seguente.
- S. pseudocrispus* (Fiori) E. May. (F: *S. rivularis* subsp. *pseudocrispus*; G: *S. alpester* subsp. *pseudocrispus*) — Prealpi Giulie (Brazzano, Bernadia, Stretta di Pradolino, Forame), Goriziano (Sabotino), cf. Cohrs in Feddes Rep., 56(2):132(1954).
- S. ovirensis* (Koch) DC. (G: *S. alpester* subsp. *brachychaetus*) — Alpi Giulie.
- S. gaudinii* Greml. (F: *S. ovirensis* subsp. *gaudinii*; G: *S. alpester* subsp. *Gaudinii*) — Alpi Carniche.
- S. alpinus* (L.) Scop. (G: *S. alpinus* subsp. *cordifolius* et *appendiculatus*) — Alpi Carniche, Prealpi Clautane (gruppo del M. Cavallo).
- S. jacobaea* L. (G: *S. Jacobaea* subsp. *erucoides*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- S. erraticus* Bertol. (F: *S. aquaticus* subsp. *barbareifolius*; G: *S. Jacobaea* subsp. *barbareifolius* et *aquaticus*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano (Collio), Istria (valle dell'Ospo, Noghère, Sicciole, Capodistria).
- S. erucifolius* L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- S. rupestris* W. & K. — (F: *S. squalidus*; G, M: *S. nebrodensis*) — regione montana, Istria (Slavnik).
- S. abrotanifolius* L. — regione montana.
- S. sylvaticus* L. — Alpi Carniche occ. (Sappada), antica segnalazione del Pirona non più confermata.
- S. viscosus* L. — regione montana, Istria (Valle del Padež).
- S. vulgaris* L. — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

Calendula L.

- C. officinalis* L. (G: *C. officinalis* subsp. *bortensis*) — coltivata.
- C. arvensis* L. (G: *C. officinalis* subsp. *arvensis*) — Triestino, Istria, le antiche segnalazioni dal Goriziano risalenti a Suffren, Host e Brignoli non sono state più confermate.

Carlina L.

- C. corymbosa* L. — Triestino, Istria.
- C. vulgaris* L. — dal basso Friuli alla regione montana inf. Goriziano, Carso, Istria.
- C. stricta* (Rouy) Fritsch (F, G: *C. vulgaris* subsp. *longifolia*) — Alpi carniche.
- C. acaulis* L.
subsp. *acaulis* — regione montana;

subsp. simplex Nyman (G: *C. acaulis* subsp. *alpina*) — regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

C. *acanthifolia* All. — Carso, Istria.

Echinops L.

E. *sphaerocephalus* L. — Goriziano (Is. Morosini e S. Canziano), antiche segnalazioni di Mazzucato e Brignoli che probabilmente si riferiscono alla specie seguente.

E. *exaltatus* Schrad. — Goriziano (Rondon e S. Canziano; Gabria, Poggio Terza Armata), Carso (Škocjan).

E. *ritro* L.

subsp. *ruthenicus* (MB.) Nyman (M: *E. Ritro*) — Goriziano (Sabotino), Carso, Istria.

Arctium L.

A. *tomentosum* Mill. (G: *A. Lappa* subsp. *tomentosum*; M: *Lappa tomentosa*) — regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

A. *lappa* L. (M: *Lappa major*) — Carso, Istria.

A. *pubens* (Bap.) Arènes (G: *A. Lappa* subsp. *pubens*) — regione montana.

A. *minus* Bernh. s.s. (G: *A. Lappa* subsp. *minus*; M: *Lappa minor*) — dal mare alla regione montana inf. (—900 m), Goriziano, Carso, Istria.

A. *nemorosum* Lej. (G: *A. Lappa* subsp. *nemorosum*) — regione montana.

Saussurea DC.

S. *pygmaea* (Jacq.) Spreng. — regione montana (M. Sart e M. Canin, Creta di Aip, M. Cavallo di Pontebba).

S. *alpina* (L.) DC.

subsp. *alpina* (G: *S. alpina* subsp. *typica*) — regione montana;

subsp. *macrophylla* (Saut.) Dostál (G: *S. alpina* var. *macrophylla*) — regione montana.

S. *discolor* (Willd.) DC. (G: *S. alpina* subsp. *lapathifolia*) — regione montana.

Jurinea Cass.

J. *mollis* (L.) Rchb. — Goriziano (Sabotino), Carso, Istria.

Carduus L.

C. *macrocephalus* Desf. (G: *C. nutans* subsp. *macrocephalus*) — regione montana inf. (fra Amaro e Tolmezzo), da controllare.

C. *nutans* L.

subsp. *nutans* — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria;

subsp. *platylepis* (Rchb. & Sauter) Nyman — regione montana

C. *micropterus* (Borb.) Teyber (M: *C. nutans*) — Goriziano, Carso, Istria.

C. *acanthoides* L. — regione montana (P.M. Croce Comelico), Triestino, avventizio.

C. *personata* (L.) Jacq. — regione montana.

C. *crispus* L. — antica segnalazione dello Zannichelli per il M. Cavallo di Aviano, non confermata.

- C. defloratus* L. (G: *C. defloratus* subsp. *summanus* et *transalpinus*) — regione montana.
C. rhaeticus (DC.) Kerner (G: *C. defloratus* subsp. *rhaeticus* p.p.) — regione montana.
C. carlinifolius Lam. (G: *C. defloratus* subsp. *rhaeticus* p.p.) — regione montana.
C. collinus W. & K.
 subsp. *cylindricus* (Borb.) Soò (M: *C. collinus*) — Carso, Istria.
C. carduelis (L.) Gren. — regione montana.
C. picnocephalus L. — Carso, Istria.

Cirsium Mill.

- C. eriophorum* (L.) Scop. — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
C. vulgare (Savi) Ten. (G, M: *C. lanceolatum*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
C. rivulare (Jacq.) All. — Carso (M. Cocusso), non più confermato.
C. erisithales (Jacq.) Scop. — regione montana.
C. oleraceum (L.) Scop. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Triestino (foci del Timavo), Istria.
C. spinosissimum (L.) Scop. — regione montana.
C. acaule Scop. — regione montana (For.lla Lavardêt), Goriziano, Carso, Istria.
C. heterophyllum (L.) Hill (F: *C. helenioides*) — Alpi Carniche.
C. pannonicum (L.fil.) Link — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria. Nella regione montana si nota spesso *Cirsium linkianum* (= *C. pannonicum* x *erisithales*); al di fuori dei limiti qui presi in considerazione è stato raccolto nell'Istria montana *Cirsium freyerianum* (= *C. acaule* x *pannonicum*).
C. canum (L.) All. — litorale e basso Friuli, Goriziano (foci dell'Isonzo, Locavez), Triestino (foci del Timavo).
C. palustre (L.) Scop. — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
C. arvense (L.) Scop. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Picnomon Adans.

- P. acarna* (L.) Cass. (M: *Cirsium Acarna*) — Triestino (Cattinara), Istria.

Onopordum L.

- O. acanthium* L. — Goriziano, Carso, Istria.
O. illyricum L. — Istria (Pirano).

Silybum Adans.

- S. marianum* (L.) Gaertn. — Goriziano (lago di Pietrarossa, Lisert), Triestino (Conconello, S.Giuseppe).

Serratula L.

- S. macrocephala* Bertol. (F: *S. tinctoria* subsp. *macrocephala*; G: *S. tinctoria* subsp. *Vulpii* et *praealta*) — regione montana.
S. lycopifolia (Vill.) Kern. (M: *S. heterophylla*) — Carso (Vremščica), Istria (Slavnik).
S. radiata (W. & K.) MB. — Istria (Podgorje, Praproče).

Rhaponticum Ludw.

- R. scariosum Lam.
 subsp. heleniifolium (Godr. & Gren.) Nyman (F: *Leuzea rhapontica* subsp. *heleniifolia*) — regione montana (Musi, Gran Monte, Chiampon, Talm, M. Cavallo di Aviano).

Centaurea L.

- C. alpina L. — Carso (Merče presso Sežana).
 C. dichroantha Kern. (G: *C. rupestris* subsp. *typica*, *C. × dichroantha*, *C. × sordida*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf.
 C. rupestris L. — Goriziano (Sabotino), Carso, Istria.
 C. scabiosa L. (G: *C. Scabiosa* subsp. *vulgaris*) — regione montana.
 C. grinensis Reuter
 subsp. fritschii (Hayek) Dostal (G: *C. Scabiosa* subsp. *tenuifolia*, *grinensis*, *coriacea*, *variifolia*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
 C. spinosociliata Seenus
 subsp. cristata (Bartl.) Dostal (G: *C. paniculata* subsp. *cristata*; M: *C. cristata*) — Carso, Istria.
 C. kartschiana Scop. (G: *C. paniculata* subsp. *carsiana*) — Triestino (Duino, Sistiana).
 C. maculosa Lam. (G: *C. paniculata* subsp. *maculosa*) — alto Friuli.
 C. calcitrapa L. — Goriziano, Triestino, Istria.
 C. solstitialis L. — Triestino, Istria.
 C. alba L.
 subsp. splendens (L.) Arcangeli (M: *C. splendens*) — Triestino, Istria.
 C. haynaldii Borb.
 subsp. julica (Hayek) E. May. — regione montana (Alpi e Prealpi Giulie, Prealpi Carniche: M. Frasca).
 C. bracteata Scop. (G: *C. Jacea* subsp. *amara*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf.
 C. weldeniana Rchb. (M: *C. Jacea* et var. *amara*) — Goriziano, Carso, Istria.
 C. forojuliensis Poldini — basso Friuli (risorgive).
 C. jacea L. (G: *C. Jacea* subsp. *vulgaris*) — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
 C. transalpina Schleich. (G: *C. jacea* subsp. *transalpina* et *pratensis*) — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
 C. carniolica Host (G: *C. jacea* subsp. *vochinensis*, M: *C. nigrescens*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
 C. phrygia L.
 subsp. pseudophrygia (C.A.Meyer) Gugl. — Alpi Carniche.
 C. uniflora Turra
 subsp. nervosa (Willd.) Bonn. & Lay. — regione montana.
 C. montana L. — regione montana inf. (Prealpi Carniche: M. Tajet).
 C. triumfettii All. (G: *C. montana* subsp. *Triumfetti* et *variegata*, M: *C. axillaris*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
 C. cyanus L. — dal basso Friuli alla regione montana inf. Goriziano, Carso, Istria.

Crupina (Pers.) Cass.

C. vulgaris Cass. — Triestino, Istria.

Carthamus L.

C. tinctorium L. — littorale friulano (Grado), Istria (Pirano), avventizio, antiche segnalazioni non più confermate.

C. lanatus L. — dal mare all'alto Friuli, Goriziano, Carso, Istria.

Scolymus L.

S. hispanicus L. — littorale friulano, Triestino, Istria.

Cichorium L.

C. intybus L. — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

C. endivia L. — coltivato.

Hedypnois Mill.

H. rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt (F, M: *H. cretica* p.p.) — Istria (Pirano, Buie).

Rhagadiolus Scop.

R. stellatus (L.) Gaertn. — Goriziano (Doberdò), Triestino, Istria (Buie).

Aposeris Less.

A. foetida (L.) Less. — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso (Raša), Istria (Slavnik).

Urospermum Scop.

U. picroides (L.) Desf. — Triestino (costiera), Istria.

Hypochoeris L.

H. maculata L. — dal basso Friuli alla regione montana inf. (—1000 m), Goriziano, Carso, Istria.

H. uniflora Vill. — regione montana.

H. radicata L. — dal basso Friuli alla regione montana inf. (—1100 m), Goriziano, Carso.

Leontodon L.

L. helveticus Mérat em. Widd. (F: *L. pyrenaicus* subsp. *helveticus*; G: *L. pyrenaicus*) — regione montana.

L. montanus Lam. — regione montana (Alpi Giulie: Jof Fuart, Montasio, gruppo del Canin; Alpi carniche: M. Cavallino, Palombino, M. Cavallo di Pontebba, Creta Forata).

L. autumnalis L. — regione montana.

L. hispidus L.

subsp. *hispidus* (G: *L. hispidus* subsp. *typicus*) — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria;

subsp. *hastilis* (L.) Soò (F, G: *L. hispidus* subsp. *danubialis*; M: *L. hastilis* excl. var. *dubius*) — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

L. brumatii Rchb. (G: *L. hispidus* subsp. *brumatii*) — Friuli (forra del Natisone da

S. Pietro a Premariacco), Goriziano (Pieris, Monfalcone).

- L. *dubius* (Hoppe) Rchb. (F: *L. hispidus* subsp. *alpinus*; G: *L. hispidus* subsp. *danubialis* var. *dubius* p.p.) — regione montana da controllare.
- L. *pseudocripsus* C.H. Schultz (F: *L. hispidus* subsp. *pseudocripsus*) — regione montana.
- L. *hyoseroides* Welw. ex Rchb. (F, G: *L. hispidus* subsp. *hyoseroides*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf.
- L. *crispus* Vill. (G: *L. crispus* subsp. *typicus et tergestinus*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- L. *incanus* (L.) Schrank — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano (Sabotino).
- L. *tenuiflorus* (Gaudin) Rchb. (F: *L. incanus* subsp. *tenuiflorus*) — regione montana inf.
- L. *berinii* (Bartl.) Roth — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano.
- L. *saxatilis* Lam. (F: *L. taraxacoides*; M: *Thrincia hirta*) — litorale friulano (Grado), Istria (Sicciole).

Picris L.

- P. *echioides* L. (G, M: *Helminthia echioides*) — dal mare alla regione montana inf. (Tolmezzo), Goriziano, Carso, Istria.
- P. *hispidissima* (Bartl.) Koch (M: *P. laciniata*) — Carso (M. Spaccato), Istria.
- P. *hieracioides* L.
subsp. *hieracioides* (G: *P. hieracioides* subsp. *typica*) — dal mare alla regione montana, Goriziano;
subsp. *spinulosa* (Bertol.) Arcang. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria;
subsp. *paleacea* (Vest) Domin & Podpera — regione montana inf., Goriziano (Sabotino).

Podospermum DC.

- P. *laciniatum* (L.) DC. (F: *Scorzonera laciniata*) — Carso, Istria (Strugnano).

Scorzonera L.

- S. *purpurea* L. — regione montana.
- S. *rosea* W. & K. (F, G: *S. purpurea* subsp. *rosea*) — regione montana.
- S. *austriaca* Willd. (G: *S. austriaca* subsp. *oblongifolia* & subsp. *stenophylla*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- S. *humilis* L. (G: *S. humilis* subsp. *plantaginea* et *latifrons*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano (S. Floriano).
- S. *aristata* Ramond ex DC. — regione montana.
- S. *hispanica* L. (G: *S. hispanica* subsp. *denticulata*) — Friuli or. (Cividale), Goriziano, Carso, Istria.
- S. *villosa* Scop. (M: *Gelasia villosa*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Tragopogon L.

- T. sinuatus* Avé-Lall. (F, G, M: *T. porrifolius*) — Friuli, coltivato, Istria (Strugnano).
T. dubius Scop. (M: *T. major*) — Triestino, Istria.
T. pratensis L. (G: *T. pratensis* subsp. *typicus*) — probabilmente non presente in regione perchè sostituito dalla specie successiva.
T. orientalis L. (F, G: *T. pratensis* subsp. *orientalis*; M: *T. pratensis*) — regione montana inf. (—1400 m).
T. tommasinii C.H. Schultz — Goriziano, Carso, Istria.

Reichardia Roth

- R. picroides* (L.) Roth (M: *Picridium vulgare*) — Triestino (costiera), Istria (Sicciole, Ospo, Pirano).

Sonchus L.

- S. asper* (L.) Hill
 subsp. *asper* (G: *S. oleraceus* subsp. *asper*) — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria;
 subsp. *glaucescens* (Jord.) J. Ball (G: *S. oleraceus* subsp. *asper* var. *glaucescens*; M: *S. asper* var. *glaucescens*) — Triestino (P.ta Sdobba, Capodistria), Istria.
S. oleraceus L. (G: *S. oleraceus* subsp. *laevis*) — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
S. maritimus L. (G: *S. arvensis* subsp. *maritimus*) — litorale friulano, Istria.
S. arvensis — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Lactuca L.

- L. viminea* (L.) J.&K. Presl — Goriziano, Carso, Istria.
L. quercina (M: *L. sagittata*) — Carso, Istria.
L. serriola L. (G, M: *L. scarriola*) — dal mare all'alto Friuli, Goriziano, Carso, Istria.
L. sativa L. — coltivata e inselvaticata.
L. saligna L. — dal basso Friuli alla regione montana inf. (Tolmezzo), Goriziano, Triestino, Istria.
L. perennis L. — regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Prenanthes L.

- P. purpurea* L. — regione montana.

Mycelis Cass.

- M. muralis* (L.) Dum. (G, M: *Lactuca muralis*) — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

Taraxacum Web.

- T. palustre* agg. (G: *T. officinale* subsp. *paludosum et tenuifolium*; M: *T. tenuifolium*) — dal mare alla regione montana.
T. alpinum agg. (F: *T. apenninum*, G: *T. officinale* subsp. *alpinum*) — regione montana.
T. alpestre agg. (F: *T. nigricans*) — regione montana.
T. fontanum agg. — regione montana.
T. laevigatum agg. (F: *T. erythrospermum*; G: *T. officinale* subsp. *laevigatum*; M: *T.*

officinale var. *taraxacoides*) — regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
T. officinale agg. (G: *T. officinale* subsp. *typicum*) — dal mare alla regione montana.

I summenzionati sei aggregati (sec. Ehrendorfer) corrispondono ad altrettanti gruppi di specie sec. Fl. Euro., IV e a sei rispettive sezioni del gen.: *Palustria*, *Alpina*, *Alpestris*, *Fontana*, *Erythrosperma*, *Taraxacum* = *Vulgaria*). Gli aggregati in base alla revisione di Van Soest (1976 in sched.) figurano rappresentati dalle seguenti piccole entità (segregati):

PALUSTRIA

- T. balticiforme Dahlst. — dal basso Friuli (Codroipo, palude dell'Acqua Reale) alla regione montana inf. (Vinaio, altipiano di Lauco).
T. scaturiginosum G. Hagl — Goriziano (lago di Doberdò, Lisert).
T. tenuifolium (Hoppe) Koch — Triestino (Zaule).

ALPINA

- T. carinthiacum Van Soest — Alpi Carniche (F.lla dell'Inferno, Avanza).
T. melanops Van Soest — Alpi Carniche (Coglians).
T. panalpinum Van Soest — Alpi Carniche (Avanza, Cavallo di Pontebba).

ALPESTRIS

- T. perfissum Van Soest — Prealpi Carniche (Teverone).

FONTANA

- T. fontaniculum Van Soest — Prealpi Carniche (Pramaggiore).

Numerosi altri esemplari non hanno potuto essere determinati oltre la sezione. Essi provenivano dalla Carnia e dalle Prealpi Carniche.

ERYTHROSPERMA

- T. gracillimum Van Soest — Carso (Opicina).
T. silesiacum Dahlst. ex G. Hagl. — Carso (Dobravljë).

Altri esemplari della sect. provenienti dal Carso non erano ulteriormente identificabili.

TARAXACUM (= *Vulgaria*)

senza ulteriore specificazione: — Friuli or. (Valli del Natisone), Alpi Carniche (Arvenis, Pizzul, Zermula).

Chondrilla L.

- C. juncea L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Carso, Istria (Isola, Strugnano).
C. chondrilloides (Ard.) Karsten (G: *Ch. prenanthoides*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf.

Calycocorsus F.W. Schmidt

- C. stipitatus (Jacq.) Rauschert (G: *Willemetia stipitata*) — Alpi Carniche.

Lapsana L.

- L. communis L. — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

Crepis L.

- C. paludosa* (L.) Moench — dal basso Friuli (Pordenone, Nogaro) alla regione montana.
C. terglouensis (Hach.) Kern. — regione montana (Alpi Giulie: Jôf Fuart; Alpi Carniche: Cresta Palombino).
C. kernerii Rech.f. (F: *C. jacquinii* subsp. *kernerii*; G: *G. jacquini*) — regione montana.
C. aurea (L.) Cass. — regione montana.
C. pontana (L.) DT. (F: *C. bocconi*) — Alpi Carniche (Val Frisone), le altre indicazioni in Gortani devono ritenersi spurie.
C. conyzifolia (Gouan) Kern. — regione montana.
C. pyrenaica (L.) Greut. (G: *C. blattarioides*) — Alpi Carniche (Val Pesarina, M. Verzegnis).
C. biennis L. — regione montana, Carso, Istria.
C. chondrilloides Jacq. — Prealpi Carniche (Clauzetto, M. Farra e M. Spia presso Montereale Valcellina), Goriziano, Carso, Istria.
C. froelichiana DC.
 subsp. *dinarica* (Beck) Guterm. (F: *C. praemorsa* subsp. *dinarica*; G: *C. praemorsa* subsp. *incarnata*) — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano.
C. pulchra L. — Friuli, Triestino (costiera), Istria.
C. foetida L. (G: *C. foetida* subsp. *typica*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
C. rhoeadifolia MB. (F, G: *C. foetida* subsp. *rhoeadifolia*) — litorale friulano (Grado), Goriziano, Carso, Istria.
C. sancta (L.) Bab. — Goriziano (Vallone), Istria (Monte di Capodistria, Strugnano).
C. zacintha (L.) Bab. (M: *Zacintha verrucosa*) — Istria.
C. capillaris (L.) Wallr. (G: *C. virens*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano.
C. neglecta L. (G: *C. neglecta* subsp. *cernua*) — basso Friuli, Carso, Istria.
C. vesicaria L. — Carso, Istria.
C. taraxacifolia Thuill. (F: *C. vesicaria* subsp. *haenseleeri*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
C. setosa Hall.f. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Hieracium L.

- H. staticifolium* All. (F: *Tolpis staticifolia*) — regione montana.
H. hoppeanum Schult. — regione montana.
H. peleteranum Mérat — Alpi Carniche occidentali.
H. latisquamum N. & P. (F: *H. × viridifolium*) — Alpi Carniche occ.
H. pilosella L. — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
H. florentoides Arv.-Touv. — Alpi Carniche.
H. brachiatum Bertol. ex DC. — Friuli or., Carso.
H. permutatum N. & P. — Alpi Carniche.
H. lactucella Wall. (G, M: *H. auricula*) — regione montana, Goriziano.
H. glaciale Reyn. — regione montana.
H. niphobium N. & P. (F: *H. × niphostribes*, G: *H. smithii*) — Alpi Carniche.
H. sphaerocephalum Froel. (G: *H. furcatum*) — Alpi Carniche.
H. eurylepium N. & P. — Alpi Carniche.

- H. piloselloides* Vill. (G, M: *H. florentinum*) — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
- H. alpicola* Schleich. ex Steud. & Hochst. — Alpi Carniche.
- H. prealtum* Vill. (G: *H. florentinum* subsp. *prealtum*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- H. baubini* Schult. (M: *H. prealtum* var. *baubini*) — Goriziano, Carso, Istria.
- H. cymosum* L. — presente con *H. sabinum* Seb. & Mauri sulle Prealpi Giulie (M. Glemina) e sul Carso.
- H. aurantiacum* L. — Alpi Carniche.
- H. fuscum* Vill. — Alpi Carniche.
- H. brevicaulis* Jord. — Alpi e Prealpi Carniche.
- H. sylvaticum* (L.) L. (G, M: *H. murorum* p.m.p.) — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
- H. bifidum* Kit. ex Hornem. — regione montana.
- H. pallescens* W. & K. (F, G: *H. incisum* p.p.) — Alpi Carniche e Giulie.
- H. lachenalii* C.C.Gmel. (F, G: *H. vulgatum*) — Alpi e Prealpi Carniche, Carso.
- H. schmidtii* Tausch — presente sec. Marchesetti nella dolina di Orlek con *H. lasiophyllum* Koch.
- H. villosum* Jacq. — regione montana.
- H. dasytrichum* Arv.-Touv. — Alpi Carniche occ.
- H. morisianum* Rchb. f. (F: *H. pilosum*) — Alpi Carniche.
- H. scorzonifolium* Vill. — Alpi Carniche.
- 100H. *valdepilosum* Vill. — Alpi Carniche.
- H. glabratum* Hoppe ex Willd. — regione montana.
- H. dentatum* Hoppe — regione montana.
- H. glanduliferum* Hoppe — Alpi Carniche.
- H. armerioides* Arv.-Touv. em. Zahn — Alpi Carniche (M. Clapsavon con *H. leucochlorum* Arv.-Touv.).
- H. alpinum* L. — Alpi Carniche.
- H. nigrescens* Willd. — Alpi Carniche (M. Clapsavon).
- H. bocconeii* Griseb. — Alpi Carniche (M. Avanza).
- H. atratum* Fries — Alpi Carniche.
- H. humile* Jacq. — Alpi Carniche (versante austriaco del M. Coglians e versante plavense del M. Duranno).
- H. amplexicaule* L. — Prealpi Carniche (Val Colvera cfr. *H. petraeum* Hoppe ex Bluff & Fingerh.).
- H. intybaceum* All. — regione montana.
- H. porrifolium* L. — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso.
- H. bupleuroides* C.C.Gmel. — regione montana.
- H. glaucum* All. (M: *H. politum*) — regione montana.
- H. oxyodon* Fries — Alpi Carniche.
- H. dollineri* C.H.Schultz ex F.W.Schultz — regione montana.
- H. calcareum* Bernh. ex Hornem. — regione montana, Carso; (rappresentato prevalentemente da *H. illyricum* Fries).
- H. heterogynum* (Froel.) Guterl. — Prealpi Giulie (M. Plauris).

- H. macrodon* N. & P. — Prealpi Giulie.
H. saxatile Jacq. (M: *H. saxetanum*) — Carso (M. Spaccato).
H. prenanthoides Vill. — Alpi Carniche.
H. cidonifolium Vill. — Alpi Carniche (con *H. parcepilosum* Arv.-Touv. a Collinetta).
H. epimedium Fries (G: *H. macilentum*) — Alpi Giulie (gruppo del Canin).
H. latifolium Spreng. — Goriziano, Carso.
H. racemosum W. & K. ex Willd. (G, M: *H. australe* p.p., *H. barbatum* p.p.) — regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
H. sabaudum L. (G, M: *H. boreale*) — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
H. umbellatum L. — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
H. laevigatum Willd. — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

MONOCOTYLEDONES (LILIATAE)

HELOBIAE

ALISMATACEAE

Alisma L.

- A. plantago* — *aquatica* L. — dal basso Friuli alla regione montana inf. (—1100 m), Goriziano, Carso, Istria.
A. lanceolatum With. — Goriziano (Doberdò, Pietrarossa).

Baldellia Parl.

- B. ranunculoides* (L.) Parl. (F: *Alisma ranunculoides*; M: *Echinodorus ranunculoides*) — basso Friuli, Triestino (foci del Timavo).

Sagittaria L.

- S. sagittifolia* L. — basso Friuli.

BUTOMACEAE

Butomus L.

- B. umbellatus* L. — basso Friuli, S. Giovanni di Duino.

HYDROCHARITACEAE

Elodea Michx.

- E. canadensis* Michx. — alto Friuli (Pordenone, Polcenigo), Goriziano, Carso, Istria.

Hydrocharis L.

- H. morsus* — *ranae* L. — basso Friuli.

SCHEUCHZERIAEAE

Scheuchzeria L.

- S. palustris* L. — Alpi Carniche occ., Goriziano (fra Castelletto e la Subida cfr. Cufodontis,

Gior. Bot. Ital., 1931).

JUNCAGINACEAE

Triglochin L.

- T. maritimum* L. — litorale friulano (da Caorle al Timavo).
T. palustre L. — dal mare alla regione montana (Pizzul, M. Pura, Col Quaternà).

POTAMOGETONACEAE

Potamogeton L.

- P. crispus* L. — Friuli, regione montana inf. (Cavazzo, Macile di Solimbergo); Goriziano, Carso, Istria.
P. coloratus Hornem. (G: *P. natans* subsp. *colorata*; M: *P. plantagineus*) — basso Friuli (Torre di Zuino, Castions), Istria.
P. nodosus Poir. (G: *P. natans* subsp. *fluitans*; M: *P. fluitans*) — basso Friuli, Istria.
P. natans L. (G: *P. natans* subsp. *typica*) — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
P. polygonifolius Pourr. (G: *P. natans* subsp. *polygonifolia*) — Goriziano (Madonna Marcellina).
P. perfoliatus L. — dal Friuli alla regione montana inf.
P. lucens L. — dal mare alla regione montana (lago di Mediana).
P. acutifolius Link — basso Friuli (Aquileia).
P. pectinatus L. (G: *P. pectinata* subsp. *typica*) — Friuli, regione montana inf. (Fagagna).
P. filiformis Pers. (G: *P. pectinata* subsp. *marina*; M: *P. marina*) — basso Friuli, Istria.
P. trichoides Cham. & Schlechtend. — Alpi Carniche occ. (Passo di M. Croce di Comelico).
P. pusillus L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano.

Groenlandia J. Gay

- G. densa* (L.) Fourr. — alto Friuli (Bueris, dintorni di Cividale), segnalazioni da accogliere con molta cautela.

RUPPIACEAE

Ruppia L.

- R. maritima* L. — basso Friuli, Goriziano (Pietrarossa, Doberdò), Istria.

ZOSTERACEAE

Posidonia König

- P. oceanica* (L.) Delile (M: *P. caulini*) — Istria.

Zostera L.

- Z. nana* Mert. ex Roth — Goriziano (Monfalcone, foci dell'Isonzo), Istria.
Z. marina L. — litorale friulano, Istria.

Cymodocea König

C. nodosa (Ucria) Asch. (M: *C. aequorea*) — Triestino, Istria.

ZANNICHELLIACEAE

Zannichellia L.

Z. palustris L.

subsp. *palustris* (M: *Z. palustris* var. *genuina*) — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria;

subsp. *pedicellata* (Wahlenb. & Rosen) Arc. (M: *Z. palustris* var. *pedicellata*) — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

NAJADACEAE

Najas L.

N. marina L. — basso Friuli.

LILIIFLORAE

LILIACEAE

Tofieldia Huds.

T. calyculata (L.) Wahlenb. — basso Friuli (risorgive), regione montana.

Veratrum L.

V. album L.

subsp. *album* — Alpi Carniche occ., da verificare;

subsp. *lobelianum* (Bernh.) Arc. — basso Friuli (risorgive), regione montana.

V. nigrum L. — regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Colchicum L.

C. autumnale L. — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

Asphodelus L.

A. albus Mill. (G: *A. ramosus* subsp. *albus*) — regione montana inf. (Joanaz, Pian Cavallo), Goriziano (Sabotino), Carso (Lanaro, Vremščica, Veliko Gradišče), Istria (Slavnik).

Asphodeline Rchb.

A. lutea (L.) Rchb. — coltivata.

Paradisea Mazz.

P. liliastrum (L.) Bertol. — regione montana.

Anthericum L.

A. liliago L. — vecchia segnalazione di Stur (1856) dal M. Talm, non confermata.

A. ramosum L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Hemerocallis L.

- H. fulva L. — coltivata, spesso spontaneizzata nella zona collinare e montana (Valli del Natisone).
H. lilio-asphodelus L. (G: *H. flava*) — basso Friuli (risorgive), regione montana inf.

Gagea Salisb.

- G. pratensis (Pers.) Dum. — vecchia segnalazione del Pirona da Fagagna, non più confermata.
G. lutea (L.) Ker. Gawl. — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
G. pusilla (F.W.Schmidt) Schult. e Schult.f. — Carso, Istria.
G. fistulosa (Ramond) Ker.-G. — Alpi Carniche.
G. villosa (MB.) Duby (G, M: *G. arvensis*) — Friuli, Goriziano, Carso, Istria.

Loydia Rchb.

- L. serotina (L.) Rchb. — Alpi Carniche (M. Zermula, Peralba).

Lilium L.

- L. martagon L. — dal basso Friuli (risorgive) alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
L. carnolicum Bernh. (G: *L. pomponium* subsp. *carniolicum*) — regione montana, Carso, Istria.
L. bulbiferum L.
 subsp. bulbiferum — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria;
 subsp. croceum (Chaix) Baker — Alpi Carniche occ. (Comelico superiore).

Fritillaria L.

- F. tenella Bieb. (M: *F. montana*) — Carso, Istria.

Tulipa L.

- T. sylvestris L. — segnalazione per il Friuli or. (Maiano in Riviera) risalente a Wolfert, non confermata recentemente.

Erythronium L.

- E. dens-canis L. — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Scilla L.

- S. autumnalis L. — Goriziano (Medea, Doberdò, Pietrarossa), Carso, Istria.
S. bifolia L. — alto Friuli, Goriziano, Carso, Istria.
S. hispanica Mill. — Istria (S.Nicolò, Pirano, Isola), coltivata, inselvatichita.
S. non-scripta (L.) Hoffm. & Link — coltivata in Friuli e talvolta inselvatichita.

Ornithogalum L.

- O. pyrenaicum L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
O. sphaerocarpum Kern. — Triestino, Istria (Strugnano), probabilmente altrove, mal noto.
O. pyramidale L. — Goriziano (Monfalcone), Carso (Lipica, Draga S.Elia), Istria.
O. refractum Kit. — litorale friulano or. (Grado), Goriziano (Pieris, Grado), Triestino, Istria.
O. comosum L. — litorale friulano or. (Grado), Carso, Istria.
O. gussonei Ten. (G: *O. comosum* subsp. *Kochii*, *tenuifolium* et *collinum*; M: *O.*

Kochii) — dal mare all'alto Friuli, Goriziano, Carso, Istria. Sec. Becherer in "Bauhinia 5/4:233(1976) *O. kochii* e *O. tenuifolium* sarebbero sinonimi di *O. gussonei*. Sec. Garbari & Tornadore in "Atti Soc. Tosc. Sc. Nat." S.B., 77:111(1971) *O. kochii* sarebbe un citotipo di *O. tenuifolium*, rispetto al quale sussistono alcuni caratteri differenziali.

O. umbellatum L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

O. divergens Bor. — Carso, Istria.

Hyacinthus L.

H. orientalis L. — coltivato.

Bellevalia Lapeyr.

B. romana (L.) Sweet — Goriziano (lago di Doberdò, Bivio Devetachi, foci della Piumizza, Medea, M. Quarin), Istria.

Muscari Mill.

M. neglectum Guss. — Istria.

M. racemosum (L.) Mill. — basso Friuli, Goriziano, Carso, Istria.

M. botryoides (L.) Mill. — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

M. kernerii Marchesetti — Triestino.

M. comosum (L.) Mill. — dal mare alla regione montana inf. (440 m Arta), Goriziano, Carso, Istria.

Allium L.

A. cepa L. — coltivato.

A. ascalonicum L. — coltivato.

A. vineale L. — dal mare alla regione montana inf. (410 m Formeaso), Goriziano, Carso, Istria.

A. sphaerocephalon L. — dal mare alla regione montana inf. (450 m, Clapus), Goriziano, Carso, Istria.

A. scorodoprasum L. — basso Friuli, Goriziano, Carso, Istria, avventizio.

A. sativum L. — coltivato.

A. rotundum L. — Carso, Istria.

A. porrum L. (G: *A. ampeloprasum* subsp. *porrum*) — coltivato.

A. ampeloprasum L. — litorale (Grado), basso Friuli (S. Giorgio), Goriziano (Grado, Farra), Carso, Istria.

A. schoenoprasum L.

subsp. *schoenoprasum* — coltivato;

subsp. *alpinum* (DC.) Celak (G: *A. schoenoprasum* var. *pumilum*) — regione montana (Cima Avostanis, M. Cavallino, La Pitturina, Passo M. Croce di Comelico).

A. oleraceum L. — basso Friuli, Goriziano, Carso, Istria.

A. tenuiflorum Ten. (M: *A. paniculatum*) — Triestino (Sistiana e Duino), Istria.

A. coppoleri Tin. (M: *A. pallens*) — Triestino (Zaule e S. Dorligo), Istria.

A. longispathum Red. (G: *A. oleraceum* var. *longispathum*) — basso Friuli (Castions), Goriziano (Gradisca), Triestino, Istria. Va accertata la distinzione degli esemplari regionali da *A. fuscum* W. & K.

A. paniculatum L. — regione montana inf.; da verificare in quanto va accertata la sua separazione da *A. tenuiflorum*.

- A. neapolitanum* Cyr. — Triestino (inselvaticito, ancora presente?).
- A. ursinum* L. — dal basso Friuli (Nogaro) alla regione montana inf., Goriziano, Carso (Škocjan, Slavnik).
- A. angulosum* L. (G: *A. angulosum* subsp. *acutangulum*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano (lago di Doberdò), Triestino (foci del Timavo), Istria.
- A. montanum* F.W.Schmidt (G: *A. angulosum* subsp. *montanum*; M: *A. fallax*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf. (— 600 m), Goriziano, Carso, Istria.
- A. suaveolens* Jacq. — basso Friuli, Goriziano (Monfalcone, Pietrarossa), Istria.
- A. ochroleucum* W. & K. (G: *A. suaveolens* subsp. *ochroleucum*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf. (850 m Forni di Sopra), Goriziano (Sabotino, foce dell'Isonzo), Carso, Istria.
- A. roseum* L. — Goriziano (Bistrigna, Monfalcone), Triestino, Istria.
- A. saxatile* Bieb.
subsp. *tergestinum* Gandog. (M: *A. saxatile*) — Carso, Istria.
- A. carinatum* L. (G: *A. carinatum* subsp. *typicum* et *violaceum*) — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
- A. pulchellum* G. Don (G: *A. carinatum* subsp. *pulchellum*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf. (—750 m), Goriziano, Carso, Istria.
- A. victoralis* L. — regione montana.

Asparagus L.

- A. tenuifolius* Lam. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- A. officinalis* L. — coltivato.
- A. maritimus* (L.) Mill. (G: *A. officinalis* subsp. *maritimus*) — litorale friulano, Istria.
- A. acutifolius* L. — regione montana inf. (Amariana, M. Glemina, Valle dello Judrio), Goriziano, Carso, Istria.

Ruscus L.

- R. aculeatus* L. — dal basso Friuli alla regione montana inf. (conca tolmezzina), Goriziano, Carso, Istria.
- R. hypoglossum* L. — Friuli or. (Valli del Natisone), Carso (fra Gabrovizza e S. Croce).

Maianthemum Web.

- M. bifolium* (L.) F.W.Schmidt — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

Polygonatum Mill.

- P. verticillatum* (L.) All. — regione montana.
- P. odoratum* (Mill.) Druce (G, M: *P. officinale*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- P. multiflorum* (L.) All. — dal basso Friuli (Muzzana, Strassoldo), alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

Streptopus Michx.

- S. amplexifolius* (L.) DC. — regione montana.

Convallaria L.

C. majalis L. — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

Paris L.

P. quadrifolia L. — dal basso Friuli (Nogaro) alla regione montana, Goriziano (Collio), Carso, Istria.

Smilax L.

S. aspera L. — Goriziano (Grado, Vallone), Triestino (costiera).

AGAVACEAE

Agave L.

A. americana L. — coltivata e talvolta inselvaticata.

AMARYLLIDACEAE

Sternbergia W. & K.

S. lutea (L.) Ker.-G. — Istria (Sezza presso Pirano).

Léucojum L.

L. vernum L. — dal basso Friuli alla regione montana.

L. aestivum L. — dal basso Friuli, Goriziano (Doberdò), Istria.

Galanthus L.

G. nivalis L. — dal basso Friuli (Nogaro) alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

Narcissus L.

N. pseudonarcissus L. — coltivato.

N. jonquilla L. — coltivato.

N. tazetta L. — Triestino (Cedas), altrove coltivato.

N. biflorus Curt. (G: *N. poëtico-tazetta*) — coltivato.

N. poëticus L. — è stato probabilmente confuso con la specie seguente. Non dovrebbe trovarsi che allo stato subspontaneo.

N. radiiflorus Salisb. (G: *N. poëticus* subsp. *radiiflorus*; M: *N. poëticus* var. *radiiflorus*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

DIOSCOREACEAE

Tamus L.

T. communis L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

IRIDACEAE

Iris L.

- I. *illyrica* Tommasini — Carso, Istria.
 I. *cengiali* Ambrosi (G: *I. pallida*) — regione montana inf.
 I. *florentina* L. — coltivata.
 I. *germanica* L. — coltivata.
 I. *pseudacorus* L. — dal mare all'alto Friuli, Goriziano, Carso, Istria.
 I. *sibirica* L. — dal mare (Aquileia, Molino di Sdobba) all'alto Friuli (Susans), Goriziano (Prevali), Triestino (foci del Timavo).
 I. *erirrhiza* Pospichal — Istria (M. Kojnik).
 I. *graminea* L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Crocus L.

- C. *weldenii* Hoppe (M: *C. biflorus*) — Goriziano (Vallone), Carso (Sales, Samatorza).
 C. *reticulatus* Stev. ex Adam (M: *C. variegatus*) — alto Friuli (a Ravis presso il Tagliamento), Goriziano, Carso, Istria.
 C. *albiflorus* Kit. ex Schult. (G, M: *C. vernus* var. *albiflorus*) — regione montana, Carso.
 C. *napolitanus* Mord. & Loisel. (G: *C. vernus* var. *neapolitanus*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso.

Gladiolus L.

- G. *palustris* Gaud. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Carso.
 G. *illyricus* Koch (G: *G. imbricatus* subsp. *illyricus*) — basso Friuli, Carso.
 G. *italicus* Mill. (G, M: *G. segetum*) — Friuli e regione montana inf.

JUNCALES JUNCACEAE

Juncus L.

- J. *subnodulosus* Schrank (G, M: *J. obtusiflorus*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., foci del Timavo, Triestino, Istria.
 J. *bulbosus* L. (G: *J. supinus*) — forse non più presente in regione. Indicato per le paludi di Castelletto da Pospichal e per Pramollo da Pirona.
 J. *alpino-articulatus* Chaix (G: *J. articulatus* subsp. *alpinus*) — regione montana.
 J. *acutiflorus* Ehrh. ex Hoffm. (G: *J. articulatus* subsp. *acutiflorus*) — regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
 J. *articulatus* L. (G: *J. articulatus* subsp. *lampocarpus*; M: *J. lampocarpus*) — dal mare alla regione montana (—1630 m), Goriziano, Carso, Istria.
 J. *tenageja* L.f. — basso Friuli.
 J. *bufonius* L. — dal basso Friuli alla regione montana (—1200 m), Goriziano, Triestino (foci del Timavo), Istria.
 J. *hybridus* Brot. (M: *J. insulans*) — Goriziano (Riva di Monfalcone), Triestino, Istria.
 J. *acutus* L. — litorale friulano, Goriziano (foci dell'Isonzo, Lisert), Istria.
 J. *littoralis* C.A. Meyer (G: *J. Tommasinii*; M: *J. acutus* var. *Tommasinii*) — litorale friulano, Istria.
 J. *maritimus* Lam. — litorale friulano, Goriziano (foci dell'Isonzo), Istria.
 J. *filiformis* L. — regione montana.

- J. inflexus* L. (G: *J. glaucus* subsp. *typicus* et *paniculatus*; M: *J. glaucus* et *J. paniculatus*) — dal mare alla regione montana (1000 m.), Goriziano, Carso, Istria.
- J. effusus* L. (G: *J. conglomeratus* subsp. *effusus*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- J. conglomeratus* L. (G: *J. conglomeratus* subsp. *typicus*) — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
- J. trifidus* L. (G: *J. trifidus* subsp. *typicus*) — regione montana.
- J. monanthos* Jacq. (G: *J. trifidus* subsp. *hostii*) — regione montana.
- J. jacquinii* L. — regione montana.
- J. triglumis* L. — regione montana.
- J. gerardii* Loisel. (G: *J. compressus* subsp. *gerardii*) — litorale friulano, Triestino (Zaule), Istria (Capodistria, Sicciole).
- J. compressus* Jacq. (G: *J. compressus* subsp. *typicus*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Luzula DC.

- L. luzulina* (Vill.) DT. & S. — regione montana.
- L. pilosa* (L.) Willd. (G: *L. pilosa* subsp. *typica*) — dal basso Friuli alla regione montana inf.
- L. forsteri* (Sm.) DC. (G: *L. pilosa* subsp. *forsteri*) — Goriziano (M. Quarin), Carso, Istria.
- L. nivea* (L.) DC. (G: *L. nivea* subsp. *typica*) — regione montana.
- L. luzuloides* (Lam.) Dandy & Wilm. (G: *L. nivea* subsp. *albida*; M: *L. albida*) — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
- L. sylvatica* (Huds.) Gaud.
subsp. *sylvatica* — regione montana;
subsp. *sieberi* (Tausch) K. Richter — Alpi Carniche.
- L. alpino-pilosa* (Chaix) Breistr. (G: *L. spadicea*)
subsp. *alpino-pilosa* — regione montana;
subsp. *candollei* (E. Mey.) Rothm. — Alpi Carniche occ. (M. Peralba, M. Croda Nera).
- L. campestris* (L.) DC. (G: *L. campestris* subsp. *typica*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Carso.
- L. spicata* (L.) DC. — regione montana.
- L. multiflora* (Ehrh. ex Retz.) Lej.
subsp. *multiflora* (G: *L. campestris* var. *multiflora*) — Friuli, regione montana, Carso;
subsp. *congesta* (Thuill.) Arc. — Alpi Carniche occ. (Valdisdende, Val del Padola).
- L. sudetica* (Willd.) Schult. (G: *L. campestris* subsp. *sudetica*) — regione montana.

COMMELINALES

COMMELINACEAE

Commelina L.

- C. virginica* L. — Goriziano, Triestino, coltivata e inselvatichita.
- C. communis* L. — alto Friuli (Pordenone, alla Burida) coltivata e inselvatichita.

GRAMINALES (POALES) POACEAE (GRAMINEAE)

Zea L.

Z. mays L. — coltivato.

Erianthus Michx.

E. ravennae (L.) Beauv. (G: *Saccharum ravennae*) — dal litorale friulano (da Lignano a Grado) all'alto Friuli (magredi di Cordenons e del Cellina).

Sorghum Moench

S. vulgare Pers.

subsp. *vulgare* (G: *S. vulgare* subsp. *typicus*) — coltivato;

subsp. *saccharatum* (L.) Mair. & Weill. — coltivato.

S. halepense (L.) Pers. — dal mare all'alto Friuli, Goriziano, Carso, Istria.

Chrysopogon Trin.

C. gryllus (L.) Trin. (M: *Andropogon gryllus*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Bothriochloa O. Kuntze

B. ischaemum (L.) Keng (G, M: *Andropogon Ischaemon*) — dal mare alla regione montana inf. (— 1300 m), Goriziano, Carso, Istria.

Digitaria Hall.

D. sanguinalis (L.) Scop.

subsp. *sanguinalis* (M: *Panicum sanguinale*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria;

subsp. *pectiniformis* Henrard (G: *D. sanguinalis* var. *ciliaris*) — Goriziano (Grado, Monfalcone).

Paspalum L.

P. paspaloides (Michx.) Scribn. — Istria (Osop).

Echinochloa PB.

E. crus-galli (L.) PB. (G, M: *Panicum Crus-Galli*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Panicum L.

P. miliaceum L. — coltivato, avventizio.

P. capillare L. — dal mare all'alto Friuli, avventizia ormai stabilmente insediata.

Setaria PB.

S. glauca (L.) PB. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

S. italica (L.) PB. — coltivata un tempo, inselvatichita qua e là.

S. verticillata (L.) PB. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

S. decipiens C. Schimp. (G: *S. verticillata* subsp. *ambigua*; M: *S. verticillata* var. *ambigua*) — alto Friuli (Udine), Triestino.

S. viridis (L.) PB. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Cenchrus L.

C. incertus M.A.Curt. — litorale friulano (foci del Tagliamento), avventizia.

Tragus Hall.

T. racemosus (L.) All. — litorale friulano or. (Grado), Goriziano (Monfalcone, Doberdò, Villaraspa), Carso, Istria.

Oplismenus PB.

O. undulatifolius (Ard.) PB. — dal basso all'alto Friuli.

Leersia Sw.

L. oryzoides (L.) Sw. (G: *Oryza oryzoides*) — litorale friulano or., alto Friuli, Goriziano (Doberdò).

Aristida L.

A. gracilis Elliot — Goriziano (Giasbena nel Collio), avventizia.

Hierochloë R. Br.

H. odorata (L.) Beauw. — Alpi Carniche occ. (M. Peralba), da verificare.

H. australis (Schr.) Roem. & Schult. — regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

Phalaris L.

P. coerulescens Desf. — Istria (Stramare).

P. paradoxa L. — Triestino (Campo marzio, Punta Grossa).

P. canariensis L. — dal mare all'alto Friuli, Goriziano, Carso, Istria, avventizia.

P. brachystachys Lk. — indicata da Marchesetti per Trieste dove non viene indicata *Phalaris canariensis*, ma forse confusa con questa.

P. arudinacea L. — dal mare all'alto Friuli, Goriziano, Triestino, Istria.

Anthoxanthum L.

A. odoratum L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

A. alpinum A. & D. Löve — regione montana.

Stipa L.

S. bromoides (L.) Dörf. (M: *S. aristella*) — Triestino (costiera), Istria (Osopo).

S. joannis Celak — Triestino (M. Spaccato), cfr. Martinovsky in Webbia 20(2):711, 1965.

S. eriocalis Borb.

subsp. *austriaca* (Beck) Martin (G, M: *S. pinnata*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Achnatherum PB.

A. calamagrostis (L.) Beauv. (G: *Stipa Calamagrostis*; M: *Lasiagrostis Calamagrostis*) — regione montana, Goriziano, Carso (Val Rosandra).

Oryzopsis Mchx.

O. virescens (Trin.) Beck (M: *Piptatherum paradoxum*) — Goriziano, Triestino, Istria.

O. miliacea (L.) Asch. & Schweinf. (M: *Piptatherum multiflorum*) — Triestino (costiera), Istria.

Milium L.

M. effusum L. — regione montana, Istria.

Crypsis Ait.

C. aculeata (L.) Ait. — litorale friulano, Istria (Strugnano).

Heleochoa Host ex Roem.

H. alopecuroides (Pill. & Mitt.) Host ex Roem. (G: *Crypsis alopecuroides*) — basso Friuli (Nogaro), Goriziano (Doberdò).

H. schoenoides Host ex Roem. (M: *Crypsis schoenoides*) — Istria (Capodistria).

Alopecurus L.

A. myosuroides Huds. (G, M: *A. agrestis*) — dal mare all'alto Friuli, Goriziano, Carso, Istria.

A. pratensis L. — dal mare all'alto Friuli, Goriziano, Carso, Istria.

A. geniculatus L. — basso Friuli, Istria.

A. aequalis Sebel. (G: *A. geniculatus* var. *fulvus*; M: *A. fulvus*) — Alpi Carniche (Laghi di Morgenleit e Pezzocucco), Istria (Val di Sicciole), ma confuso probabilmente con il precedente.

A. utriculatus (L.) Soland. — avventizia nel Triestino.

Phleum L.

P. arenarium L. — litorale friulano.

P. subulatum (Savi) Asch. & Gr. (G, M: *Ph. tenue*) — litorale friulano, Triestino, Isola.

P. paniculatum Huds. (G: *Ph. asperum*) — Goriziano (Collio).

P. hirsutum Honch. (G: *Ph. Micheli*) — regione montana.

P. phleoides (L.) Karsten (G: *Ph. boehmeri*) — Goriziano, Friuli or. (Valle dello Judrio).

P. pratense L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

P. bertolonii DC. (M: *Ph. pratense* var. *nodosum*) — mal differenziato rispetto al precedente e pertanto di distribuzione poco conosciuta. Esemplari raccolti nella regione montana inferiore (Val Degano) e nel Triestino, sembrerebbero rientrare in questa entità.

P. alpinum L. — regione montana.

Agrostis L.

A. schraderana Becherer (M: *Calamagrostis tenella*) — regione montana, Carso (Škocjan), Istria (Padež).

A. canina L. — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

A. rupestris All. — regione montana.

A. alpina Scóp. — regione montana.

A. tenuis Sibth. (G, M: *A. vulgaris*) — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

A. castellana Boiss. & Reut. (G: *A. alba* subsp. *olivetorum*; M: *A. olivetorum*) — Goriziano (Collio, Medea), Triestino, Istria.

A. gigantea Roth (G: *A. alba* subsp. *typica* p.p.; M: *A. alba* p.p. excl. var. *maritima*) — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

A. stolonifera L.

subsp. *stolonifera* (G, M: *A. alba* p.p.) — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria;

subsp. *maritima* (Lam.) G.F.W.Mey. (G: *A. alba* subsp. *maritima*; M: *A. alba* var. *maritima*) — litorale friulano, Istria.

Apera Adans.

A. spica-venti (L.) Beauv. (G: *Agrostis spica-venti*) — Friuli, regione montana.

Gastridium PB.

G. ventricosum (Gouan) Schinz. & Thell. (G: *G. lendigerum*) — litorale friulano or. (Grado). Goriziano (Ronchi), Monfalcone.

Polypogon Desf.

P. monspeliensis (L.) Desf. — dal mare alla regione montana inf. (Tolmezzo), Triestino (alle Noghere).

P. viridis (Gouan) Breistr. (G: *Agrostis alba* subsp. *verticillata*) — litorale friulano or. (Grado. Monfalcone).

A. littoralis (Sm.) C E. Hubb × *Agropogon* P. Fourn (G: *P. monspelliensis* × *Agrostis verticillata*) — litorale friulano or. (Grado e Primiero).

Calamagrostis Adans.

C. pseudophragmites (Hall.f.) Koel. (G: *C. litorea*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

C. canescens (Web.) Roth emend. Druce (G: *C. lanceolata*) — litorale friulano or. (Molino di Sdobba. Canal d'Anfora), Goriziano (S. Canzian d'Isonzo).

C. villosa (Chaix) J.F.Gmel. (G: *C. Halleriana*) — regione montana.

C. epigejos (L.) Roth — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

C. arundinacea (L.) Roth (G: *C. arundinacea* subsp. *typica*) — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

C. varia (Schräd.) Host (G: *C. arundinacea* subsp. *montana* et *varia*; M: *C. montana*) — regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

Ammophila Host

A. littoralis (PB.) Rothm. (G: *Psamma arenaria*) — litorale friulano (dalla foce del Tagliamento a Monfalcone).

Sporolobus R. Br.

S. vaginiflorus (Torr.) Wood. — Goriziano (Doberdò, lago di Pietrarossa, Jamiano), Carso (Aurisina), avventizia in espansione.

Eragrostis Wolf

E. megastachya (Koel.) Lk. (G: *E. poaeoides* subsp. *megastachya*) — basso Friuli, Triestino (Duino).

E. minor Host (G: *E. poaeoides* subsp. *typica*; M: *E. poeoides*) — dal mare all'alto Friuli, Goriziano, Carso, Istria.

E. pilosa (L.) Beauv. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Cleistogenes Keng

C. serotina (L.) Keng (G, M: *Diplachne serotina*) — regione montana inf. (S. Pietro in Zuglio, conca tolmezzina, falde merid. del Cavallo di Aviano, Valle dello Judrio presso Cras), Goriziano (Carso, Istria).

Eleusine Gaertn.

E. indica (L.) Gaertn. (G: *E. indica* subsp. *coracana*) — basso Friuli, Goriziano, Triestino, Istria.

Cynodon Rich.

C. dactylon (L.) Pers. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Spartina Schreb.

S. juncea (Michx.) Willd. — Goriziano (foci dell'Isonzo).

S. maritima (Curt.) Fernald (G, M: *S. stricta*) — litorale friulano, Istria.

Arundo L.

A. donax L. — basso Friuli, Triestino, Istria.

A. pliniana Turra — Triestino (Sistiana), Istria.

Phragmites Adans.

P. australis (Cav.) Trin. & Steud. (G, M: *Ph. communis*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Holcus L.

H. lanatus L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

H. mollis L. — Triestino, Istria, probabilmente estintosi nel Triestino per distruzione dei biotopi.

Deschampsia PB.

D. caespitosa (L.) Beauv. — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano (lago di Pietrarossa, Locavez, Doberdò), Carso (Percedol), Istria.

Avenella Parl.

A. flexuosa (L.) Parl. (G, M: *Deschampsia flexuosa*) — regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

Trisetum Pers.

T. argenteum (Willd.) Roem. & Schult. — regione montana.

T. flavescens (L.) Beauv. (G: *T. flavescens* subsp. *typicum* et *purpurascens*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

T. alpestre (Host) Beauv. — regione montana.

Avena L.

A. barbata Pott. ex Lk. — Triestino, Istria.

A. fatua L. — regione montana inf. (Tolmezzo), Goriziano, Carso, Istria.

A. sterilis L. — Triestino, Istria.

A. strigosa Schreb. (G: *A. sativa* subsp. *strigosa*) — coltivata in Friuli.

A. sativa L. (G: *A. sativa* subsp. *typica*) — coltivata.

Avenula (Dum.) Dum.

A. pubescens (Huds.) Dum. (G: *Avena pubescens* subsp. *typica*; M: *Avena pubescens*)
— dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

A. versicolor (Vill.) Lainz (G: *Avena versicolor*) — Alpi Carniche.

A. praeusta (Rchb.) Holub (G, M: *Avena pratensis*) — regione montana, Carso (Škocjan).

Arrhenatherum PB.

A. elatius (L.) J. & K. Presl (M: *Arrhenatherum avenaceum*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Gaudinia PB.

G. fragilis (L.) Beauv. — Triestino (foci del Timavo).

Lophochloa Rchb.

L. cristata (L.) Hyl. (G, M: *Koeleria phleoides*) — litorale friulano or. (Grado, Monfalcone), Istria.

Koeleria Pers.

K. eriostachya Panč (G: *K. cristata* subsp. *canescens*) — regione montana.

K. pyramidata auct. (G: *K. cristata* subsp. *typica*; M: *K. cristata* p.p.) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

K. macrantha (Ledeb.) Spreng. (G: *K. cristata* subsp. *glauca*; M: *K. cristata* p.p.) — regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

K. splendens K. Presl (G: *K. cristata* subsp. *splendens*; M: *K. cristata* var. *crassipes*) — alto Friuli, Goriziano, Carso, Istria.

K. hirsuta Gaudin — Alpi Carniche (Valle dell'Oregone, Fleons, Pramasio).

Aira L.

A. elegans Willd. ex Gaudin (G, M: *A. capillaris*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Danthonia DC.

D. alpina Vest (G, M: *D. provincialis*) — regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

D. decumbens (L.) DC. (G, M: *Triodia decumbens*) — regione montana, Goriziano, Carso.

Sesleria Scop.

S. sphaerocephala Ard. — regione montana, Goriziano (forre dell'Isonzo).

S. autumnalis (Scop.) F.W.Schultz (G: *S. caerulea* subsp. *argentea* var. *elongata*; M: *S. elongata*) — Friuli or. (Valle dello Judrio), Goriziano, Carso, Istria.

- S. varia* Jacq. (F: *S. albicans*; G: *S. caerulea* subsp. *typica*) — dall'alto Friuli (magredi) alla regione montana, Goriziano (Sabotino, Sagrado lungo l'Isonzo), Carso (Valle della Rasa).
S. uliginosa Opiz (F: *S. caerulea*; G: *S. caerulea* subsp. *typica* var. *uliginosa*) — basso Friuli (risorgive).
S. tenuifolia Schrad. (M: *S. tenuifolia* var. *juncifolia*) — Carso, Istria.
S. kalnikensis Jav. (F: *S. tenuifolia* subsp. *kalnikensis*; M: *S. tenuifolia* var. *interrupta*) — Carso (Škocjan, Orlek).
S. sadlerana Janka — regione montana, da accertare presenza e distribuzione.

Oreochloa Lk.

- O. disticha* (Wulf.) Lk. (G: *Sesleria disticha*) — Alpi Carniche.

Melica L.

- M. ciliata* L. (G: *M. ciliata* subsp. *typica*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
M. magnolii Godr. & Gren. (G: *M. ciliata* subsp. *magnolii*) — Goriziano (nel Vallone fra Devetachi e Palchisce), indicata da Minio per le Valli del Natisone, da controllare.
M. uniflora Retz — alto Friuli (Polcenigo, Buttrio, Valli del Natisone), Goriziano (lago di Pietrarossa).
M. nutans L. — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
M. picta K. Koch — Carso (Sidavnik presso Sežana).

Molinia Schrank

- M. caerulea* (L.) Moench — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
M. arundinacea (L.) Schrank (G: *M. caerulea* var. *arundinacea*; M: *M. caerulea* var. *litoralis*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Catapodium Lk.

- C. marinum* (L.) C.E.Hubb. — Istria (Strugnano).
C. rigidum (L.) C.E.Hubb. (G: *Sclerochloa rigida* subsp. *typica*; M: *Sclerochloa rigida*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Scleropoa Griseb.

- S. hemipoa* (Del.) Parl. (G: *Sclerochloa rigida* subsp. *hemipoa*) — litorale friulano (Lignano, Isola di St. Andrea), da controllare.

Sclerochloa PB.

- S. dura* (L.) Beauv. — Goriziano (Monfalcone), Triestino, Istria (Capodistria).

Cynosurus L.

- C. cristatus* L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Istria.
C. echinatus L. — Triestino (costiera), Goriziano (Doberdò, Monfalcone), Istria.

Dactylis L.

- D. *glomerata* L.
 subsp. *glomerata* (G: *D. glomerata* subsp. *typica*) — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria;
 subsp. *hispanica* (Roth) Nyman (M: *D. glomerata* var. *hispanica*) — litorale friulano, Triestino, Istria.
 D. *polygama* Horvátovszky — non sicuramente accertata.

Poa L.

- P. *compressa* L. — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
 P. *hybrida* Gaud. (G: *P. chaixii* subsp. *hybrida*) — Alpi Carniche (Val del Padola, Carnia).
 P. *chaixii* Vill. — Alpi Giulie: da verificare.
 P. *remota* Forselles — Alpi Carniche (Malga Tuglia), da verificare.
 P. *cenisia* All. — Alpi Carniche occ. (Passo M. Croce Comelico) vecchia segnalazione di Venzo, mai più confermata.
 P. *bulbosa* L. (G: *P. bulbosa* subsp. *typica*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
 P. *concinna* Gaud. (G: *P. bulbosa* subsp. *concinna*) — regione montana inf. (Cavazzo, Tolmezzo), Goriziano.
 P. *sylicola* Guss. — dal basso Friuli alla regione montana inf. (— 1200 m), Goriziano, Triestino, Istria.
 P. *pratensis* L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
 P. *angustifolia* L. — alto Friuli (magredi), Goriziano, Carso (Škocjan).
 P. *glauca* Vahl — regione montana (Val dell'Oregone, Jôf Fuart), Carso (Vremščica).
 P. *annua* L. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
 P. *supina* Schrad. — regione montana.
 P. *pumila* Host (G: *P. alpina* subsp. *pumila*) — Prealpi Clautane (M. Cavallo di Aviano), da verificare.
 P. *alpina* L. — regione montana.
 P. *badensis* Haenke ex Willd. (G: *P. alpina* subsp. *badensis*) — Alpi Carniche, Carso (Slavnik).
 P. *laxa* Haenke — regione montana.
 P. *minor* Gaud. — regione montana.
 P. *violacea* Bell. — regione montana.
 P. *nemoralis* L. — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
 P. *trivialis* L. — regione montana.
 P. *palustris* L. — Goriziano (Merna, Brazzacco).

Briza L.

- B. *maxima* L. — Istria (Oltre, Pirano).
 B. *media* L. — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

Glyceria R. Br.

- G. *maxima* (Hartm.) Holmberg (G: *G. aquatica*) — basso Friuli.
 G. *fluitans* (L.) R. Br. — Triestino, Istria.
 G. *plicata* (Fries) Fries (G: *G. fluitans* subsp. *plicata*) — dal basso Friuli alla regione montana (-600 m).

Puccinellia Parl.

- P. distans* (L.) Parl. (G: *Glyceria distans* subsp. *typica*) — litorale friulano or. (Grado), Istria.
P. fasciculata (Torr.) Bickn. — litorale friulano (Punta Alberoni).
P. palustris (Secn.) Hayek (G: *Glyceria distans* subsp. *festucaeformis*) — Istria (Strugnano).

Festuca L.

- F. pratensis* Huds. (G: *F. elatior* subsp. *pratensis*; M: *F. elatior*) — dal basso Friuli alla regione montana inf. (—1000 m.), Goriziano, Carso, Istria.
F. arundinacea Schreb. (G: *F. elatior* subsp. *arundinacea*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Carso.
F. gigantea (L.) Vill. — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
F. altissima All. — regione montana.
F. paniculata (L.) Schinz & Thell. (G: *F. spadicea*) — regione montana, Carso (Vremščica).
F. laxa Host — regione montana.
F. pumila Chaix (G: *F. pumila* subsp. *typica*) — regione montana.
F. calva (Hackel) K. Richter (G: *F. pumila* subsp. *varia* Gortani non Haenke) — Alpi e Prealpi Giulie.
F. alpestris Roem. & Schult — Prealpi Clautane.
F. spectabilis Jan ex Bertol.
 subsp. *spectabilis* — Prealpi Carniche (dalla Valle del Piave a Forcella di M. Rest);
 subsp. *carniolica* (Hackel) Hayek (M: *F. spectabilis*) — Carso (Val Rosandra, M. Cocusso).
F. rubra L. (G: *F. rubra* subsp. *typica* p.p.) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
F. trichophylla (Gaudin) K. Richter — Alpi Carniche (Dolomiti Pesarine), indicazione di Zenari, da verificare. E' stata raccolta ai confini orientali della Regione (Panovec).
F. nigrescens Lam. (G: *F. rubra* subsp. *typica* p.p.) — regione montana.
F. heterophylla Lam. (G: *F. rubra* subsp. *heterophylla*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
F. nitida Kit. in Schult. (G: *F. rubra* subsp. *violacea*) — regione montana.
F. norica (Hackel) K. Richter (G: *F. rubra* subsp. *typica* p.p.) — regione montana.
F. stenantha (Hackel) K. Richter (G: *F. ovina* subsp. *halleri* Gortani non All. et subsp. *dura* Gortani non Host) — regione montana.
F. pseudodura Steud. — Alpi Carniche or. (M. Cavallino; Col Quaternà).
F. rupicaprina (Hack.) Kern. — Alpi Carniche occ. (Col Quaternà, Val Visdende).
F. alpina Suter (G: *F. ovina* subsp. *alpina*) — regione montana.
F. valesiaca Schleich. (G: *F. ovina* subsp. *valesiaca*; M: *F. ovina* var. *valesiaca*) — alto Friuli, Goriziano, Carso, Istria.
F. rupicola Heuff. (G: *F. ovina* subsp. *typica* p.p. et *duriuscula* p.p.; M: *F. ovina* var. *sulcata*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
F. pseudovina Hackel (M: *F. ovina* var. *pseudovina*) — verificare la sua effettiva presenza

ai confini orientali della regione.

F. tenuifolia Sibth. (G: *F. ovina* subsp. *typica* p.p.) — regione montana, Goriziano, Carso.

Vulpia C.C.Gmel.

V. ciliata Dum. — basso Friuli, Triestino, Istria.

V. myuros (L.) C.C.Gmel. (G: *V. myuros* subsp. *typica*) — basso Friuli, Triestino, Istria.

V. bromoides (L.) S.F.Gray (G: *V. uniglumis* et *V. myuros* subsp. *sciuroides*; M: *V. uniglumis*) — litorale friulano, Istria.

Bromus L.

B. inermis Leys. — probabilmente avventizio nel Triestino, segnalato dalle Alpi Carniche occ., da verificare.

B. condensatus Hackel (G, M: *B. erectus* p.p.) — dall'alto Friuli (magredi) alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

B. erectus Huds. — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

B. pannonicus Kumm. & Sendt. (G, M: *B. erectus* p.p.) — da verificare.

B. transylvanicus Steud. sensu Hackel (G, M: *B. erectus* p.p.) — da verificare.

B. benekenii (Lange) Trimen (G: *B. asper* subsp. *typicus*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf.

B. ramosus Huds. (G: *B. asper* subsp. *serotinus*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

B. tectorum L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso.

B. sterilis L. (G: *B. sterilis* subsp. *typicus*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

B. rigidus Roth (G: *B. rubens* subsp. *maximus*; M: *B. maximus*) — Goriziano, Triestino.

B. madritensis L. (G: *B. sterilis* subsp. *madritensis*) — dal basso Friuli alla regione montana inf. (Gemona), Goriziano, Triestino, Istria.

B. secalinus L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

B. arvensis L. — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Triestino, Istria.

B. racemosus L. (G: *B. mollis* subsp. *racemosus*) — regione montana inf. (conca di Tolmezzo).

B. hordeaceus L. (G: *B. mollis* subsp. *typicus*; M: *B. mollis*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

B. commutatus Schrad. (G: *B. mollis* subsp. *commutatus*) — dal basso Friuli alla regione montana inf.

B. brachystachys Hornung — Goriziano (Subida, Ruttars), Carso, Istria.

B. japonicus Thunb. & Murray — litorale friulano or. (Centenara).

B. squarrosus L. — Goriziano, Carso, Istria.

B. intermedius Guss. — Carso (Sežana).

B. molliformis Lloyd — ai confini meridionali del territorio.

B. willdenowii Kunth — basso Friuli (Palmanova).

B. scoparius L. — antiche segnalazioni dal Triestino, non più confermate.

Brachypodium PB.

- B. distachyon (L.) PB. — Triestino, Istria (Strugnano).
- B. phoenicoides (L.) Roem. & Schult. — Triestino, Istria (Strugnano).
- B. sylvaticum (L.) PB. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- B. pinnatum (L.) PB. — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
- B. rupestre (Host) Roem. & Schult. — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

Lolium L.

- L. temulentum L. — dal basso Friuli alla regione montana inf. (-1000 m), Goriziano, Carso, Istria.
- L. multiflorum Lam.
 - subsp. multiflorum (G: *L. multiflorum* subsp. *typicum*) — dal basso Friuli alla regione montana inf. (-950 m), Goriziano, Carso, Istria;
 - subsp. gaudinii (Parl.) Schinz & Kell. — Friuli orientale, Goriziano.
- L. perenne L. (G: *L. perenne* subsp. *typicum*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- L. rigidum Gaud. (M: *L. strictum*) — littorale friulano or. (Grado), Istria.

Nardus L.

- N. stricta L. — regione montana, Carso (Vremščica).

Hainardia Greut.

- H. cylindrica (Willd.) Greut. (G, M: *Lepturus cylindricus*) — littorale friulano or. (Grado), Istria.

Psilurus Trin.

- P. incurvus (Gouan) Schinz & Thell. (M: *P. nardooides*) — Triestino (costiera), Istria.

Parapholis C.E.Hubb.

- P. incurva (L.) C.E.Hubb. (G, M: *Lepturus incurvatus*) — littorale friulano or., Istria.
- P. strigosa (Dum.) C.E.Hubb. (G, M: *Lepturus filiformis*) — littorale friulano or., Istria.

Agropyron Gaertn.

- A. caninum (L.) PB.
 - subsp. caninum (G: *A. caninum* subsp. *typicum*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf.;
 - subsp. biflorum (Brign.) Arc. — regione montana.
- A. repens (L.) PB. (G: *A. repens* subsp. *typicum*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- A. trichophorum (Lk.) K. Richter — Carso, Istria.
- A. intermedium (L.) PB. (G: *A. repens* subsp. *glaucum*; M: *A. glaucum*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- A. pungens (Pers.) Roem. & Schult. (G: *A. repens* subsp. *litorale et pungens*) — dal mare alla regione montana inf. (Caneva di Tolmezzo), Goriziano (Collio), Carso, Istria.
- A. junceum (L.) PB.

subsp. *mediterraneum* Sim. (G: *A. junceum*) — littorale friulano.
A. elongatum (Host) PB. — littorale friulano, Istria.

Dasypyrum (Coss. & Durieu) T. Durand

D. villosum (L.) Borb. (M: *Triticum villosum*) — Triestino, Istria.

Secale L.

S. cereale L. — coltivato.

Triticum L.

T. monococcum L. — coltivato.

T. aestivum L. (G: *T. aestivum* subsp. *typicum* et *hybernum*) — coltivato.

T. turgidum L. (G: *T. aestivum* subsp. *turgidum*) — coltivato.

Aegilops L.

A. triuncialis L. — Triestino, Istria.

A. geniculata Roth (G, M: *Ae. ovata*) — Goriziano, Triestino (costiera), Istria.

A. neglecta Req. ex Bertol. (G: *Ae. ovata* subsp. *triaristata*; M: *Ae. triaristata*) —
Goriziano, Triestino, Istria.

A. cylindrica Host — Goriziano, Carso, Istria.

Hordeum L.

H. murinum L. — dall'alto Friuli (Udine) alla regione montana inf. (Stazione Carnia, Tolmezzo), Goriziano, Carso, Istria.

H. leporinum Lk. — Istria (Strugnano).

H. secalinum Schreb. — Goriziano (Monfalcone), Istria.

H. marinum Huds. (G: *H. maritimum*) — littorale friulano or., Istria (Sicciolo, Capodistria, Muggia), le località di Villaraspa e di Monfalcone risalgono al Brumati e pertanto non esistono forse più.

H. distichon L. (G: *H. vulgare* subsp. *distichum*) — coltivato.

H. vulgare L. (G: *H. vulgare* subsp. *typicum*) — coltivato.

H. hexastichon L. (G: *H. vulgare* subsp. *hexastichum*) — coltivato.

PALMALES

PALMAE

Phoenix L.

P. dactylifera L. — coltivata.

Chamaerops L.

C. humilis L. — coltivata.

Trachycarpus Wendl. f.

T. fortunei (Hook.) Wendl. f. — coltivata.

SPATHIFLORAE

ARACEAE

Arum L.

A. maculatum L. s.str. — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

A. italicum Mill. — dal basso Friuli alla regione montana inf. (conca tolmezzina, Buttrio, Valli del Natisone), Goriziano, Carso, Istria.

Dracunculus Mill.

D. vulgaris Schott — basso Friuli, forse scomparsa a causa delle bonifiche.

LEMNACEAE

Spirodela Schleiden

S. polyrrhiza (L.) Schleid. (G: *Lemna polyrrhiza*) — basso Friuli.

Lemna L.

L. trisulca L. — basso Friuli, Goriziano (Pietrarossa), Triestino (S. Giovanni di Duino).

L. minor L. — basso Friuli, Triestino (S. Giovanni di Duino), Carso.

L. gibba L. — Carso.

TYPHALES (PANDANALES)

SPARGANIACEAE

Sparganium L.

S. erectum L.

subsp. *erectum* (G: *S. erectum* subsp. *typicum*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria, da verificarne la presenza, perchè forse confuso con la sottospecie seguente;

subsp. *neglectum* (Beeby) Schinz & Thell. — basso Friuli, Istria (Rio Ospo, alle Noghere).

S. emersum Roehm. (G: *S. simplex*) — dal basso Friuli (Pradizziolo) alla regione montana (Morgenleit), Goriziano (Pietrarossa, Selz).

S. minimum Wallr. (G: *S. natans* subsp. *minimum*) — regione montana.

TYPHACEAE

Typha L.

T. latifolia L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

T. minima Hoppe — basso Friuli.

T. laxmannii Lepech. (G: *T. stenophylla*) — basso Friuli (fra Pocenia e il mulino Trasaro).

T. angustifolia L. — basso Friuli, Triestino (foci del Timavo), Istria.

CYPERALES

CYPERACEAE

Cyperus L.

- C. serotinus* Rottb. (M: *C. Montz*) — basso Friuli, Goriziano, Triestino (foci del Timavo).
C. flavescens L. — dal basso Friuli alla regione montana inf. (Tolmezzo), Goriziano, Triestino, Istria.
C. longus L. — Friuli, Goriziano, Triestino (foci del Timavo), Istria.
C. kalli (Forsk.) Murb. (G: *C. aegyptiacus*) — litorale friulano.
C. glomeratus L. — basso Friuli, Goriziano.
C. fuscus L. — Friuli, Goriziano, Triestino (foci del Timavo), Istria.

Eriophorum L.

- E. vaginatum* L. — Alpi Carniche.
E. scheuchzeri Hoppe — Alpi Carniche.
E. angustifolium Honck. (G: *E. polystachyum* subsp. *angustifolium*) — regione montana.
E. latifolium Hoppe (G: *E. polystachyum* subsp. *latifolium*) — dal basso Friuli alla regione montana (Forcella Lama).

Trichophorum Pers.

- T. alpinum* (L.) Pers. (G: *Eriophorum alpinum*) — regione montana.
T. caespitosum (L.) Hartm. (G: *Scirpus caespitosus*) — Alpi Carniche (Forcella Dignas, laghetto di Bordaglia).

Eleocharis R. Br.

- E. uniglumis* (Lk.) Schult. (G: *E. palustris* subsp. *uniglumis*) — Friuli or. (Fagagna, Dignano), Goriziano (Monfalcone, Pietrarossa).
E. palustris (L.) Roem. & Schult. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
E. mamillata Lindb. f. — Goriziano (Fogliano, Doberdò).
E. multicaulis (Sm.) Sm. (G: *E. palustris* subsp. *multicaulis*) — Goriziano (paludi di Castelletto), probabilmente estinta.
E. quinqueflora (F. X. Hartm.) O. Schwarz (G: *Scirpus pauciflorus*) — dal basso Friuli alla regione montana.
E. parvula (Roem. & Schult.) Lk. ex Bluff & All. (G: *Scirpus parvulus*) — Triestino (foci del Timavo).
E. carniolica Koch — Goriziano (Monfalcone, M. Quarin e Prevali).

Isolepis R. Br.

- I. fluitans* (L.) R. Br. (G: *Scirpus fluitans*) — Goriziano (Monfalcone e Castelletto).

Holoschoenus Lk.

- H. romanus* (L.) Fritsch (G, M: *Scirpus holoschoenus*)
subsp. *romanus* — litorale friulano;
subsp. *holoschoenus* (L.) Greut. — dal basso Friuli alla regione montana inf. (Enemonzo);
subsp. *australis* (L.) Greut. — regione montana inf. (Cavazzo e Caneva).

Schoenoplectus (Rchb.) Palla

- S. litoralis (Schrad.) Palla (G: *Scirpus litoralis*) — Triestino (foci del Timavo), antica segnalazione del Brumati da confermare.
S. mucronatus (L.) Palla (M: *Scirpus mucronatus*) — litorale friulano or. (Grado), Triestino, Istria.
S. triqueter (L.) Palla (G: *Scirpus triquetrus*; M: *Scirpus triqueter*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Triestino, Istria.
S. americanus (Pers.) Volkart (G: *Scirpus pungens*) — litorale friulano (foce del Tagliamento, Pineda sinistra).
S. lacustris (L.) Palla (G, M: *Scirpus lacustris*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Istria.
S. tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla (M: *Scirpus lacustris* var. *tabernaemontani*) Goriziano (foce dell'Isonzo), Carso (M. Coisce).

Bolboschoenus Palla

- B. maritimus (L.) Palla (G, M: *Scirpus maritimus*) — dal litorale e basso Friuli alla regione montana inf. (Socchieve), Triestino.

Scirpus L.

- S. sylvaticus L. — dal basso Friuli (Nogaro, Pradizziolo) alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria (Klanec, Presnica).

Blysmus Panz. ex Schult.

- B. compressus (L.) Panz. ex Lk. (G: *Scirpus Caricis*) — regione montana.

Fimbristylis Vahl

- F. dichotoma (L.) Vahl — basso Friuli, Goriziano.
F. annua (All.) Roem. & Schult. — basso Friuli, Goriziano.

Schoenus L.

- S. ferrugineus L. — regione montana inf. (Cavazzo, forra del T. Glagnò, lungo la mulattiera Campiolo-Stavoli).
S. nigricans L. — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Triestino, Istria.

Cladium P. Br.

- C. mariscus (L.) Pohl — dal mare alla regione montana inf., Triestino (foci del Timavo), Istria.

Rhynchospora Vahl

- R. alba (L.) Vahl — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano (M. Quarin).
R. fusca (L.) Ait. f. — litorale friulano (paludi sotto Madonna Marcellina).

Elyna Schrad.

- E. myosuroides (Vill.) Fritsch (G: *Kobresia myosuroides*) — regione montana.

Carex L.

- C. dioica L. — Goriziano (paludi di Castelletto), probabilmente estinta.

- C. davalliana* Sm. — dal basso Friuli alla regione montana, Triestino (foci del Timavo), Goriziano, Carso.
- C. microglochin* Wahlenb. — Alpi Carniche occ. (M. Peralba, Passo M. Croce Comelico).
- C. pauciflora* Lightf. — Alpi Carniche occ. (Forcella Lavardet, Col Quaternà).
- C. stenophylla* Wahlenb. — Triestino (Gretta).
- C. curvula* All. — Alpi Carniche (Pic Chiadin, Bivera, Avostanis, M. Cavallo di Pontebba, La Pitturina, Col Quaternà).
- C. otrubae* Podp. (G, M: *C. vulpina*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria. Sembra sostituire *C. vulpina*.
- C. spicata* Huds. — distribuzione mal nota, probabilmente da riferirsi alla seguente.
- C. pairae* F.W.Schultz (G, M: *C. muricata*) — dal mare alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- C. polyphylla* Kar. & Kir. — Triestino (M. Radio), Istria (Prebenicco), da controllare.
- C. divulsa* Stokes (G: *C. muricata* subsp. *divulsa*) — alto Friuli (Fagagna, Caporiacco, Colle di Cavasso).
- C. divisa* Huds. — basso Friuli, Triestino, Istria.
- C. disticha* Huds. (G: *C. arenaria* subsp. *disticha*) — basso Friuli (Pradizziolo), Goriziano (Monfalcone), probabilmente estinta.
- C. diandra* Schrank (G: *C. paniculata* subsp. *teretiuscula*) — regione montana (Cima Corso), Goriziano (paludi di Castelletto).
- C. appropinquata* Schum. (G: *C. paniculata* subsp. *paradoxa*) — dal basso Friuli (Aquileia) alla regione montana inf. (Valcalda, Rigolato, Cima Corso).
- C. paniculata* L. (G: *C. paniculata* subsp. *typica*) — dal basso Friuli alla regione montana.
- C. leporina* L. — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
- C. brizoides* L. — antica segnalazione per l'alto Friuli (Qualso) non più confermata. Cresce al di fuori dei limiti della regione nella vicina valle del Vipacco (foresta di Panovec).
- C. praecox* Schreb. — Goriziano (lago di Doberdò, Devetachi), Triestino, Carso (Comeno).
- C. echinata* Murr. — regione montana.
- C. remota* L. — dal basso Friuli (Sacileto) alla regione montana inf. (palude Cordea, Forni di S.).
- C. canescens* L. — regione montana.
- C. lachenalli* Schkuhr — Alpi carniche occ. (Val Visdende, Forcella Dignas, Col Spina).
- C. bicolor* All. — Alpi Carniche (Passo M. Croce di Comelico).
- C. buxbaumii* Wahlenb. — Alpi Carniche (Forni di S. ai piedi del Dosso Varmost).
- C. atrata* L. (G: *C. atrata* subsp. *typica*) — regione montana.
- C. aterrima* Hoppe (G: *C. atrata* var. *aterrima*) — regione montana.
- C. parviflora* Host (G: *C. atrata* subsp. *nigra*) — regione montana.
- C. mucronata* All. — dall'alto Friuli (magredi) alla regione montana.
- C. elata* All. (G: *C. caespitosa* subsp. *stricta*; M: *C. stricta*) — dal basso Friuli alla regione montana inf. (-1000 m), Goriziano, Carso, Istria.
- C. caespitosa* L. (G: *C. caespitosa* subsp. *typica*; M: *C. vulgaris*) — Istria (Obrov).
- C. gracilis* Curt. (G: *C. caespitosa* subsp. *acuta*) — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
- C. buekii* Wimm. (G: *C. caespitosa* subsp. *buekii*) — Goriziano (alle rive dell'Isonzo).

presso S. Pietro).

- C. nigra (L.) Reichard (G: *C. caespitosa* subsp. *Goodenowii*) — dal basso Friuli (risorgive) alla regione montana.
- C. hallerana Asso — litorale friulano or. (Grado), Goriziano, Carso, Istria.
- C. digitata L. (G: *C. digitata* subsp. *typica*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- C. ornithopoda Willd. (G: *C. digitata* subsp. *ornithopoda*) — regione montana, Goriziano (Sabotino), Carso (Orlek, M. Gaja), Istria.
- C. ornithopodioides Hausm. (G: *C. digitata* subsp. *ornithopodioides*) — regione montana.
- C. tomentosa L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- C. caryophyllea Latourr. (G: *C. verna* subsp. *typica*; M: *C. verna*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- C. montana L. — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- C. fritschii Waisb. — Carso, da controllare, forse confusa con la seguente.
- C. pilulifera L. — regione montana (M. Paularo, M. Crostis), Carso (Prešnica).
- C. umbrosa Host (G: *C. verna* subsp. *longifolia*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano (Collio).
- C. hirta L. — dal mare alla regione montana inf. (—900 m), Goriziano, Carso, Istria.
- C. flacca Schreb. (G, M: *C. glauca*) — dal mare alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
- C. riparia Curt. (G: *C. riparia* subsp. *typica*) — basso Friuli, Istria.
- C. acutiformis Ehrh. (G: *C. riparia* subsp. *acutiformis*) — dal basso Friuli alla regione montana inf. (Somplago, Tolmezzo, Caneva).
- C. vesicaria L. — dall'alto Friuli alla regione montana, Goriziano, Triestino (foci del Timavo), Istria.
- C. rostrata Stokes ex With. — regione montana, Goriziano (Castelletto).
- C. alba Scop. — regione montana, Triestino (costiera).
- C. pseudocyperus L. — basso Friuli, Triestino (foci del Timavo).
- C. pendula Huds. — basso Friuli, Goriziano, Carso, Istria.
- C. frigida All. — regione montana.
- C. limosa L. — Goriziano.
- C. paupercula Michx — Alpi Carniche (Forcella Dignas, Passo M. Croce Comelico, Watschinger Alm, Pramollo).
- C. capillaris L. — regione montana.
- C. sylvatica Huds. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
- C. brachystachys Schrank (G: *C. brachystachys* subsp. *typica*) — regione montana.
- C. austroalpina Becherer (G: *C. brachystachys* subsp. *tenax*) — indicato da Gortani per la Casera Tersadia, ma forse confuso.
- C. ferruginea Scop. (G: *C. ferruginea* subsp. *typica*) — regione montana.
- C. sempervirens Vill. (G: *C. ferruginea* subsp. *sempervirens*) — regione montana.
- C. pilosa Scop. — regione montana inf. (Lateis), Friuli or. (Valli del Natisone), Goriziano, Carso, Istria.
- C. firma Mygind (G: *C. ferruginea* subsp. *firma*) — regione montana.
- C. panicea L. — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Triestino (foci del Timavo).

- C. michelii* Host — Goriziano (Pietrarossa), Carso, Istria.
C. liparocarpos Gaud. (G, M: *C. nitida*) — dal mare (foci del Tagliamento) all'alto Friuli (magredi, Alesso), Goriziano.
C. distans L. (G: *C. distans* subsp. *typica*) — dal basso Friuli alla regione montana inf. (Tolmezzo, Caneva), Goriziano, Triestino, Istria.
C. hostiana DC. (G: *C. distans* subsp. *hornschuchiana et fulva*) — dal basso Friuli alla regione montana inf.
C. pallescens L. — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
C. extensa Good. — litorale friulano or., Istria.
C. oederi Retz. (G: *C. flava* subsp. *oederi*) — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
C. flava L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
C. lepidocarpa Tausch — distribuzione mal nota.

ZINGIBERALES (SCITAMINEAE)

CANNACEAE

Canna L.

- C. indica* L. — coltivata.

ORCHIDALES

ORCHIDACEAE

Cypripedium L.

- C. calceolus* L. — regione montana.

Epipactis Zinn

- E. palustris* (L.) Cr. — dal litorale e basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Istria.
E. atrorubens (Hoffm.) Schult. (G: *E. latifolia* subsp. *rubiginosa*) — dal mare (Lignano) alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.
E. helleborine (L.) Cr. (G: *E. latifolia* subsp. *typica*) — regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
E. muelleri Godf. — Carso.
E. microphylla (Ehrh.) Sw. — Carso, Istria.

Cephalanthera Rich.

- C. rubra* (L.) Rich. — dal litorale (Lignano, Grado), alla regione montana inf., Carso.
C. longifolia (L.) Fritsch (G, M: *C. ensifolia*) — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.
C. damasonium (Mill.) Druce (G, M: *C. pallens*) — regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Limodorum Boehm.

- L. abortivum* (L.) Sw. — dall'alto Friuli alla regione montana inf. (conca tolmezzina), Goriziano, Carso, Istria.

Listera R.Br.

L. ovata (L.) R. Br. — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

L. cordata (L.) R. Br. — regione montana.

Neottia Guett.

N. nidus-avis (L.) Rich. — regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Spiranthes Rich.

S. aestivalis (Poir.) Rich. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso.

S. spiralis (L.) Chevall. (G, M: *S. autumnalis*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Goodyera R. Br.

G. repens (L.) R. Br. — regione montana.

Epipogium R. Br.

E. aphyllum (F.W.Schmidt) Sw. — regione montana (Casera Vualt, Sauris di Sotto, Val Pesarina).

Herminium Guett.

H. monorchis (L.) R. Br. — regione montana.

Chamorchis Rich.

C. alpina (L.) Rich. (G: *Herminium alpinum*) — regione montana.

Coeloglossum Hartman

C. viride (L.) Hartm. — dall'alto Friuli alla regione montana, Carso, Istria.

Platanthera Rich.

P. bifolia (L.) Rich. (G: *P. bifolia* subsp. *typica*) — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

P. chlorantha (Cust.) Rchb. (G: *P. bifolia* subsp. *montana*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso (M. Carso), Istria.

Gymnadenia R. Br.

G. odoratissima (L.) Rich. — regione montana.

G. conopsea (L.) R. Br. — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

Pseudorchis Ség.

P. albida (L.) A. & D. Löve (G: *Gymnadenia albida*) — regione montana, Goriziano (Sabotino).

Nigritella Rich.

N. nigra (L.) Rchb. — regione montana.

N. miniata (Cr.) Janche (G: *N. nigra* var. *rubra*) — regione montana.

Anacamptis Rich.

A. pyramidalis (L.) Rich. (G: *Orchis pyramidalis*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Traunsteinera Rchb.

T. globosa (L.) Rich. (G, M: *Orchis globosa*) — regione montana, Carso.

Orchis L.

O. ustulata L. — dal basso Friuli alla regione montana, Goriziano, Carso, Istria.

O. papilionacea L. — Goriziano (Piuma), Istria (valle della Dragogna).

O. purpurea Huds. — alto Friuli (Polcenigo), Goriziano, Carso, Istria.

O. militaris L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

O. simia Lam. (G: *O. tephrosanthos*) — Friuli or. (Pulfero), Goriziano, Carso, Istria.

O. coriophora L.

subsp. coriophora (G: *O. coriophora* var. *cimicina*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

O. tridentata Scop. — dall'alto Friuli alla regione montana inf., Carso, Istria.

O. morio L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

O. pallens L. — regione montana.

O. provincialis Balb. — Triestino, ma forse estinta.

O. laxiflora Lam. (G: *O. laxiflora* subsp. *typica*) — basso Friuli, Goriziano, Carso.

O. palustris Jacq. (G: *O. laxiflora* subsp. *palustris*) — litorale friulano or. (Grado), Goriziano (Marina Julia, Monfalcone).

O. mascula (L.) L. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

Dactylorhiza (Neck.) Nevski

D. sambucina (L.) Soò — regione montana, Carso.

D. maculata (L.) Soò — regione montana, Carso.

D. incarnata (L.) Soò — basso Friuli, Goriziano, Istria.

D. majalis (Rchb.) Hunt & Summerh (M: *Orchis latifolia*) — Istria (Osopo).

D. Traunsteineri (Sauter) Soò — regione montana (lago di Cima Corso).

Serapias L.

S. vomeracea (Burm.f.) Briq. (G: *S. longipetala*; M: *S. pseudo-cordigera*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Triestino (costiera), Istria.

Himantoglossum Koch

H. adriaticum Baumann (G: *Loroglossum hircinum*) — alto Friuli, Goriziano, Carso, Istria.

Ophrys L.

O. sphecodes Mill. (M: *O. aranifera*) — Goriziano, Carso, Istria.

O. atrata Lindl. (G: *O. aranifera* subsp. *atrata*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Carso, Istria.

O. insectifera L. (G: *O. myodes*) — regione montana, Carso (M. Lanaro).

O. apifera Huds. — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Triestino, Istria.

O. holosericea (Burm.f.) Greut; (G, M: *O. arachnites*) — dal basso Friuli alla regione montana inf., Goriziano, Triestino, Istria.

Malaxis Sol. ex Sw.

M. monophyllos (L.) Sw. — regione montana.

Liparis Rich.

L. loeseli (L.) Rich. — basso Friuli (fiume Stella) e regione montana inf. (laghetto di Cima Corso).

Corallorhiza Chatel.

C. trifida Chatel. (G: *C. neottia*) — regione montana.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- Fornaciari, G. 1973. Bibliografia botanica del Friuli. Acc. Sc. Lett. e Arti, Udine, ser. VII, 9:5-279.
- Marchesetti, C. 1894—95. Bibliografia botanica. Atti Mus. Civ. St. Nat. Trieste, 9:128-210.
- Marchesetti, C. 1931. Aggiunte alla Bibliografia botanica della Venezia Giulia. Atti Mus. Civ. St. Nat. Trieste, 9(2).

CONTRIBUTI FLORISTICI E AREOGRAFICI

- Cohrs, A. 1953—54. Beiträge zur Flora des nordadriatischen Küstenlandes. Feddes Repert., 56(1):66—96; 56(2):97—143.
- Cohrs, A. 1963. Beiträge zur Flora des nordadriatischen Küstenlandes mit besonderer Berücksichtigung von Friaul, den Julischen und Karnischen Alpen. Feddes Repert., 68(1):12—80.
- Černic, F. 1977. Distribuzione di *Aurinia petraea* (Ard.) Schur nelle Alpi sudorientali. Webbia 31(1):69—78.
- Ferlan, L. 1946. Le *Orchidaceae* della flora gradiscana. Archiv. bot., 22:103—109.
- Ferlan, L. 1950. Relitti di sottobosco nei canloni vallici del S. Michele. Studi Goriziani, :95—102.
- Hruby, J. 1918. Das Plateau von Komen im österreichischen Küstenlande. Öster. Bot. Zeitschr., 67:196—213.
- Justin, R. 1904. Lokale Florenschilderungen aus Krain und dem Küstenlande. I. Der Berg Vremščica (1027 m.) und seine Gehänge. Mitt. d. Mus. Ver. f. Krain. Jahrg. 17:151—192.
- Krašán, F. 1863. Beiträge zur Flora der Umgebung von Görz. Öster. Bot. Zeitschr. 13:345—362, 385—396.
- Krašán, F. 1865. — Beiträge zur Flora der Umgebung von Görz. Über die Vegetation des Isonzotales. Öster. Bot. Zeitschr., 15:101—107.
- Lasen C. e F. Martini 1977. — Sulla presenza di *Thlaspi minimum* Ard. (*T. kernerii* Huter) e *T. alpinum* Crantz in Italia. Boll. Soc. Adr. Sc., 61:111—122.
- Martini, F. 1978. Distribuzione di *Phyteuma betonicifolium* Vill. e *P. zahlbruckneri* Vest nelle Alpi sudorientali. Gior. Bot. Ital., 112(1—2):53—62.
- Paiero, P. 1978. Il genere *Salix* L. sul versante meridionale delle Alpi Orientali con speciale riguardo alle Alpi e Prealpi Carniche e Giulie. Contributi ad una revisione tassonomica e geografica dei salici italiani. Webbia, 32(2):271—339.
- Poldini, L. 1963. Nuove segnalazioni per la Flora advena di Trieste. Univ. Trieste, Fac. Sc., 13:1—16.
- Poldini, L. 1965. Contributo alla Flora triestina. I. Atti Mus. Civ. St. Nat. Trieste, 24(5):181—198.

- Poldini, L. 1966. Contributo alla Flora triestina. II. Atti Mus. Civ. St. Nat. Trieste, 26(6):269—282.
- Poldini, L. 1974. Le *Pedicularis* della serie *Foliosae* Maxim. della Flora italiana. Gior. Bot. Ital., 108(3—4):135—143.
- Poldini, L. 1975. Contributi critici alla conoscenza della Flora delle Alpi Friulane e del loro avanterra. Note miscellanee. Webbia, 29:437—538.
- Poldini, L. 1977. *Lembotropis emeriflorus* (Rchb.) Skalička anche nelle Alpi Carniche. Gior. Bot. Ital., III (1-2):63—70.
- Wraber, T. 1962. Vrste reda Lycopodiales v Sloveniji. Biološki vestnik, 10:11—25.
- Wraber, T. 1972. *Arbutus unedo* L. in *Myrtus communis* L. v slovenski Istri. Biološki vestnik. 20:127—133.
- Wraber, T. 1973. Gradivo za floro Strunjana. Mednar. mlad. razisk. tab. 1971—72. Ljubljana? :139—162.
- Wraber, T. 1975. Novo nahajališče evmediteranske flore v slovenski Istri. Varst. nar., Ljubljana, 8:47—56.

CATALOGHI E FLORE REGIONALI

- Gortani, L. e M. 1905—06. Flora Friulana. Udine.
- Marchesetti, C. 1896—97. Flora di Trieste. Trieste.
- Mayer, E. 1952. Seznam praprotnic in cvetnic slovenskega ozemlja. Slovens. akad. znan. in umetn., 5:7—427.
- Pacher D., Systematische Aufzählung der in Kärnten wildwachsenden Gefäßpflanzen. In Pacher D. u. Jabornegg M. 1880—95. Flora von Kärnten. Jahrb. naturh. Landes—Mus. Kärnten, 14:1—258; 15:1—192; 17:49—216; 18:83—284; 19:3—83; 23:85—134.
- Pampanini, R. 1958. La Flora del Cadore. Forlì.
- Pirone, G.A. 1855. Florae Forijuliensis Syllabus. Utini.
- Pospichal, E. 1897—98. Flora des österreichischen Küstenlandes. Leipzig u. Wien.

FLORULE

- Crichiutti, G. 1905—07. Florula della Valle di Raccolana e del gruppo del monte Canin. In Alto, 1:9—12, 18:?
- Feoli Chiapella, L. 1975—76. Florula del Massiccio Paularo—Dimon. Boll. Soc. Adr. Sc., 60:5—48.
- Pignatti S. e L. Poldini, 1969. Florula della Conca di Sauris (Alpi Carniche). Boll. Soc. Adr. Sc., 57:66—93.
- Ferluga R. e L. Poldini, 1979. Indagine floristica delle Dolomiti Pesarine. Boll. Soc. Adr. Sc., 62:1—95.
- Zenari, S. 1920. Primo contributo alla flora della Val Cellina (Friuli occidentale). Gior. Bot. Ital., 27(1):11—37.

- Zenari, S. 1923. Secondo contributo alla flora della Val Cellina. *Gior. Bot. Ital.*, 30(1—2):5—47.
- Zenari, S. 1925. La flora della Val Cellina. Aggiunte e correzioni. *Arch. Bot.*, 1(1):51—56.

Accettato il 20 marzo 1980
Indirizzo dell'Autore: Istituto ed Orto Botanico
dell'Università di Trieste
I — 34100 Trieste, Via A. Valerio, 30

INDEX

Sectio 1.

C. Marchesetti. Discorso commemorativo di Muzio de Tommasini (ristampa).	11
L. Zennaro. Tommasini nella vita civile e sociale di Trieste.	35
E. Pignatti Wikus. Plantae tommasiniana.	57

Sectio 2.

L. Poldini. Übersicht über die Vegetation des Karstes von Triest und Görz (NO-Italien).	79
S. Pignatti. I complessi vegetazionali del Triestino.	131
T. Cusma Velari e Lausi D. Indagini cariologiche in <i>Stachys recta</i> L., <i>S. labiosa</i> Bertol., <i>S. subcrenata</i> Vis., <i>S. fragilis</i> Vis.	149
G. Turecek, E. Titz und W. Titz. Eine neue diploide <i>Valeriana officinalis</i> -Sippe im illyrischen Raum.	157
R. Gerdol. <i>Scheuchzeria palustris</i> L. nuova per le Alpi Carniche.	163
T. Wraber. Übereinige neue oder seltene Arten in der Flora der Julischen Alpen (IV).	169
L. Iljanić. <i>Galium setaceum</i> Lam. auf der Insel Mljet-Kroatien.	179
E. Aichinger. Zum Gedenken an k. und k. Statthaltereirath in Triest dr. Mutius Ritter von Tommasini.	183
D. Lausi e Gerdol R. Valutazione fitosociologica degli aggruppamenti a <i>Carex brachystachys</i> nelle Alpi Giulie Occidentali.	193
I. Trinajstić. Aperçu syntaxonomique de la végétation des rochers de l'espace adriatique.	203
E. Feoli, L. Feoli Chiapella, P. Ganis and A. Sorge. Spatial pattern analysis of abandoned grasslands of the Karst region by Trieste and Gorizia.	213
J. Poelt und Hafellner J. Zur Verbreitung und Biologie der Flechte <i>Caloplaca anularis</i> .	223
L. Rizzi Longo, L. Poldini e F. Goia. La microflora algale delle pareti calcaree del Friuli-Venezia Giulia (Italia Nord-Orientale).	231
L. Coassini Lokar, F. Tomé, L. Poldini e M. Poratti. Indagine sul contenuto di colchicina in <i>Colchicum autumnale</i> L. dell'Italia settentrionale.	265
J. v. Euw, M. Lounasmaa, T. Reichstein and C. J. Widén. Chemotaxonomy in <i>Dryopteris</i> and related fern genera. Review and evaluation of analytical methods.	275
L. Poldini. Catalogo floristico del Friuli-Venezia Giulia e dei territori adiacenti.	313

Studia Geobotanica Vol. 1 (1 - 2) 1980

CONTENTS

Section 1.

C. Marchesetti. Discorso commemorativo di Muzio de Tommasini (reprint).	11
L. Zennaro. Tommasini in the civil and political life of Trieste.	35
E. Pignatti Wikus. Plantae tommasinianae.	57

Section 2.

L. Poldini. Outlines of the vegetation of the Karst of Trieste and Gorizia (NE-Italy).	79
S. Pignatti. Vegetational complexes in the territory of Trieste.	131
T. Cusma Velari and Lausi D. Karyological studies in <i>Stachys recta</i> L., <i>S. labiosa</i> Bertol., <i>S. subcrenata</i> Vis., <i>S. fragilis</i> Vis.	149
G. Turecek, E. Titz and W. Titz. A new diploid race of <i>Valeriana officinalis</i> in the Illyrian region.	157
R. Gerdol. <i>Scheuchzeria palustris</i> L. New to the Carnic Alps.	163
T. Wraber. Some new or rare species in the flora of the Julian Alps (IV).	169
L. Ilijanić. <i>Galium setaceum</i> Lam. in the isle of Mljet-Croatia.	179
E. Aichinger. In the memory of dr. M. de Tommasini, imperial magistrate in Trieste.	183
D. Lausi and Gerdol R. Phytosociological evaluation of the <i>Carex brachystachys</i> communities in the Western Julian Alps.	193
I. Trinajstić. A syntaxonomical synthesis of the rocky vegetation in the Adriatic region.	203
E. Feoli, L. Feoli Chiapella, P. Ganis and A. Sorge. Spatial pattern analysis of abandoned grasslands of the Karst region by Trieste and Gorizia.	213
J. Poelt and Hafellner J. Distribution and biology of the lichen <i>Caloplaca anularis</i> .	223
L. Rizzi Longo, L. Poldini e F. Goia. The algal microflora on calcareous walls of Friuli-Venezia Giulia (NE-Italy).	231
L. Coassini Lokar, F. Tomé, L. Poldini and M. Poratti. The colchicine content in <i>Colchicum autumnale</i> L. of North Italy.	265
J. v. Euw, M. Lounasmaa, T. Reichstein and C. J. Widén. Chemotaxonomy in <i>Dryopteris</i> and related fern genera. Review and evaluation of analytical methods.	275
L. Poldini. Check list of the flora of Friuli-Venezia Giulia and adjacent territories.	313

Studia Geobotanica Vol. 1 (1 - 2) 1980

CONTENTS

Section 1.

C. Marchesetti. Discorso commemorativo di Muzio de Tommasini (reprint).	11
L. Zennaro. Tommasini in the civil and political life of Trieste.	35
E. Pignatti Wikus. Plantae tommasiniana.	57

Section 2.

L. Poldini. Outlines of the vegetation of the Karst of Trieste and Gorizia (NE-Italy).	79
S. Pignatti. Vegetational complexes in the territory of Trieste.	131
T. Cusma Velari and Lausi D. Karyological studies in <i>Stachys recta</i> L., <i>S. labiosa</i> Bertol., <i>S. subcrenata</i> Vis., <i>S. fragilis</i> Vis.	149
G. Turecek, E. Titz and W. Titz. A new diploid race of <i>Valeriana officinalis</i> in the Illyrian region.	157
R. Gerdol. <i>Scheuchzeria palustris</i> L. New to the Carnic Alps.	163
T. Wraber. Some new or rare species in the flora of the Julian Alps (IV).	169
L. Ilijanić. <i>Galium setaceum</i> Lam. in the isle of Mljet-Croatia.	179
E. Aichinger. In the memory of dr. M. de Tommasini, imperial magistrate in Trieste.	183
D. Lausi and Gerdol R. Phytosociological evaluation of the <i>Carex brachystachys</i> communities in the Western Julian Alps.	193
I. Trinajstić. A syntaxonomical synthesis of the rocky vegetation in the Adriatic region.	203
E. Feoli, L. Feoli Chiapella, P. Ganis and A. Sorge. Spatial pattern analysis of abandoned grasslands of the Karst region by Trieste and Gorizia.	213
J. Poelt and Hafellner J. Distribution and biology of the lichen <i>Caloplaca anularis</i> .	223
L. Rizzi Longo, L. Poldini e F. Goia. The algal microflora on calcareous walls of Friuli-Venezia Giulia (NE-Italy).	231
L. Coassini Lokar, F. Tomé, L. Poldini and M. Poratti. The colchicine content in <i>Colchicum autumnale</i> L. of North Italy.	265
J. v. Euw, M. Lounasmaa, T. Reichstein and C. J. Widén. Chemotaxonomy in <i>Dryopteris</i> and related fern genera. Review and evaluation of analytical methods.	275
L. Poldini. Check list of the flora of Friuli-Venezia Giulia and adjacent territories.	313